

# Оценки числа собственных значений абстрактных и дифференциальных оператор-функций

А. А. Владимиров

**Аннотация.** В статье рассматривается оператор-функция  $F(\lambda)$ ,  $\lambda \in (\sigma, \tau) \subseteq \mathbb{R}$ , значениями которой являются полуограниченные самосопряженные операторы пространства  $\mathfrak{H}$ . Для числа  $\mathcal{N}_F(\alpha, \beta)$  собственных значений такой оператор-функции на полуинтервале  $[\alpha, \beta] \subseteq (\sigma, \tau)$  устанавливаются оценки вида  $\mathcal{N}_F(\alpha, \beta) \geq \nu_F(\beta) - \nu_F(\alpha)$  и равенства вида  $\mathcal{N}_F(\alpha, \beta) = \nu_F(\beta) - \nu_F(\alpha)$ , где  $\nu(\xi)$  есть число отрицательных собственных значений оператора  $F(\xi)$ ,  $\xi \in (\sigma, \tau)$ .

Полученные абстрактные результаты применяются к обыкновенным дифференциальным оператор-функциям на конечном интервале.

## 1. Абстрактные утверждения

Пусть  $\mathfrak{H}$  есть некоторое абстрактное гильбертово пространство, и пусть  $F(\lambda)$  есть абстрактная оператор-функция интервала  $(\sigma, \tau) \subseteq \mathbb{R}$  со следующими свойствами.

- (1) При любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  оператор  $F(\lambda_0)$  представляет собой действующий в пространстве  $\mathfrak{H}$  самосопряженный оператор с компактной резольвентой.
- (2) Для любого фиксированного  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  найдутся такое вещественное число  $\mu$  и такая окрестность  $\mathcal{U}(\lambda_0) \subseteq (\sigma, \tau)$  числа  $\lambda_0$ , что при любом фиксированном  $\lambda_1 \in \mathcal{U}(\lambda_0)$  оператор  $F(\lambda_1) - \mu$  будет неотрицателен.
- (3) Оператор-функция  $(F(\lambda) - i)^{-1}$  непрерывна на интервале  $(\sigma, \tau)$  в смысле равномерной операторной топологии.

Как обычно, *собственным значением кратности  $m$*  оператор-функции  $F(\lambda)$  будет называться такое число  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$ , для которого 0 является собственным значением кратности  $m$  оператора  $F(\lambda_0)$ . Кроме того, через  $\mathcal{N}_F(\xi_1, \xi_2)$  будет обозначаться сосчитанное с учетом кратности число собственных значений оператор-функции  $F(\lambda)$ , лежащих на полуинтервале  $[\xi_1, \xi_2] \subseteq (\sigma, \tau)$ .

Обозначим также через  $\nu_F(\lambda)$  числовую функцию, для которой при любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  число  $\nu_F(\lambda_0)$  представляет собой сосчитанное с учетом кратности число отрицательных собственных значений оператора  $F(\lambda_0)$ . В настоящем пункте будет исследован вопрос о связи между поведением функции  $\nu_F(\lambda)$  и поведением величин  $\mathcal{N}_F(\xi_1, \xi_2)$ .

**1.1. Простейшая оценка числа собственных значений.** Справедливо следующее утверждение.

**ТЕОРЕМА 1.** Для любого полуинтервала  $[\xi_1, \xi_2] \subseteq (\sigma, \tau)$  имеет место оценка

$$\mathcal{N}_F(\xi_1, \xi_2) \geq \nu_F(\xi_2) - \nu_F(\xi_1).$$

Чтобы доказать теорему 1, введем в рассмотрение следующую вспомогательную последовательность числовых функций.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.** Через  $\Lambda_m(\lambda)$ ,  $m = 1, 2, \dots$ , будут обозначаться функции такие, что при любых фиксированных  $m \in \mathbb{N}$  и  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  число  $\Lambda_m(\lambda_0)$  представляет собой  $m$ -ое снизу (с учетом кратности) собственное значение оператора  $F(\lambda_0)$ .

Определение 1 корректно, поскольку операторы-значения оператор-функции  $F(\lambda)$  ограничены снизу и имеют чисто дискретный спектр.

Основное свойство функций  $\Lambda_m(\lambda)$  состоит в следующем.

**ЛЕММА 1.** При любом фиксированном  $m \in \mathbb{N}$  функция  $\Lambda_m(\lambda)$  непрерывна на интервале  $(\sigma, \tau)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Очевидно, достаточно доказать, что при любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  функция  $\Lambda_m(\lambda)$  непрерывна на некоторой окрестности числа  $\lambda_0$ .

Пусть вещественное число  $\mu$  и окрестность  $\mathcal{U}(\lambda_0) \subseteq (\sigma, \tau)$  числа  $\lambda_0$  таковы, что при любом фиксированном  $\lambda_1 \in \mathcal{U}(\lambda_0)$  оператор  $F(\lambda_1) - \mu$  является положительным. Такие  $\mu$  и  $\mathcal{U}(\lambda_0)$  существуют по определению оператор-функции  $F(\lambda)$ . Обозначим через  $\Theta_{m,\mu}(\lambda)$  числовую функцию окрестности  $\mathcal{U}(\lambda_0)$ , ставящую любому  $\lambda_1 \in \mathcal{U}(\lambda_0)$  в соответствие  $m$ -ое сверху (с учетом кратности) собственное значение оператора  $(F(\lambda_1) - \mu)^{-1}$ .

Заметим теперь, что оператор-функция  $(F(\lambda) - \mu)^{-1}$  непрерывна на окрестности  $\mathcal{U}(\lambda_0)$  в смысле равномерной операторной топологии — это с очевидностью следует из определения оператор-функции  $F(\lambda)$ . Поэтому числовая функция  $\Theta_{m,\mu}(\lambda)$  непрерывна на окрестности  $\mathcal{U}(\lambda_0)$ . Однако число  $\mu$  выбрано таким образом, что справедливо тождество

$$\Lambda_m(\lambda) = \frac{1}{\Theta_{m,\mu}(\lambda)} + \mu.$$

Поэтому функция  $\Lambda_m(\lambda)$  также непрерывна на окрестности  $\mathcal{U}(\lambda_0)$ . Тем самым лемма доказана.  $\square$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.** Непосредственно из определения функции  $\nu_F(\lambda)$  и функций  $\Lambda_m(\lambda)$  следует, что не менее  $\nu_F(\xi_2) - \nu_F(\xi_1)$  функций из последовательности  $\{\Lambda_m(\lambda)\}_{m=1}^\infty$  принимают неотрицательное значение в точке  $\xi_1$  и отрицательное — в точке  $\xi_2$ . Из утверждаемой леммой 1 непрерывности функций  $\Lambda_m(\lambda)$  потому следует, что не менее  $\nu_F(\xi_2) - \nu_F(\xi_1)$  функций из последовательности  $\{\Lambda_m(\lambda)\}_{m=1}^\infty$  имеют нуль на полуинтервале  $[\xi_1, \xi_2]$ . Утверждение теоремы теперь немедленно получается из определения функций  $\Lambda_m(\lambda)$  и определения понятия собственного значения оператор-функции  $F(\lambda)$ .  $\square$

**1.2. Оценки числа собственных значений при выполнении условий монотонности.** Если наложить на вид оператор-функции  $F(\lambda)$  дополнительные ограничения, то появится возможность оценить величины  $\mathcal{N}_F(\xi_1, \xi_2)$  не только снизу, но и сверху. При формулировке соответствующих утверждений будет использоваться понятие *замыкания квадратичной формы*, определенное, например, в [3, глава VI].

**ТЕОРЕМА 2.** Пусть определена форма-функция  $f(\lambda)[y]$  со следующими свойствами.

- При любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  квадратичная форма  $f(\lambda_0)[y]$  представляет собой замыкание определенной на линейном подпространстве  $\mathfrak{D}(F(\lambda_0))$  квадратичной формы  $\langle F(\lambda_0)y, y \rangle_f$ .
- Область определения квадратичной формы  $f(\lambda_0)[y]$  не зависит от выбора числа  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$ . Ниже эта не зависящая от выбора  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  область будет обозначаться просто через  $\mathfrak{D}(f)$ .

- При любых фиксированных  $\lambda_1, \lambda_2 \in (\sigma, \tau)$ , удовлетворяющих неравенству  $\lambda_1 < \lambda_2$ , определенная на линейном подпространстве  $\mathfrak{D}(\mathfrak{f})$  квадратичная форма

$$\mathfrak{f}(\lambda_1)[y] - \mathfrak{f}(\lambda_2)[y]$$

является положительной.

Тогда для любого полуинтервала  $[\xi_1, \xi_2] \subset (\sigma, \tau)$  имеет место равенство

$$\mathcal{N}_F(\xi_1, \xi_2) = \nu_F(\xi_2) - \nu_F(\xi_1).$$

Доказательство теоремы 2 будет основано на следующем приводимом без доказательства утверждении, представляющем собой простое следствие известного вариационного принципа [1, глава 1, теорема 13<sup>bis</sup>].

**УТВЕРЖДЕНИЕ 1.** Пусть  $F$  есть ограниченный снизу самосопряженный оператор гильбертова пространства  $\mathfrak{H}$ , спектр которого чисто дискретен на луче  $(-\infty, 0)$ . Пусть  $\mathfrak{f}[y]$  есть замыкание определенной на линейном подпространстве  $\mathfrak{D}(F)$  квадратичной формы  $\langle Fy, y \rangle_{\mathfrak{H}}$ . Тогда число отрицательных собственных значений оператора  $F$  равно максимуму размерностей подпространств  $\mathfrak{M} \subset \mathfrak{D}(\mathfrak{f})$ , на которых квадратичная форма  $\mathfrak{f}[y]$  отрицательна.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2.** Зафиксируем произвольное число  $m \in \mathbb{N}$ , а также произвольные числа  $\lambda_1, \lambda_2 \in (\sigma, \tau)$ , удовлетворяющие неравенству  $\lambda_1 < \lambda_2$ . Очевидно, что найдется  $m$ -мерное подпространство  $\mathfrak{M} \subset \mathfrak{D}(F(\lambda_1))$ , на котором квадратичная форма оператора  $F(\lambda_1) - \Lambda_m(\lambda_1)$  будет неположительна. Однако при выполнении условий теоремы указанное подпространство  $\mathfrak{M}$  будет подпространством области определения квадратичной формы  $\mathfrak{f}(\lambda_2)[y]$ , причем квадратичная форма  $\mathfrak{f}(\lambda_2)[y] - \Lambda_m(\lambda_1) \cdot \|y\|_{\mathfrak{H}}^2$  будет на подпространстве  $\mathfrak{M}$  отрицательна. Из утверждения 1 теперь немедленно вытекает справедливость неравенства  $\Lambda_m(\lambda_2) < \Lambda_m(\lambda_1)$ .

Ввиду произвольности выбора чисел  $m$ ,  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$ , сказанное означает, что все функции  $\Lambda_m(\lambda)$  строго убывают на интервале  $(\sigma, \tau)$ .

Однако из непрерывности и строгого убывания функций  $\Lambda_m(\lambda)$  следует, что величина  $\mathcal{N}_F(\xi_1, \xi_2)$  в точности равна числу таких функций из последовательности  $\{\Lambda_m(\lambda)\}_{m=1}^{\infty}$ , которые принимают неотрицательное значение в точке  $\xi_1$  и отрицательное — в точке  $\xi_2$ . Поскольку число таких функций есть  $\nu_F(\xi_2) - \nu_F(\xi_1)$ , то утверждение теоремы справедливо.  $\square$

**1.3. Оценки числа собственных значений при выполнении условий отрицательности типа спектра.** Условия теоремы 2 можно в некотором смысле ослабить. Именно, справедливо следующее утверждение.

**ТЕОРЕМА 3.** Пусть определены формы-функции  $\mathfrak{f}(\lambda)[y]$  и  $\mathfrak{f}'(\lambda)[y]$  со следующими свойствами.

- При любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  квадратичная форма  $\mathfrak{f}(\lambda_0)[y]$  представляет собой замыкание определенной на линейном подпространстве  $\mathfrak{D}(F(\lambda_0))$  квадратичной формы  $\langle F(\lambda_0)y, y \rangle_{\mathfrak{H}}$ .
- Область определения квадратичной формы  $\mathfrak{f}(\lambda_0)[y]$  не зависит от выбора числа  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$ . Нижнее эта не зависящая от выбора  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  область будет обозначаться просто через  $\mathfrak{D}(\mathfrak{f})$ .
- При любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  областью определения квадратичной формы  $\mathfrak{f}'(\lambda_0)[y]$  является линейное подпространство  $\mathfrak{D}(\mathfrak{f})$ .
- Квадратичные формы  $\mathfrak{f}'(\lambda)[y]$  равномерно по  $\lambda \in (\sigma, \tau)$  ограничены относительно произвольной метрики, по которой  $\mathfrak{D}(\mathfrak{f})$  полно.
- При любом фиксированном  $y_0 \in \mathfrak{D}(\mathfrak{f})$  числовая функция  $\mathfrak{f}(\lambda)[y_0]$  дифференцируема на интервале  $(\sigma, \tau)$ , и производная этой функции есть числовая функция  $\mathfrak{f}'(\lambda)[y_0]$ .

- Для любой собственной пары  $\{\lambda_0, y_0\}$  оператор-функции  $F(\lambda)$  справедливо неравенство  $f'(\lambda_0)[y_0] < 0$ .

Тогда для любого полуинтервала  $[\xi_1, \xi_2] \in (\sigma, \tau)$  справедливо равенство

$$\mathcal{N}_F(\xi_1, \xi_2) = \nu_F(\xi_2) - \nu_F(\xi_1).$$

Отметим, что содержание теоремы 3 тесно связано с известным в теории операторных пучков понятием *типа собственного значения*.

**Доказательство теоремы 3.** Пусть  $m \in \mathbb{N}$  и  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  — произвольные числа, для которых справедливо равенство  $\Lambda_m(\lambda_0) = 0$ .

Введем в линейном пространстве  $\mathfrak{D}(f)$  норму

$$\|y\|_{\mathfrak{F}}^2 := f(\lambda_0)[y] - \mu \cdot \|y\|_{\mathfrak{H}}^2,$$

где  $\mu$  есть произвольно фиксированное вещественное число, строго меньшее вершины формы  $f(\lambda_0)[y]$ . Относительно нормы  $\|y\|_{\mathfrak{F}}$  линейное подпространство  $\mathfrak{D}(f)$  является гильбертовым пространством, которое ниже будет обозначаться через  $\mathfrak{F}$ .

Рассмотрим оператор-функцию  $K(\lambda)$ , для которой при любом фиксированном  $\lambda_1 \in (\sigma, \tau)$  оператор  $K(\lambda_1)$  действует в гильбертовом пространстве  $\mathfrak{F}$  и удовлетворяет тождеству

$$\langle (1 + K(\lambda_1))y, y \rangle_{\mathfrak{F}} = f(\lambda_1)[y].$$

Из теоремы о замкнутом графике (см., например, [3, глава III, теорема 5.20]) нетрудно вывести тот факт, что значениями оператор-функции  $K(\lambda)$  являются ограниченные самосопряженные операторы. Кроме того, из определения нормы  $\|y\|_{\mathfrak{F}}$  и компактности резольвенты оператора  $F(\lambda_0)$  вытекает факт компактности оператора  $K(\lambda_0)$ .

Заметим, что оператор-функция  $K(\lambda)$  является дифференцируемой, причем ее производная  $K'(\lambda)$  удовлетворяет тождеству

$$\langle K'(\lambda)y, y \rangle_{\mathfrak{F}} = f'(\lambda)[y].$$

Заметим также, что операторы-значения оператор-функции  $K'(\lambda)$  равномерно по  $\lambda \in (\sigma, \tau)$  ограничены в силу условий теоремы.

Разложим теперь пространство  $\mathfrak{F}$  в прямую сумму  $\mathfrak{F}_- \oplus \mathfrak{F}_0 \oplus \mathfrak{F}_+$ , где

- $\mathfrak{F}_-$  есть инвариантное подпространство оператора  $K(\lambda_0)$ , отвечающее той части его спектра, которая лежит на луче  $(-\infty, -1)$ ;
- $\mathfrak{F}_0$  есть инвариантное подпространство оператора  $K(\lambda_0)$ , отвечающее собственному значению  $-1$ ;
- $\mathfrak{F}_+$  есть инвариантное подпространство оператора  $K(\lambda_0)$ , отвечающее той части его спектра, которая лежит на луче  $(-1, +\infty)$ .

Из компактности оператора  $K(\lambda_0)$  следует существование такого  $\varepsilon > 0$ , для которого на подпространстве  $\mathfrak{F}_-$  будет справедлива оценка

$$(1) \quad \langle K(\lambda_0)y, y \rangle_{\mathfrak{F}} \leqslant (-1 - \varepsilon)\|y\|_{\mathfrak{F}}^2,$$

а на подпространстве  $\mathfrak{F}_+$  будет справедлива оценка

$$(2) \quad \langle K(\lambda_0)y, y \rangle_{\mathfrak{F}} \geqslant (-1 + \varepsilon)\|y\|_{\mathfrak{F}}^2.$$

Однако из условий теоремы и из первой теоремы о представлении (см. [3, глава VI, теорема 2.1]) следует, что для любого ненулевого вектора  $y \in \mathfrak{F}_0$  выполняется неравенство

$$\langle K'(\lambda_0)y, y \rangle_{\mathfrak{F}} < 0.$$

Поэтому оценка (1) означает, что найдется правая проколотая полуокрестность  $\mathcal{U}_{\text{пр}}(\lambda_0) \in (\sigma, \tau)$  точки  $\lambda_0$  такая, что для любого  $\lambda_1 \in \mathcal{U}_{\text{пр}}(\lambda_0)$  квадратичная форма оператора  $1 + K(\lambda_1)$  будет отрицательна на подпространстве  $\mathfrak{F}_- \oplus \mathfrak{F}_0$ . Аналогично, из оценки (2) и

равномерной ограниченности оператор-функции  $K'(\lambda)$  следует, что найдется левая проколотая полуокрестность  $\mathcal{U}_{\text{лев}}(\lambda_0) \Subset (\sigma, \tau)$  точки  $\lambda_0$  такая, что для любого  $\lambda_1 \in \mathcal{U}_{\text{лев}}(\lambda_0)$  квадратичная форма оператора  $1 + K(\lambda_1)$  будет положительна на подпространстве  $\mathfrak{F}_0 \oplus \mathfrak{F}_+$ .

Заметим теперь, что подпространство  $\mathfrak{F}_- \oplus \mathfrak{F}_0$  имеет размерность  $\geq m$ . Поэтому из определения оператор-функции  $K(\lambda)$  и утверждения 1 следует, что при любом  $\lambda_1 \in \mathcal{U}_{\text{пр}}(\lambda_0)$  справедливо неравенство  $\Lambda_m(\lambda_1) < 0$ . Аналогично, подпространство  $\mathfrak{F}_0 \oplus \mathfrak{F}_+$  имеет коразмерность  $< m$ . Поэтому при любом  $\lambda_1 \in \mathcal{U}_{\text{лев}}(\lambda_0)$  справедливо неравенство  $\Lambda_m(\lambda_1) \geq 0$ .

Итак, получен следующий результат: *каковы бы ни были  $t \in \mathbb{N}$  и  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$ , удовлетворяющие равенству  $\Lambda_m(\lambda_0) = 0$ , функция  $\Lambda_m(\lambda)$  неотрицательна в некоторой левой полуокрестности точки  $\lambda_0$  и отрицательна в некоторой проколотой правой полуокрестности точки  $\lambda_0$ .* Поскольку любая из функций  $\Lambda_m(\lambda)$  непрерывна в силу леммы 1, то этот результат означает, что любая из функций  $\Lambda_m(\lambda)$  строго убывает в каждом из своих нулей. Отсюда, в свою очередь, следует, что каждая из функций  $\Lambda_m(\lambda)$  имеет не более одного нуля, слева от которого она принимает только положительные, а справа — только отрицательные значения.

Повторяя теперь рассуждения, завершающие доказательство теоремы 2, убеждаемся в справедливости утверждения теоремы.  $\square$

## 2. Применение к дифференциальным оператор-функциям

Рассмотрим теперь оператор-функции, описываемые следующим определением.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.** Пусть  $p_k(x, \lambda)$ ,  $k = 0, \dots, n$ , есть непрерывные вещественные функции прямоугольника  $[a, b] \times (\sigma, \tau)$ . Пусть при этом для любого фиксированного  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  функция  $p_0(x, \lambda_0)$  положительна и принадлежит пространству  $C^n[a, b]$ , а любая из функций  $p_k(x, \lambda_0)$ ,  $k = 1, \dots, n-1$ , принадлежит пространству  $C^{n-k}[a, b]$ . Пусть, далее,  $U(\lambda)$  есть непрерывная матрица-функция интервала  $(\sigma, \tau)$ , значениями которой являются унитарные комплексные матрицы размера  $2n \times 2n$ . Тогда оператор-функцией, определенной дифференциальным выражением

$$(3) \quad \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \left( p_k(x, \lambda) y^{(n-k)}(x) \right)^{(n-k)}$$

и краевыми условиями

$$(4) \quad (U(\lambda) - 1)y^\vee + i(U(\lambda) + 1)y^\wedge = 0,$$

называется оператор-функция  $S(\lambda)$  со следующими свойствами.

- При любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  оператор  $S(\lambda_0)$  действует в гильбертовом пространстве  $L_2[a, b]$ .
- При любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  областью определения оператора  $S(\lambda_0)$  является плотное в гильбертовом пространстве  $L_2[a, b]$  линейное подпространство

$$\{y \in L_2[a, b] \mid y \in W_2^{2n}[a, b], (U(\lambda_0) - 1)y^\vee + i(U(\lambda_0) + 1)y^\wedge = 0\},$$

где  $y^\wedge$  и  $y^\vee$  есть связанные с функцией  $y(x)$  векторы пространства  $\mathbb{C}^{2n}$  вида

$$y^\wedge := \begin{pmatrix} y(a) \\ y'(a) \\ \dots \\ y^{(n-1)}(a) \\ y(b) \\ y'(b) \\ \dots \\ y^{(n-1)}(b) \end{pmatrix}, \quad y^\vee := \begin{pmatrix} y^{[2n-1]}(a) \\ y^{[2n-2]}(a) \\ \dots \\ y^{[n]}(a) \\ -y^{[2n-1]}(b) \\ -y^{[2n-2]}(b) \\ \dots \\ -y^{[n]}(b) \end{pmatrix}$$

(ср. с [6, (7.50)]). Здесь через  $y^{[n+m]}(x)$  обозначены хорошо известные в теории дифференциальных операторов квазипроизводные вида

$$y^{[n+m]}(x) := \sum_{k=0}^m (-1)^{m-k} \left( p_k(x, \lambda_0) y^{(n-k)}(x) \right)^{(m-k)}, \quad m = 0, \dots, n$$

(ср. с [5, § 15, (3)] и [6, (7.46)]).

- При любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  действие оператора  $S(\lambda_0)$  на произвольную функцию  $y \in \mathfrak{D}(S(\lambda_0))$  определяется равенством

$$S(\lambda_0)y := \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \left( p_k(x, \lambda_0) y^{(n-k)}(x) \right)^{(n-k)}.$$

Настоящий пункт посвящается применению теорем 1–3 к оператор-функциям  $S(\lambda)$ , описываемым определением 2.

**2.1. Свойства дифференциальных оператор-функций.** Оператор-функции, описываемые определением 2, обладают следующими свойствами.

ЛЕММА 2. Пусть  $A(\lambda)$  есть матрица-функция, значение которой при любом  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  удовлетворяет равенству

$$(5) \quad A(\lambda_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \frac{z+1}{z-1} \cdot (U(\lambda_0) - z)^{-1} dz.$$

Здесь  $U(\lambda_0)$  есть унитарная матрица из определяющих оператор  $S(\lambda_0)$  краевых условий, а  $\Gamma$  есть положительно ориентированный контур, внутренность которого не содержит точку 1, но содержит все отличные от 1 собственные значения матрицы  $U(\lambda_0)$ . Тогда при любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  для любой функции  $y \in \mathfrak{D}(S(\lambda_0))$  справедливо равенство

$$(6) \quad \langle S(\lambda_0)y, y \rangle_{L_2[a,b]} = \sum_{k=0}^n \int_a^b p_k(x, \lambda_0) \left| y^{(n-k)}(x) \right|^2 dx + \langle A(\lambda_0)y^\wedge, y^\wedge \rangle_{\mathbb{C}^{2n}}.$$

ЛЕММА 3. Пусть матрица-функция  $U(\lambda)$  такова, что числовая функция  $\text{rank}(U(\lambda) - 1)$  постоянна на интервале  $(\sigma, \tau)$ . Тогда для любого фиксированного  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  найдутся такое вещественное число  $\mu$  и такая окрестность  $\mathcal{U}(\lambda_0) \subseteq (\sigma, \tau)$  числа  $\lambda_0$ , что при любом фиксированном  $\lambda_1 \in \mathcal{U}(\lambda_0)$  оператор  $S(\lambda_1) - \mu$  будет неотрицателен.

ЛЕММА 4. Оператор-функция  $(S(\lambda) - i)^{-1}$  непрерывна на интервале  $(\sigma, \tau)$  в смысле равномерной операторной топологии.

ЛЕММА 5. При любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  замыканием определено на линейном подпространстве  $\mathfrak{D}(S(\lambda_0))$  квадратичной формы  $\langle S(\lambda_0)y, y \rangle_{L_2[a,b]}$  является квадратичная форма  $\mathfrak{s}(\lambda_0)[y]$ , областью определения которой является линейное подпространство

$$\{y \in L_2[a, b] \mid y \in W_2^n[a, b], y^\wedge \perp \ker(U(\lambda_0) - 1)\},$$

и значение которой на произвольной функции  $y \in \mathfrak{D}(\mathfrak{s})$  определяется равенством

$$\mathfrak{s}(\lambda_0)[y] := \sum_{k=0}^n \int_a^b p_k(x, \lambda_0) \left| y^{(n-k)}(x) \right|^2 dx + \langle A(\lambda_0)y^\wedge, y^\wedge \rangle_{\mathbb{C}^{2n}}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 2. При помощи интегрирования по частям нетрудно установить справедливость тождества

$$\langle S(\lambda_0)y, y \rangle_{L_2[a,b]} = \sum_{k=0}^n \int_a^b p_k(x, \lambda_0) |y^{(n-k)}(x)|^2 dx + \langle y^\vee, y^\wedge \rangle_{\mathbb{C}^{2n}}.$$

Поэтому лемма будет доказана, если будет установлено, что для любых векторов  $Y, Z \in \mathbb{C}^{2n}$ , удовлетворяющих условию

$$(7) \quad (U(\lambda_0) - 1)Z + i(U(\lambda_0) + 1)Y = 0,$$

выполняется равенство

$$(8) \quad \langle Z, Y \rangle_{\mathbb{C}^{2n}} = \langle A(\lambda_0)Y, Y \rangle_{\mathbb{C}^{2n}}.$$

Заметим, что условие (7) можно переписать в параметрической форме

$$(9) \quad \begin{aligned} Y &= (U(\lambda_0) - 1)X, \\ Z &= -i(U(\lambda_0) + 1)X, \\ X &\in \mathbb{C}^{2n}. \end{aligned}$$

При этом левая часть предполагаемого равенства (8) оказывается равна скалярному произведению

$$\langle B(\lambda_0)X, X \rangle_{\mathbb{C}^{2n}},$$

где через  $B(\lambda_0)$  обозначена матрица

$$B(\lambda_0) := -i(U^{-1}(\lambda_0) - 1) \cdot (U(\lambda_0) + 1) = = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma_1} (z^{-1} - 1) \cdot (z + 1) \cdot (U(\lambda_0) - z)^{-1} dz.$$

Здесь  $\Gamma_1$  есть положительно ориентированная граница кольца  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)\}$ . С другой стороны, правая часть предполагаемого равенства (8) оказывается равна скалярному произведению

$$\langle C(\lambda_0)X, X \rangle_{\mathbb{C}^{2n}},$$

где через  $C(\lambda_0)$  обозначена матрица

$$C(\lambda_0) := \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} (z^{-1} - 1) \cdot (z + 1) \cdot (U(\lambda_0) - z)^{-1} dz.$$

Здесь  $\Gamma$  есть контур из определения матрицы  $A(\lambda_0)$ .

Между тем, функция  $-i(z^{-1} - 1)(z + 1)$  обращается в нуль в точке  $z = 1$ , а матрица  $U(\lambda_0)$  заведомо не имеет присоединенных векторов, отвечающих собственному значению 1. Поэтому матрицы  $B(\lambda_0)$  и  $C(\lambda_0)$  равны. Следовательно, при выполнении условия (7) равенство (8) действительно справедливо. Тем самым лемма доказана.  $\square$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 3. Зафиксируем вещественное число  $\mu$  таким образом, что определенная в пространстве  $W_2^n[a, b]$  ограниченная квадратичная форма

$$\mathfrak{s}_{\lambda_0, \mu}[y] := \sum_{k=0}^n \int_a^b p_k(x, \lambda_0) |y^{(n-k)}(x)|^2 dx - \int_a^b \mu \cdot |y(x)|^2 dx + + \langle A(\lambda_0)y^\wedge, y^\wedge \rangle_{\mathbb{C}^{2n}}$$

является равномерно положительной.

Заметим, что при выполнении условия  $\text{rank}(U(\lambda) - 1) = \text{const}$  матрица-функция  $A(\lambda)$  является непрерывной на интервале  $(\sigma, \tau)$ . Поэтому для чисел  $\lambda_1$ , достаточно близких к  $\lambda_0$ , разность между квадратичной формой  $\mathfrak{s}_{\lambda_0, \mu}[y]$  и квадратичной формой

$$\mathfrak{s}_{\lambda_1, \mu}[y] := \sum_{k=0}^n \int_a^b p_k(x, \lambda_1) \left| y^{(n-k)}(x) \right|^2 dx - \int_a^b \mu \cdot |y(x)|^2 dx + + \langle A(\lambda_1)y^\wedge, y^\wedge \rangle_{\mathbb{C}^{2n}}$$

будет равномерно мала (по метрике пространства  $W_2^n[a, b]$ ). Следовательно, найдется такая окрестность  $\mathcal{U}(\lambda_0) \Subset (\sigma, \tau)$  числа  $\lambda_0$ , что для любого фиксированного  $\lambda_1 \in \mathcal{U}(\lambda_0)$  квадратичная форма  $\mathfrak{s}_{\lambda_1, \mu}[y]$  будет неотрицательна.

Однако из леммы 2 с очевидностью следует, что неотрицательность квадратичной формы  $\mathfrak{s}_{\lambda_1, \mu}[y]$  влечет за собой неотрицательность оператора  $S(\lambda_1) - \mu$  (обратное, вообще говоря, неверно). Значит, ранее определенные число  $\mu$  и окрестность  $\mathcal{U}(\lambda_0)$  обладают тем свойством, что для любого фиксированного  $\lambda_1 \in \mathcal{U}(\lambda_0)$  оператор  $S(\lambda_1) - \mu$  является неотрицательным. Тем самым утверждение леммы справедливо.  $\square$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 4.** Рассмотрим определенную на параллелепипеде  $[a, b] \times [a, b] \times (\sigma, \tau)$  функцию  $G(x, t, \lambda)$ , для которой при любом фиксированном  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$  функция  $G(x, t, \lambda_0)$  представляет собой функцию Грина оператора  $S(\lambda_0) - i$ . Нетрудно проверить, что непрерывность функций  $p_k(x, \lambda)$  и  $U(\lambda)$  приводит к тому, что функция  $G(x, t, \lambda)$  непрерывна на параллелепипеде  $[a, b] \times [a, b] \times (\sigma, \tau)$ . Отсюда с очевидностью вытекает справедливость утверждения леммы.  $\square$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 5.** Справедливость утверждения доказываемой леммы нетрудно вывести из леммы 2 и возможности записи условия (7) в форме (9).  $\square$

**2.2. Оценки числа собственных значений.** Из лемм 2–5 и теорем 1–3 вытекает справедливость следующих утверждений.

**ТЕОРЕМА 4.** Пусть матрица-функция  $U(\lambda)$  такова, что числовая функция  $\text{rank}(U(\lambda) - 1)$  постоянна на интервале  $(\sigma, \tau)$ . Тогда для любого полуинтервала  $[\xi_1, \xi_2] \Subset (\sigma, \tau)$  имеет место оценка

$$(10) \quad \mathcal{N}_S(\xi_1, \xi_2) \geq \nu_S(\xi_2) - \nu_S(\xi_1).$$

**ТЕОРЕМА 5.** Пусть выполнены следующие условия.

- Подпространство  $\ker(U(\lambda_0) - 1)$  не зависит от выбора числа  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$ .
- При любом фиксированном  $x \in [a, b]$  функции  $p_k(x, \lambda)$ ,  $k = 0, \dots, n - 1$ , невозрастают по  $\lambda$ . Кроме того, при любом фиксированном  $x \in [a, b]$  функция  $p_n(x, \lambda)$  строго убывает по  $\lambda$ .
- Отвечающая матрице-функции  $U(\lambda)$  матрица-функция  $A(\lambda)$  (см. лемму 2) невозрастает по  $\lambda$  в том смысле, что при любых фиксированных  $\lambda_1, \lambda_2 \in (\sigma, \tau)$ , удовлетворяющих неравенству  $\lambda_1 < \lambda_2$ , самосопряженная матрица  $A(\lambda_1) - A(\lambda_2)$  является неотрицательной.

Тогда для любого полуинтервала  $[\xi_1, \xi_2] \Subset (\sigma, \tau)$  имеет место равенство

$$\mathcal{N}_S(\xi_1, \xi_2) = \nu_S(\xi_2) - \nu_S(\xi_1).$$

**ТЕОРЕМА 6.** Пусть выполнены следующие условия.

- Подпространство  $\ker(U(\lambda_0) - 1)$  не зависит от выбора числа  $\lambda_0 \in (\sigma, \tau)$ .
- Функции  $p_k(x, \lambda)$ ,  $k = 0, \dots, n$ , являются дифференцируемыми по параметру  $\lambda$ , причем все производные  $\{p_k(x, \lambda)\}'_\lambda$  непрерывны на прямоугольнике  $[a, b] \times (\sigma, \tau)$ .
- Матрица-функция  $U(\lambda)$  является непрерывно дифференцируемой.

- Для любой собственной пары  $\{\lambda_0, y_0\}$  оператор-функции  $S(\lambda)$  имеет место неравенство

$$\sum_{k=0}^n \int_a^b \{p_k(x, \lambda)\}'_{\lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0} \cdot |y^{(n-k)}(x)| dx + \langle A'(\lambda_0)y^\wedge, y^\wedge \rangle_{\mathbb{C}^{2n}} < 0.$$

Тогда для любого полупротивала  $[\xi_1, \xi_2] \in (\sigma, \tau)$  имеет место равенство

$$\mathcal{N}_S(\xi_1, \xi_2) = \nu_S(\xi_2) - \nu_S(\xi_1).$$

В качестве следствий теорем 4–6 могут быть получены некоторые известные оценки числа собственных значений дифференциальных оператор-функций — в частности, оценки, связанные с результатами работ [2] и [4].

Автор выражает признательность проф. А. А. Шкаликову за постановку задач и ценные замечания.

### Список литературы

- [1] И. М. Глазман. *Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов*. М., «Физматгиз», 1963.
- [2] E. Kamke. *Neue Herleitung der Oszillationssätze für die linearen selbstadjungierten Randwertaufgaben zweiter Ordnung* // Math. Zeitschr., **44** (1939), S. 635–658.
- [3] Т. Като. *Теория возмущений линейных операторов*. М., «Мир», 1972.
- [4] R. Mennicken, H. Schmid, A. A. Shkalikov. *On the eigenvalue accumulation of Sturm-Liouville problems depending nonlinearly on the spectral parameter* // Math. Nachr., **189** (1998), pp. 157–170.
- [5] М. А. Наймарк. *Линейные дифференциальные операторы*. М., «Наука», 1969
- [6] Ф. С. Рофе—Бекетов, А. М. Холькин. *Спектральный анализ дифференциальных операторов. Связь спектральных и осцилляционных свойств*. Мариуполь, 2001.