## Resultados motivados por uma caracterização de operadores pseudo-diferenciais conjecturada por Rieffel

## Marcela Irene Merklen Olivera

TESE APRESENTADA
AO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PARA
OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR
EM
MATEMÁTICA

Orientador: Prof. Dr. Severino Toscano do Rêgo Melo Co-orientadora: Prof. Dra. Cristina Cerri

Durante a elaboração deste trabalho a autora recebeu apoio financeiro do CNPq

## Resultados motivados por uma caracterização de operadores pseudo-diferenciais conjecturada por Rieffel

Este exemplar corresponde à redação final da tese devidamente corregida e defendida por Marcela Irene Merklen Olivera e aprovada pela comissão julgadora.

São Paulo, outubro de 2002.

### Comissão Julgadora:

- Prof. Dr. Severino Toscano do Rego Melo (Presidente) IME-USP
- Prof. Dr. Ruy Exel Filho UFSC
- Prof. Dr. Milton Lopes IMECC-UNICAMP
- Prof. Dr. José Ruidival Santos Filho UFSCar
- Profa. Dra. Beatriz Abadie UNIV. REP. URUGUAI

a Alejandra, Ana, Héctor, minha família, com muito amor

### Agradecimentos

Não há palavras que possam expressar minha gratidão por poder ter tido a oportunidade de trabalhar com o professor Dr. Severino Toscano do Rego Melo, meu orientador.

Gostaria de agradecer à professora Cristina Cerri, minha co-orientadora, que tantas vezes me ajudou a clarear as idéias.

À professora Marina Pizzotti, por sua ajuda em Teoria da Integração.

A tantos outros professores que, de um modo ou de otro, me ajudaram a concluir este trabalho.

Aos amigos tão queridos Pablo, Hernán, Liane, Daniel, Marcelo, Irene, Zé, Carolina, Marcel, Raul, Maité, Aldo, Bárbara, que me deram seu carinho e seu apoio todos estes anos.

A Cecilia Tosar, minha amiga, minha companheira, por estar sempre por perto e me ajudar tanto, não só na digitação final da tese, mas também em várias ocasiões em minha vida.

A Fernando Abadie, um grande amigo, que me ajudou tantas vezes discutindo matemática comigo. E à sua esposa, Daniella, que sempre teve palavras doces para mim.

A meus amigos no Uruguay, Gerardo, Yolanda, Mauro, Fernando que, a pesar de morar longe, sempre estiveram próximos.

A meu pai, professor Dr. Héctor Merklen, que me ajudou discutindo problemas e a quem devo a digitação da tese.

A minha mãe, professora Dra. Ana María Olivera Yamín, quem sempre me acompanhou e me ajudou.

A minha irmã, Alejandra, que sempre foi carinhosa comigo.

A minha família, em fim, sem a qual não sou nada, não pertenço a nada, que tanto me abrigou e me ajudou nestes anos e em toda minha vida.

Finalmente, a todos aqueles que não tive oportunidade de mencionar, mas com quem tive oportunidade de compartilhar minha vida nestes anos, muito obrigada.

#### Resumo

Trabalhamos com funções definidas em  $\mathbb{R}^n$  que tomam valores numa  $C^*$ -álgebra A. Consideramos o conjunto  $S^A(\mathbb{R}^n)$  das funções de Schwartz, (de decrescimento rápido), com norma dada por  $||f||_2 = ||\int f(x)^* f(x) dx||^{\frac{1}{2}}$ . Denotamos por  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  o conjunto das funções  $C^{\infty}$  com todas as suas derivadas limitadas. Provamos que os operadores pseudo-diferenciais com símbolo em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  são contínuos em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  com a norma  $||\cdot||_2$ , fazendo uma generalização de [10]. Rieffel prova em [1] que  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  age em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  por meio de um produto deformado, induzido por uma matriz antisimétrica, J, como segue:  $L_Fg(x) = F \times_J g(x) = \int e^{2\pi i u v} F(x + Ju) g(x + v) du dv$ , (integral oscilatória).

Dizemos que um operador S é Heisenberg-suave se as aplicações  $z \mapsto T_{-z}ST_z$  e  $\zeta \mapsto M_{-\zeta}SM_{\zeta}, \ z, \zeta \in \mathbb{R}^n$ , são  $C^{\infty}$ ; onde  $T_zg(x) = g(x-z)$  e  $M_{\zeta}g(x) = e^{i\zeta x}g(x)$ . No final do capítulo 4 de [1], Rieffel propõe uma conjectura: que todos os operadores "adjuntáveis" em  $S^A(\mathbb{R}^n)$ , Heisenberg-suaves, que comutam com a representação regular à direita de  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ ,  $R_Gf = f \times_J G$ , são os operadores do tipo  $L_F$ . Provamos este resultado para o caso A = C, [14], usando a caracterização de Cordes [17] dos operadores Heisenberg-suaves em  $L^2(\mathbb{R}^n)$  como sendo os operadores pseudo-diferenciais com símbolo em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$ . Também é provado neste trabalho que, se vale uma generalização natural da caracterização de Cordes, a conjectura de Rieffel é verdadeira.

#### Abstract

We work with functions defined on  $\mathbb{R}^n$  with values in a  $C^*$ -algebra A. We consider the set  $S^A(\mathbb{R}^n)$  of Schwartz functions (rapidly decreasing), with norm given by  $||f||_2 = ||\int f(x)^* f(x) dx||^{\frac{1}{2}}$ . We denote  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  the set of functions which are  $C^{\infty}$  and have all their derivatives bounded. We prove that pseudo-differential operators with symbol in  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  are continuous on  $S^A(\mathbb{R}^n)$  with the norm  $||\cdot||_2$ , thus generalizing the result in [10]. Rieffel proves in [1] that  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  acts on  $S^A(\mathbb{R}^n)$  through a deformed product induced by an anti-symmetric matrix, J, as follows:  $L_Fg(x) = F \times_J g(x) = \int e^{2\pi i u v} F(x + Ju) g(x + v) du dv$  (an oscillatory integral).

We say that an operator S is Heisenberg-smooth if the maps  $z \mapsto T_{-z}ST_z$  and  $\zeta \mapsto M_{-\zeta}SM_{\zeta}$ ,  $z,\zeta \in \mathbb{R}^n$  are  $C^{\infty}$ ; where  $T_zg(x)=g(x-z)$  and where  $M_{\zeta}g(x)=e^{i\zeta x}g(x)$ . At the end of chapter 4 of [1], Rieffel proposes a conjecture: that all "adjointable" operators in  $S^A(\mathbb{R}^n)$  that are Heisenberg-smooth and that commute with the right-regular representation of  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n,A)$ ,  $R_Gf=f\times_J G$ , are operators of type  $L_F$ . We proved this result for the case  $A=\mathbb{C}$  in [14], using Cordes´ characterization of Heisenberg-smooth operators on  $L^2(\mathbb{R}^n)$  as being the pseudo-differential operators with symbol in  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$ . It is also proved in this thesis that, if a natural generalization of Cordes´ characterization is valid, then the Rieffel conjecture is true.

# Sumário

Introdução	1
Capítulo 1	4
Capítulo 2	. 19
Capítulo 3	. 26
Capítulo 4	.36
Apêndice A	. 49
Apêndice B	. 59
Referências Bibliograficas	.61

### Introdução

Consideramos uma  $C^*$ -álgebra, A, e funções de  $\mathbb{R}^n$  em A. Em particular, trabalhamos com o conjunto das funções de Schwartz,  $S^A(\mathbb{R}^n)$ , que consiste nas funções  $f:\mathbb{R}^n\to A,\ C^\infty$ , tais que  $\sup_{x\in\mathbb{R}^n}\|x^\alpha\partial^\beta f(x)\|$  é limitado para quaisquer multifindices  $\alpha$  e  $\beta$ , [1, capítulo 3]. Neste conjunto definimos o "produto interno"  $< f,g>=\int f(x)^*g(x)dx$ , [1, (4.1)].  $S^A(\mathbb{R}^n)$ , com a norma induzida por este produto interno,  $\|f\|_2=\|< f,f>\|^{\frac{1}{2}}$ , é um pré-módulo de Hilbert (ver definição 1.2). Denotamos por  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  o módulo de Hilbert correspondente, isto é o completamento de  $S^A(\mathbb{R}^n)$  com respeito a esta norma.

Observamos que o espaço de Fréchet  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ , das funções  $C^{\infty}$  limitadas, com todas as derivadas limitadas, age em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  do seguinte modo: dadas  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  e  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,  $L_F(g) = F \times_J g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , como vemos em  $[\mathbf{1}, (3.3)]$ . Aqui Rieffel define o produto deformado,  $\times_J$ , para uma matriz,  $J, n \times n$ , anti-simétrica, em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ , como segue:  $F \times_J G(x) = \int \int F(x + Ju)G(x + v)e(u \cdot v)dudv$ , onde  $e(u \cdot v) = exp(2\pi iu \cdot v)$  e a integral acima é uma integral oscilatória,  $[\mathbf{1}, (1.3)]$ . O operador  $L_F$  definido acima possui "adjunto",  $[\mathbf{1}, (4.2)]$ , (com respeito ao "produto interno" acima definido), e é contínuo no módulo de Hilbert  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ ,  $[\mathbf{1}, (4.7)]$ .

Seja  $B^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  o conjunto dos operadores lineares contínuos em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  que possuem adjunto. Como no caso escalar,  $[\mathbf{2}, \operatorname{capítulo 8}]$ , consideramos em  $B^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  a ação do grupo de Heisenberg como segue:  $(z, \zeta, \varphi) \mapsto E_{z,\zeta,\varphi} \Lambda E_{z,\zeta,\varphi}^{-1}$ ,  $z, \zeta \in \mathbb{R}^n, \varphi \in \mathbb{R}$ , para  $\Lambda \in B^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$ , onde  $E_{z,\zeta,\varphi} = e^{i\varphi} M_{\zeta} T_z$ , com  $T_z u(x) = u(x-z)$ ,  $M_{\zeta} u(x) = e^{\zeta x} u(x)$ ,  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Notamos que  $E_{z,\zeta,\varphi}^{-1} \Lambda E_{z,\zeta,\varphi}$  independe de  $\varphi$ . Tomamos, então,  $\varphi = 0$  e usamos a notação  $E_{z,\zeta} = E_{z,\zeta,0}$  e  $\Lambda_{z,\zeta} = E_{z,\zeta}^{-1} \Lambda E_{z,\zeta}$ . Dizemos que o operador  $\Lambda$  é Heisenberg-suave se a aplicação  $(z,\zeta) \mapsto \Lambda_{z,\zeta}$   $((z,\zeta) \in \mathbb{R}^{2n})$  é  $C^{\infty}$ .

Assim como definimos a ação à esquerda de  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  por  $L_F(g) = F \times_J g$ , podemos definir a ação à direita de  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  por  $R_G(f) = f \times_J G$ ,  $G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  e  $f \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .  $R_G$  é um operador contínuo no espaço de Banach  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , embora não seja homomorfismo de módulos à direita.

No final do capítulo 4 de [1], Rieffel propõe uma questão que podemos enunciar do seguinte modo: o conjunto dos operadores em  $B^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$ , Heisenberg-suaves, que comutam com  $R_G$ , para toda  $G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ , é o conjunto dos operadores  $L_F$ ,  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ .

No primeiro capítulo deste trabalho demonstramos esta conjectura para o caso em que A é a  $C^*$ -álgebra dos números complexos, [14]. Para isto, usamos a caracterização feita por Cordes em [17] dos operadores lineares contínuos em  $L^2(\mathbb{R}^n)$  (no caso em que  $A = \mathbb{C}$ ,  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)} = L^2(\mathbb{R}^n)$ ) que são Heisenberg-suaves. Cordes prova que estes são os operadores a(x,D), dados por um símbolo, uma função  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$ , do seguinte modo:  $a(x,D)u(x) = \int \int (2\pi)^{-n}e^{i(x-y)\xi}a(x,\xi)u(y)dyd\xi$ , onde  $u \in C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ . Provamos, então, que, se a(x,D) comuta com  $R_G$  para toda G em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ , então se F(x) = a(x,0),  $a(x,D) = L_F$ .

No capítulo 2, precisamos supor que A é separável para provar um resultado interessante. Na verdade, se A tiver unidade, a separabilidade não é necessária, pois só a necessitamos para ter uma aproximação da unidade em A dada por uma seqüência. Dizemos que um operador  $\Lambda$  em  $B^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  é suave por translações se a aplicação  $z \mapsto \Lambda_z, \ z \in \mathbb{R}^n$  é  $C^{\infty}$ , onde temos que  $\Lambda_z = T_z^{-1}\Lambda T_z$ , usando a notação anterior. Neste capítulo, provamos que se  $\Lambda$  é suave por translações e comuta com  $R_g$  para qualquer g em  $S^A(\mathbb{R}^n)$ , então  $\Lambda$  é Heisenberg-suave.

O capítulo 3 consiste em uma generalização do teorema de Calderón-Vaillancourt, [10], baseada no teorema 3.14 de [11]. Provamos que um operador no módulo  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  dado por um símbolo (como no caso escalar, [2]) é contínuo. Aqui estamos nos referindo aos operadores  $a(x,D),\ a\in CB^\infty(\mathbb{R}^{2n},A)$  dados por  $a(x,D)u(x)=\int\int (2\pi)^{-n}e^{i(x-y)\xi}a(x,\xi)u(y)dyd\xi$ , para  $u\in S^A(\mathbb{R}^n)$ . A integral acima é uma integral oscilatória. Novamente supomos que A é separável, para poder aplicar o Teorema de Convergência Dominada, e outras propriedades, para a integral de Bochner, [13, (E.6)], e também para usar que a transformada de Fourier é um operador "unitário" em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  (ver apêndice B) e que  $S^A(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $L^2(\mathbb{R}^n,A)$  (ver apêndice A).

Usando os resultados dos capítulos 2 e 3, no capítulo 4, provamos que uma gene - ralização natural, para uma  $C^*$ -álgebra separável qualquer, A, da caracterização de Cordes implicaria que a conjectura de Rieffel é verdadeira. Isto generaliza os resultados

de [14]; lá nós provamos que a caracterização de Cordes implica a conjectura de Rieffel, no caso  $A=\mathbb{C}$ , através de um argumento que usa o núcleo de Schwartz de um operador pseudo-diferencial. No capítulo 4, os argumentos que envolvem distribuições temperadas no capítulo 1, serão substituídos pela proposição 4.11, que se trata, na verdade, de uma extensão imediata, para o caso A qualquer, de um trecho da demonstração na caracterização de Cordes.

# Capítulo 1

Neste capítulo vamos apresentar a conjectura proposta por Rieffel no final de [1, Capítulo 4] para uma  $C^*$ -álgebra qualquer e veremos uma resposta para o caso da  $C^*$ -álgebra dos números complexos.

Seja A uma  $C^*$ -álgebra. Consideremos o espaço das funções contínuas e limitadas de  $\mathbb{R}^n$  em A, que possuem derivadas de todas as ordens que são contínuas e limitadas.

$$CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A) = \{ F : \mathbb{R}^n \longrightarrow A; \|\partial^{\alpha} F\|_{\infty} \le \infty, \forall \alpha \},$$

onde  $\alpha$ é um multi-índice,  $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\in I\!\!N^n$ e

$$\partial^{\alpha} F = \partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \cdots \partial^{\alpha_n} F.$$

$$\|\partial^{\alpha} F\|_{\infty} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|\partial^{\alpha} F(x)\|,$$

onde esta última é a norma em A.

Consideremos em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  as seminormas

$$||F||_j = \sup_{|\alpha| \le j} ||\partial^{\alpha} F||_{\infty},$$

onde  $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$ .

Deste modo vemos que  $CB^{\infty}(I\!\!R^n,A)$  é um espaço de Fréchet.

Dada J, uma matriz anti-simétrica  $n \times n$ , definimos o produto deformado  $\times_J$  em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  como segue:

$$F \times_J G(x) = \int F(x + Ju)G(x + v)e^{iu \cdot v} du dv,$$

onde  $du = (2\pi)^{-\frac{n}{2}}du$ ,  $dv = (2\pi)^{-\frac{n}{2}}dv$ . Notemos que a rigor, considerando a definição de Rieffel do capítulo 3 de [1], nosso  $\times_J$  é seu  $\times_{2\pi J}$ .

A integral acima é uma integral oscilatória. Isto é, se temos  $\psi_m \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ , que satisfaz

- (i)  $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial^{\alpha} \psi_m(x)| < c_{\alpha}$ , para cada multi-índice  $\alpha$ , para todo  $m \in \mathbb{N}$ , onde  $c_{\alpha} \in \mathbb{R}^+$  é uma constante que depende só de  $\alpha$ .
- (ii)  $\psi_m(x) = 1$ , se x pertence à bola de centro na origem e raio  $r_m$ ,  $B(O, r_m)$ , onde  $r_m$  cresce para infinito;

e também  $\psi'_k \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ , que satisfaz (i) e (ii), então

$$\int F(x+Ju)G(x+v)e^{iu\cdot v}dudv = \lim_{k,m\to\infty} \int \int F(x+Ju)G(x+v)\psi_m(u)\psi_k'(v)e^{iu\cdot v}dudv.$$

Prova-se que o limite existe e é independente da escolha de  $\psi_m$  e  $\psi_k'$  ([1, (2.4)]).

O produto deformado está bem definido em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  ([1, 2.2]).

**Proposição 1.1.** Dadas  $F,G\in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n,A)$ , temos que

$$F \times_J G(x) = \int e^{iu(x-v)} F(x-Ju) G(v) dv du.$$

Demonstração. Pelo visto acima, temos que

$$F \times_J G(x) = \lim_{m,k} \int \int e^{iuw} F(x+Ju) G(x+w) \psi_m(u) \psi_k'(w) du dw =$$

$$= \lim_{m,k\to\infty} \int \int e^{iu(v-x)} F(x+Ju) G(v) \psi_m(u) \psi_k'(v-x) du dv =$$

$$= \lim_{m,k\to\infty} \int \int e^{-iu(v-x)} F(x-Ju) G(v) \psi_m(-u) \psi_k'(v-x) dv du$$

pela proposição A.18 e pelo Teorema de Fubini. Para x fixo,  $\psi_m(-u)$  e  $\psi'_k(v-x)$  satisfazem as condições (i) e (ii) acima, então temos:

$$F \times_J G(x) = \int e^{iu(x-v)} F(x - Ju) G(v) du dv. \quad \blacksquare$$

Interessa-nos  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  agindo num espaço com produto interno. Assim, vamos considerar as funções de Schwartz. Seja  $S^A(\mathbb{R}^n)$  o subespaço de  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  das funções tais que o produto de suas derivadas por polinômios em  $\mathbb{R}^n$  são limitadas.

$$S^A(\mathbb{R}^n) = \{ f : \mathbb{R}^n \to A / \|x^\alpha \partial^\beta f\|_\infty < \infty \}$$

para  $\alpha$  e  $\beta$  multi-índices.

Dadas  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  e  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , prova-se que  $F \times_J g$  e  $g \times_J F$  estão em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  ([1, 3.3]).

**Definição 1.2.** Um *pré-módulo de Hilbert* sobre A é um espaço vetorial sobre C, E, que é também um módulo à direita equipado com uma aplicação  $<\cdot,\cdot>: E\times E\to A$  que é linear na segunda variável e satisfaz, para  $a\in A, x,y\in E$ , as seguintes propriedades:

- (i) < x, ya > = < x, y > a
- (ii) < x, y > \* = < y, x >
- (iii)  $< x, x > \ge 0$
- (iv) se < x, x > = 0, então x = 0.

Em *E* definimos  $||x|| = || < x, x > || \frac{1}{2}, \quad x \in E.$ 

Prova-se que assim E é um espaço normado ([7, lema 1.1.2]). Se E é completo com respeito a esta norma, dizemos que E é um m'odulo de Hilbert.

Nota 1.3. Podemos ler mais sobre módulos de Hilbert em [7, capítulo 1].

Consideremos em  $S^A(I\!\!R^n)$  o produto interno

$$\langle f, g \rangle = \int f(x)^* g(x) dx.$$

É fácil ver que  $S^A(\mathbb{R}^n)$  com este produto interno é um pré-módulo de Hilbert sobre A. A norma correspondente é

$$||f||_2 = || < f, f > ||^{\frac{1}{2}}, \qquad f \in S^A(\mathbb{R}^n).$$

Denotemos por L a ação à esquerda de  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n,A)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  dada pelo produto deformado como segue:

$$L_F g = F \times_J g$$
  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A), g \in S^A(\mathbb{R}^n).$ 

Vemos em [1, (4.7)] que  $L_F$  é um operador contínuo em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  como pré-módulo de Hilbert. No capítulo 3 deste trabalho, veremos uma demonstração do Teorema de Calderón-Vaillancourt [10] para operadores pseudo-diferenciais com símbolo tomando valores em A, que também implica que  $L_F$  é contínuo.

Além disso, o operador  $L_F$  é "adjuntável", isto é, existe  $(L_F)^*$ , operador limitado em  $S^A(\mathbb{R}^n)$ , tal que  $< L_F u, v > = < u, (L_F)^* v >$ , para todo  $u, v \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . De fato, denotando por  $F^*$  a função  $F^*(x) = F(x)^*$ , demonstra-se (ver  $[\mathbf{1}, (4.2)]$ ) que  $(L_F)^* = L_{F^*}$ .

Do mesmo modo, denotemos por R a ação à direita de  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$ :

$$R_G f = f \times_I G$$
  $f \in S^A(\mathbb{R}^n), \ G \in CB^\infty(\mathbb{R}^n, A).$ 

Observemos que  $R_G$  não é um homomorfismo no módulo de Hilbert  $S^A(\mathbb{R}^n)$ , pois, dado  $a \in A$ ,

$$R_G(fa)(x) = \int f(x+Ju)aG(x+v)e^{iu\cdot v}dudv$$
  $R_G(f)a(x) = \int f(x+Ju)G(u+v)ae^{iu\cdot v}dudv.$ 

Ou seja, se A não é comutativa, não vale necessáriamente que  $R_G(f)a = R_G(fa)$ .

Como feito em [1, (4.4)], temos que, dada  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , o operador  $R_g$  é contínuo no espaço de Banach  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , o completamento de  $S^A(\mathbb{R}^n)$  com a norma  $\|\cdot\|_2$ .

Denotemos com  $\mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  os operadores em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  que possuem adjunto. Como feito por Cordes, para o caso  $A = \mathbb{C}$  ([2, Cap.8,Sec.2]), consideremos a ação do grupo de Heisenberg em  $\mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$ . O Grupo de Heisenberg é o espaço  $\mathbb{R}^{2n+1}$  equipado com a operação

$$(z,\zeta,\varphi)\circ(z',\zeta',\varphi')=(z+z',\zeta+\zeta',\varphi+\varphi'-\zeta'z),$$

unidade =(0, 0, 0).

Para  $z, \zeta \in \mathbb{R}^n$ , sejam os operadores  $T_z, M_\zeta \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  dados por

$$T_z f(x) = f(x - z)$$

$$M_{\zeta}f(x) = e^{i\zeta x}f(x)$$

para  $f \in S^A(I\!\!R^n)$ . Notemos que  $T_z$  e  $M_\zeta$  são "unitários" com respeito ao "produto interno"  $<\cdot,\cdot>$ .

Observemos que vale

$$T_{-z}M_{\zeta}T_{z}M_{-\zeta}=e^{iz\zeta} \quad M_{\zeta}^{*}=M_{-\zeta} \quad T_{z}^{*}=T_{-z}$$

Assim, o sub-grupo dos operadores unitários em  $\mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  gerado pelos operadores  $T_z$  e  $M_\zeta$ , GH, consiste no conjunto dos operadores

$$E_{z,\zeta,\varphi} = e^{i\varphi} M_{\zeta} T_z, \qquad \varphi \in \mathbb{R}, \ z,\zeta \in \mathbb{R}^n.$$

Deste modo, temos uma aplicação do grupo de Heisenberg em GH, bem definida (não injetora), que a cada  $(z, \zeta, \varphi) \in \mathbb{R}^{2n+1}$  associa o operador  $E_{z,\zeta,\varphi}$ . A partir de agora, estaremos pensando no grupo GH quando mencionarmos o grupo de Heisenberg.

Consideremos então a ação do grupo de Heisenberg em  $\mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  por conjugação. Para  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  seja  $T_{z,\zeta} = E_{z,\zeta,\varphi}^{-1}TE_{z,\zeta,\varphi}$ .

Observemos que  $T_{z,\zeta}$  independe de  $\varphi$ . De agora em diante tomemos  $\varphi = 0$  e denotemos por  $E_{z,\zeta}$  o operador  $E_{z,\zeta,0}$ . No final de [1, Cap.4], Rieffel faz uma conjectura que, no presente contexto, pode ser enunciada como segue:

O conjunto dos operadores  $L_F$  com F em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  é o conjunto dos operadores adjuntáveis em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  que são suaves pela ação do grupo de Heisenberg e comutam com  $R_G$  para toda G em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ , ou seja os operadores  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  tais que a aplicação  $(z, \zeta) \to T_{z,\zeta}$  é  $C^{\infty}$  para  $(z, \zeta) \in \mathbb{R}^{2n}$  e  $[T, R_G] = 0$ ,  $\forall G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ .

**Definição 1.4.** Dado  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$ , dizemos que T é Heisenberg-suave se a aplicação  $(z,\zeta) \to T_{z,\zeta}$  é  $C^{\infty}$ , para  $(z,\zeta) \in \mathbb{R}^{2n}$ .

**Proposição 1.5.** Dada  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ , o operador  $L_F$  é Heisenberg-suave.

**Demonstração.** Dada  $g \in S^A(I\!\!R^n)$ , temos, pela proposição 1.1

$$L_F g(x) = \int e^{iu(x-v)} F(x-Ju) g(v) dv du.$$

Para  $z, \zeta \in \mathbb{R}^n$ , por argumentos similares aos usados na proposição 1.1,

$$\begin{split} E_{z,\zeta}^{-1}L_FE_{z,\zeta}g(x) &= T_{-z}M_{-\zeta}L_FE_{z,\zeta}g(x) = e^{-i\zeta(x+z)}L_FE_{z,\zeta}g(x+z) = \\ &= e^{-i\zeta(x+z)}L_FE_{x,\zeta}g(x+z) = e^{-i\zeta(x+z)}\int e^{iu(x+z-v)}F(x+z-Ju)E_{z,\zeta}g(v)dvdu = \\ &= e^{-i\zeta(x+z)}\int e^{iu(x+z-v)}F(x+z-Ju)e^{i\zeta v}g(v-z)dvdu = \\ &= e^{-i\zeta(x+z)}\int e^{iu(x-w)}F(x+z-Ju)e^{i\zeta(w+z)}g(w)dwdu = \\ &= e^{-i\zeta x}\int e^{iux}e^{-iw(u-\zeta)}F(x+z-Ju)g(w)dwdu = \\ &= e^{-i\zeta x}\int e^{i(\xi+\zeta)x}e^{-iw\xi}F(x+z-J(\xi+\zeta))g(w)dwd\xi = \\ &= \int e^{i\xi(x-w)}F(x+z-J(\xi+\zeta))g(w)dwd\xi. \end{split}$$

(Notemos que esta manipulação formal é válida também para integrais oscilatórias.)

Consideremos o quociente:

$$\frac{(L_F)_{x+te_j,\zeta} - (L_F)_{z,\zeta}}{t} = \frac{E_{z,\zeta}^{-1}(L_F)_{te_j,0}E_{z,\zeta} - E_{z,\zeta}^{-1}L_FE_{z,\zeta}}{t} = E_{z,\zeta}^{-1}\left[\frac{(L_F)_{te_j,0} - L_F}{t}\right]E_{z,\zeta},$$

onde  $e_j = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ .

E, pelo visto acima,

Por [1, (4.7)] temos que existem  $k \in \mathbb{N}$  e uma constante  $c_k \in \mathbb{R}^+$ , tais que  $||L_G|| \le c_k ||G||_{2k}$ , para toda  $G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ . Sejam  $H_t(y) = \frac{F(y+te_j)-F(y)}{t}$  e  $\partial_{e_j}F(y) =$ 

 $\lim_{t\to 0} H_t(y)$ . Como  $F\in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n,A)$ , temos que para todo  $l\in \mathbb{N}$ ,  $\lim_{t\to 0}\|H_t-\partial_{e_j}F\|_l=0$ . De fato, dado  $l\in \mathbb{N}$ ,  $\|H_t-\partial_{e_j}F\|_l=\sup_{|\alpha|\leq l}\|\partial^{\alpha}(H_t-\partial_{e_j}F)\|_{\infty}$ . Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, A.14,

$$H_{t}(y) - \partial_{e_{j}}F(y) = \frac{F(y + te_{j}) - F(y)}{t} - \partial_{e_{j}}F(y) =$$

$$= \int_{[0,t]} \left[ \frac{\partial_{e_{j}}F(y + he_{j})}{t} - \partial_{e_{j}}F(y) \right] dh = \int_{[0,t]} \frac{1}{t} [\partial_{e_{j}}F(y + he_{j}) - \partial_{e_{j}}F(y)] dh =$$

$$= \int_{[0,t]} \frac{1}{t} \int_{[0,h]} \partial_{e_{j}}^{2}F(y + se_{j}) ds dh.$$

Logo,  $||H_t(y) - \partial_{e_j} F(y)|| \le t ||\partial_{e_j}^2 F||_{\infty}, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$ 

De modo análogo, temos que

$$\|\partial^{\alpha}(H_t - \partial_{e_j}F)\|_{\infty} \le t\|\partial^2_{e_j}\partial^{\alpha}F\|_{\infty}, \quad |\alpha| \le l,$$

e, assim,  $\lim_{t\to 0} ||H_t - \partial_{e_j} F||_l = 0$ ,  $\forall l \in \mathbb{N}$ .

Deste modo,  $||L_{H_t} - L_{\partial_{e_j}F}|| \le c_k ||H_t - \partial_{e_j}F||_{2k}$  e, portanto,  $\lim_{t\to 0} ||L_{H_t} - L_{\partial_{e_j}F}|| = 0$ , o que implica que existe a derivada parcial  $\partial_{z_j}(L_F)_{z,\zeta} = L_{\partial_{e_j}F}$ . Como obtivemos um operador do mesmo tipo, o processo pode ser repetido indefinidamente. Logo,  $L_F$  é Heisenberg-suave.

**Proposição 1.6.** Dadas  $F, G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ , quaisquer,  $[L_F, R_G] = 0$ .

**Demonstração.** Consideremos  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

$$L_F R_G u = F \times_J R_G u = F \times_J (u \times_J G)$$

$$R_G L_F u = L_F u \times_J G = (F \times_J u) \times_J G.$$

Como o producto deformado é associativo ([1, 2.14]), temos  $[L_F, R_G] = 0$ .

1.7. Deste modo, dado  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ , temos que  $L_F$  é um operador Heisenbergsuave que comuta com  $R_G$  para todo  $G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ .

**Observação 1.8.** Pelo visto na proposição 1.1,  $L_Fg(x) = \int e^{iu(x-v)} F(x-Ju)g(v) dv du$ 

Demonstraremos a seguir a conjectura proposta por Rieffel para o caso em que a  $C^*$ -álgebra é o conjunto dos números complexos.

Observemos que se  $A = \mathbb{C}$ ,  $S^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n)$  é o conjunto das funções de Schwartz  $S(\mathbb{R}^n)$ , a norma  $\|\cdot\|_2$  é a norma de  $L^2(\mathbb{R}^n)$  e  $\overline{S(\mathbb{R}^n)} = L^2(\mathbb{R}^n)$ .

Notação 1.9.  $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$ .

**Teorema 1.10.** . Dadas  $A \in B(\mathcal{H})$  e J, matriz  $n \times n$  anti-simétrica, A é Heisenbergsuave e  $[A, R_G] = 0 \ \forall G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  se e somente se existe  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  tal que  $A = L_F$ .

Cordes fez uma caracterização dos operadores suaves pela ação do grupo de Heisenberg ([17]):  $A \in B(\mathcal{H})$  é Heisenberg-suave se, e somente se, existe uma função  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$  tal que  $Au(x) = \int e^{i(x-y)\xi}a(x,\xi)u(y)dyd\xi$ , onde  $dy = (2\pi)^{-n/2}dy$  e  $u \in C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ . A função a é chamada de símbolo de A e o operador A é um operador pseudodiferencial. Ressaltamos que a integral acima é uma integral oscilatória. Além disso, prova-se facilmente que  $Au \in S(\mathbb{R}^n)$ . O teorema de Calderón-Vaillancourt [10] mostra que A pode ser estendido a um operador em  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ , [2, Capítulo 8, secção 1].

Pelo visto na observação 1.8, é fácil ver que o operador  $L_F$ , onde  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ , é um operador pseudo-diferencial com símbolo  $\tilde{F} \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$  com  $\tilde{F}(x,\xi) = F(x-J\xi)$ .

Vejamos agora um resultado que estabelece uma relação entre um operador pseudodiferencial e seu símbolo.

Observemos primeiramente que podemos ver  $S(\mathbb{R}^n)$  como um sub-conjunto de  $S'(\mathbb{R}^n)$ , o conjunto das distribuições temperadas, como segue: cada  $f \in S(\mathbb{R}^n)$  determina um funcional linear contínuo em  $S(\mathbb{R}^n)$ , F, dado por:

$$\langle F,g \rangle = \int fg \ para \ g \in S(I\!\!R^n)$$

([3, cap.8, sec.5(i)]).

**Definição 1.11.** Uma função  $f \in C(\mathbb{R}^n)$  é dita de *crescimento polinomial* se existe  $N \ge 0$  tal que  $(1+|x|)^{-N}f$  é limitada.

**Proposição 1.12.** Existe um isomorfismo T em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$  tal que todo  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ , opera -dor pseudo-diferencial com símbolo  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$ , satisfaz

$$< T(a), u \otimes v > = < Av, u >$$
  $u, v \in S(\mathbb{R}^n),$ 

onde  $u \otimes v$  denota a função  $u \otimes v(x,y) = u(x)v(y)$ .

**Demonstração.** Sejam  $\varphi, \psi : S(\mathbb{R}^{2n}) \to S(\mathbb{R}^{2n})$  dadas por

$$\varphi(f)(x,y) = f(x,x-y)$$
$$\psi(f)(x,y) = (2\pi)^{-n} \int e^{iy\xi} f(x,\xi) d\xi.$$

 $\varphi, \psi$  são isomorfismos.

Seja  $T = \varphi \circ \psi$ .

$$< T(f), g >= \int \varphi \circ \psi(f)(x, y)g(x, y)dxdy =$$

$$= \int \psi(f)(x, x - y)g(x, y)dxdy = \int \psi(f)(x, z)g(x, x - z)dxdz =$$

$$= \int (2\pi)^{-n} \left( \int e^{iz \cdot \xi} f(x, \xi)d\xi \right) \varphi(g)(x, z)dxdz =$$

$$= \int f(x, \xi) \left( (2\pi)^{-n} \int e^{iz\xi} \varphi(g)(x, z)dz \right) dxd\xi =$$

$$= \int f(x, \xi)\psi \circ \varphi(g)(x, \xi)dxd\xi = < f, \psi \circ \varphi(g) > .$$

Se  $\tilde{T} = \psi \circ \varphi$ , temos  $< T(f), g > = < f, \tilde{T}(g) >$ . Então, T se estende a um isomorfismo em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$  (ver [3, cap.8,sec.5]), que também chamamos T, definido como segue. Para  $Q \in S'(\mathbb{R}^{2n})$ ,

$$\langle T(Q), g \rangle = \langle Q, \tilde{T}(g) \rangle$$
.

Notemos que T é um operador contínuo em  $S'(I\!\!R^{2n})$  com a topologia fraca \*.

Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$ , a tem crescimento polinomial; logo a define uma distribuição em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$  ([4, V.3]).

Para  $u, v \in S(\mathbb{R}^n)$ ,

$$< T(a), u \otimes v > = < a, \tilde{T}(u \otimes v) > .$$

Е

$$\tilde{T}(u \otimes v)(x,y) = \psi \circ \varphi(u \otimes v)(x,y) = (2\pi)^{-n} \int e^{iy\xi} \varphi(u \otimes v)(x,\xi) d\xi =$$

$$= (2\pi)^{-n} \int e^{iy\xi} (u \otimes v)(x,x-\xi) d\xi = (2\pi)^{-n} \int e^{iy(x-\xi)} (u \otimes v)(x,\xi) d\xi =$$

$$= (2\pi)^{-n} e^{iyx} u(x) \int e^{-iy\xi} v(\xi) d\xi.$$

Então

$$\begin{split} &< a, \tilde{T}(u \otimes v) > = \int a(x,y)(2\pi)^{-n}e^{iyx}u(x)\int e^{-iy\xi}v(\xi)d\xi dx dy = \\ &= \int \left(\int e^{iy(x-\xi)}a(x,y)v(\xi) \not d\xi \not dy\right)u(x) dx = < Av, u > . \blacksquare \end{split}$$

Corolário 1.13. Dado  $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ , operador pseudo-diferencial com símbolo  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ , a aplicação  $a \to A$  é injetora.

**Demonstração.** Pela proposição (1.12) , temos que existe um isomorfismo T em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$  tal que, para  $u,v\in S(\mathbb{R}^n)$  vale  $< T(a),u\otimes v>=< Av,u>$  . Logo, se A=0,  $< T(a),u\otimes v>=0$ . Como  $S(\mathbb{R}^n)\otimes S(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $S(\mathbb{R}^{2n})$ , [8, teorema 51.6], então temos que T(a)=0, o que implica a=0.

Nota 1.14. Citaremos a seguir, na proposição (1.16), o lema 2 de [14], que afirma que existe uma seqüência  $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$  em  $S(\mathbb{R}^n)$  tal que  $L_{e_k}$  converge para a identidade na topologia forte de operadores.

Notação 1.15. Seja  $\mathcal{A}$  o conjunto dos operadores Heisenberg-suaves, A, tais que

$$[A, R_G] = 0$$
  $\forall G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n).$ 

Pela caracterização de Cordes, todo  $A \in \mathcal{A}$  é da forma A = a(x, D) para alguma  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$ .

**Proposição 1.16.** Dado  $A \in \mathcal{A}$ , existe uma sequência  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$  em  $S(\mathbb{R}^n)$  de modo que  $L_{f_k}$  convege para A na topologia forte de operadores.

**Demonstração.** Seja  $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$  uma seqüência em  $S(\mathbb{R}^n)$  tal que  $L_{e_k}$  converge para a identidade na topologia forte de operadores [14, Lema 2]. Como A mantém  $S(\mathbb{R}^n)$  invariante,  $A(e_k) \in S(\mathbb{R}^n)$ . Seja  $f_k = A(e_k)$ .

Dada  $u \in S(\mathbb{R}^n)$ ,

$$L_{f_k}u = f_k \times_J u = Ae_k \times_J u = R_u Ae_k = AR_u e_k = AL_{e_k}u.$$

Assim,  $L_{f_k} = AL_{e_k}$ , pois  $S(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $\mathcal{H}$ ; e, como  $L_{e_k}$  converge para  $I \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$  na topologia forte de operadores, então  $L_{f_k}$  converge para A nesta topologia.

**Proposição 1.17.** Dado  $A \in \mathcal{A}$ , seja  $(F_k)$  uma seqüência de funções em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  de modo que A é limite de  $L_{F_k}$  na topologia forte de operadores. Se a é o símbolo de A e  $a_k$  é o símbolo de  $L_{F_k}$ , então temos  $a_k \longrightarrow a$  em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$ .

Demonstração. Por hipótese vale que

$$L_{F_k}v \longrightarrow Av \qquad \forall v \in H.$$

Logo,

$$\langle L_{F_k}v, u \rangle \longrightarrow \langle Av, u \rangle \qquad \forall u, v \in S(\mathbb{R}^n).$$

Logo, pela proposição (1.12)

$$< T(a_k), u \otimes v > \longrightarrow < T(a), u \otimes v > .$$

ou seja, 
$$< T(a_k) - T(a), u \otimes v > \longrightarrow_{k \to \infty} 0.$$

Queremos provar que, para toda  $h \in S(\mathbb{R}^{2n}), \langle T(a_k) - T(a), h \rangle \longrightarrow_{k \to \infty} 0.$ 

Primeiramente, observemos que, pelo Princípio da Limitação Uniforme,  $\sup ||L_{F_k}|| < \infty$  (ver [6, teorema 2.6]).

Além disso, vemos em [8, teorema 51.6] que  $S(\mathbb{R}^n) \otimes S(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $S(\mathbb{R}^{2n})$ . Pelo corolário anterior ao teorema 51.6, temos que  $S(\mathbb{R}^n)$  é nuclear; logo, pelo feito na segunda página do capítulo 50, temos que  $S(\mathbb{R}^n) \otimes S(\mathbb{R}^n) = S(\mathbb{R}^n) \otimes_{\pi} S(\mathbb{R}^n)$ , onde  $\otimes_{\pi}$  é definido em [8, capítulo 43, definição 43.2].

Assim, pelo teorema 45.1 de [8], temos que dada  $h \in S(\mathbb{R}^{2n})$ , existem seqüências  $(u_j)_{j \in \mathbb{N}}$  e  $(v_j)_{j \in \mathbb{N}}$  em  $S(\mathbb{R}^{2n})$ , convergindo a zero, e  $(\lambda_j)_{j \in \mathbb{N}}$ ,  $\lambda_j \in \mathbb{C}$ , tal que  $\sum_j |\lambda_j| < \infty$ , que satisfazem

$$h = \sum_{j} \lambda_{j} u_{j} \otimes v_{j}.$$

Como visto acima, temos que, para todo j,

$$\lim_{k \to \infty} \langle T(a_k) - T(a), u_j \otimes v_j \rangle = 0.$$

E, considerando que:

- 1.  $< T(a_k) T(a), u_j \otimes v_j > = < (L_{F_k} A)v_j, u_j >,$
- 2.  $(u_i)$  e  $(v_i)$  convergem a zero em  $S(\mathbb{R}^n)$  e, portanto, convergem a zero em  $L^2(\mathbb{R}^n)$ ,
- 3.  $\sup_{k} ||L_{F_k}|| < \infty$ ,

temos que  $\sup_{k,j} |< T(a_k) - T(a), u_j \otimes v_j > | < \infty$ . Portanto, pelo Teorema da Convergência Dominada para séries,  $\lim_{k \to \infty} \sum_j \lambda_j < T(a_k) - T(a), u_j \otimes v_j > = 0$ .

Isto é,  $\lim_{k\to\infty} \langle T(a_k) - T(a), h \rangle = 0$ . Como T é isomorfismo em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$ , temos então que  $(a_k)$  converge para a em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$ .

**Definição 1.18.** Dadas funções  $a, b \in C^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$ , definimos seu *colchete de Poisson* como segue:

$$\{a,b\} = \sum_{j=1}^{n} \left( \frac{\partial a}{\partial x_j} \frac{\partial b}{\partial \xi_j} - \frac{\partial a}{\partial \xi_j} \frac{\partial b}{\partial x_j} \right).$$

**Proposição 1.19.** Dadas  $F, G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  e J matriz anti-simétrica  $n \times n$ , sejam

$$a(x,\xi) = F(x - J\xi)$$

e

$$b(x,\xi) = G(x + J\xi).$$

Então,  $\{a, b\} = 0$ .

Demonstração. Fazendo contas, temos que:

$$\frac{\partial a}{\partial x_i} = \partial_i F \qquad \frac{\partial a}{\partial \xi_i} = \sum_{j=1}^n J_{ij} \partial_j F$$

$$\frac{\partial b}{\partial x_i} = \partial_i G \qquad \frac{\partial b}{\partial \xi_i} = -\sum_{i=1}^n J_{ij} \partial_j G$$

$$\frac{\partial a}{\partial x_i} \frac{\partial b}{\partial \xi_i} - \frac{\partial a}{\partial \xi_i} \frac{\partial b}{\partial x_i} = -\partial_i F \sum_{j=1}^n J_{ij} \partial_j G - \partial_i G \sum_{j=1}^n J_{ij} \partial_j F = \partial_i F \sum_{j=1}^n J_{ji} \partial_j G + \partial_i G \sum_{j=1}^n J_{ji} \partial_j F.$$

Assim,

$$\{a,b\} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (J_{ji}\partial_{i}F\partial_{j}G + J_{ji}\partial_{i}G\partial_{j}F)$$

e  $\{a,b\} = 0$  pois J é anti-simétrica.

**Notação 1.20.** Seja  $\mathcal{P}_B(\mathbb{R}^n)$  o conjunto das funções em  $C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  tais que elas e todas as suas derivadas são de crescimento polinomial.

**Proposição 1.21.** Dadas  $A \in \mathcal{A}$ , com símbolo  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ , e a função  $b(x,\xi) = G(x+J\xi)$ , com  $G \in \mathcal{P}_B(\mathbb{R}^{2n})$ , então  $\{a,b\} = 0$ .

**Demonstração.** Dado  $A \in \mathcal{A}$ , existe uma seqüência $(A_k)_{k \in \mathbb{I} N}$ , onde  $A_k = L_{F_k}$ , com  $F_k \in S(\mathbb{I} R^n)$ , de modo que  $(A_k)_{k \in \mathbb{I} N}$  converge para A na topologia forte de operadores, 1.16. Se  $a_k$  é o símbolo de  $A_k$ , vimos que  $(a_k)_{k \in \mathbb{I} N}$  converge para a em  $S'(\mathbb{I} R^{2n})$  (1.17). Como o símbolo de  $A_k$  é  $F_k(x - J\xi)$ , temos pela proposição anterior que  $\{a_k, b\} = 0$ ,  $\forall k$ .

Como  $b \in \mathcal{P}_B(\mathbb{R}^{2n})$ ,  $\{a_k, b\} \in S'(\mathbb{R}^{2n})$ ,  $\forall k$ . Como  $a_k \longrightarrow a$  em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$ , e como a multiplicação por uma derivada qualquer da função b é uma operação contínua em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$  ([4, V.3]), temos que :

$$\frac{\partial b}{\partial \xi_i} \frac{\partial a_k}{\partial x_i} \longrightarrow \frac{\partial b}{\partial \xi_i} \frac{\partial a}{\partial x_i}$$

е

$$\frac{\partial b}{\partial x_i} \frac{\partial a_k}{\partial \xi_i} \longrightarrow \frac{\partial b}{\partial x_i} \frac{\partial a}{\partial \xi_i}$$

em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$ , e vale que  $\{a_k, b\} \longrightarrow \{a, b\}$  em  $S'(\mathbb{R}^{2n})$ . Como  $\{a_k, b\} = 0$   $\forall k$  temos que  $\{a, b\} = 0$ .

**Lema 1.22.** Seja  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$  que satisfaz  $\{a,b\} = 0$  para qualquer  $b \in \mathcal{P}_B(\mathbb{R}^{2n})$  com  $b(x,\xi) = G(x+J\xi)$ . Então existe  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  tal que  $a(x,\xi) = F(x-J\xi)$ .

**Demonstração.** Seja  $b_i$  a projeção de  $x + J\xi$  na coordenada i,

$$b_i(x,\xi) = x_i + \sum_{k=1}^{n} J_{ik}\xi_k.$$

Assim definida,  $b_i \in \mathcal{P}_B(\mathbb{R}^{2n})$  e, pela proposição anterior, temos  $\{a, b_i\} = 0$ , para todo  $i = 1, \dots, n$ . Logo,

$$\sum_{j=1}^{n} \left( \frac{\partial a}{\partial x_j} J_{ij} - \frac{\partial a}{\partial \xi_j} \delta_{ij} \right) = \sum_{j=1}^{n} J_{ij} \frac{\partial a}{\partial x_j} - \frac{\partial a}{\partial \xi_i} = 0.$$

Ou seja,

$$\frac{\partial a}{\partial \xi_i} = \sum_{j=1}^n J_{ij} \frac{\partial a}{\partial x_j} \qquad i = 1, \dots, n.$$
 (\*)

Portanto, aplicando as idéias de [16, 2.1], temos que

$$a(x,\xi) = a((x,\xi) + s(-J_{i1}, \dots, -J_{in}, e_i)),$$
 (\*\*)

para todo  $(x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}$ , para todo  $s \in \mathbb{R}$ , para qualquer  $i \in \{1,2,\cdots,n\}$ , onde  $\{e_i\}$  é uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^n$ ,  $e_i = (0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)$ .

Agora, em (\*\*), consideremos  $s_1$  em lugar de s, i = 1, e  $(x.\xi) = (x_0, 0)$ :

$$a(x_0,0) = a((x_0,0) + s_1(-J_{11}, \cdots, -J_{1n}, e_1)) = a((x_0,0) + (-J_{11}s_1, \cdots, -J_{1n}s_1, s_1e_1)).$$

Apliquemos (\*\*) novamente para  $s_2$  no lugar de s, i = 2 e  $(x, \xi) = (x_0 - (J_{11}s_1, \dots, J_{1n}s_1), s_1e_1)$ . Assim, temos

$$a(x_0,0) = a(x_0 + (-J_{11}s_1, \cdots, -J_{1n}s_1) + (-J_{21}s_2, \cdots, -J_{2n}s_2), s_1e_1 + s_2e_2).$$

Repetindo o raciocínio para  $i=3,\cdots,n,$  temos

$$a(x_0,0) = a(x_0 - (\sum_{i=1}^n J_{i1}s_i, \dots, \sum_{i=1}^n J_{in}s_n), \sum_{i=1}^n s_ie_i).$$

Como J é anti-simétrica, tomando  $\xi = (s_1, \dots, s_n)$ , temos:

$$a(x_0, 0) = a(x_0 + J\xi, \xi).$$

Seja 
$$F(x) = a(x, 0)$$
. Então  $a(x, \xi) = F(x - J\xi)$ .

Corolário 1.23. Dado  $A \in \mathcal{A}$ , existe  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  tal que  $A = L_F$ .

**Demonstração.** Dado  $A \in \mathcal{A}$ , pela caracterização feita por Cordes dos operadores Heisenberg-suaves, A é um operador pseudo-diferencial. Seja  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$  seu símbolo. Pela proposição (1.21) , dada  $b(x,\xi) = G(x+J\xi)$ , com  $G \in \mathcal{P}_B(\mathbb{R}^n)$ , temos  $\{a,b\}=0$ . Assim, pelo lema (1.22) , existe  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  tal que  $a(x,\xi)=F(x-J\xi)$ . Temos, então, que o operador A tem símbolo  $F(x-J\xi)$ , ou seja,  $A=L_F$ .

Com isto fica provado o Teorema (1.10) e portanto a questão proposta por Rieffel, no caso da  $C^*$ -álgebra ser o conjunto dos números complexos.

# Capítulo 2

Seja A uma C\*-álgebra separável ao longo deste capítulo. Consideremos, novamente, a ação do grupo de Heisenberg em  $\mathcal{B}^*(\overline{S^A(I\!\!R^n)})$ ,

$$(z,\zeta) \to E_{z,\zeta}^{-1} T E_{z,\zeta}$$

onde  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  e  $E_{z,\zeta}u(x) = e^{i\zeta x}u(x-z)$  se  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

Notação 2.1.  $T_{z,\zeta} = E_{z,\zeta}^{-1} T E_{z,\zeta}$ .

**Definição 2.2.** Dizemos que  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  é Heisenberg-suave se a aplicação  $(z,\zeta) \mapsto T_{z,\zeta}$  é  $C^{\infty}$ . Dizemos que  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  é suave por translações se a aplicação  $z \mapsto T_{z,0}$  é  $C^{\infty}$ .

Neste capítulo veremos que dado um operador T em  $\mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  que comuta com qualquer operador  $R_g$  para g em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  (ver capítulo 1), se T é suave por translações então é Heisenberg-suave.

**Lema 2.3.** Seja  $f: \mathbb{R}^n \to A$  uma função contínua tal que  $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x|^l ||f(x)|| < \infty$  para todo inteiro positivo l. Então, dada J, matriz anti-simétrica  $n \times n$ , para cada  $l \in \mathbb{Z}^+$  e para todo  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  de modo que

$$|x|^l ||f(x+J\xi)e^{ix\xi} - f(x)|| < \varepsilon$$

para quaisquer  $x, \xi \in \mathbb{R}^n$  com  $|\xi| < \delta$ .

**Demonstração.** Dados  $\varepsilon > 0$ ,  $l \in \mathbb{Z}^+$ , existe  $R_l \in \mathbb{N}$  tal que se  $|x| > R_l$ ,

$$|x|^l ||f(x)|| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{1}$$

Seja  $d_J$ ,  $0 < d_J \le 1$ , tal que se  $|\xi| < d_J$ ,  $|J\xi| < 1$ . Consideremos

$$X_{f,l} = \{(x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}, |x| \le R_l + 1, |\xi| \le d_J\}.$$

Embora a notação fique um pouco "carregada", consideramos que é necessário para situar mais facilmente o leitor.

 $1^o$  passo: l=0.

Se  $g(x,\xi) = f(x+J\xi)e^{ix\xi}$ , g é uniformemente contínua em  $X_{f,0}$ , pois  $X_{f,0}$  é compacto. Logo, dado  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$ ,  $\delta \le d_J$ , tal que se  $|(x,\xi) - (x',\xi')| < \delta$  e  $(x,\xi), (x',\xi') \in X_{f,0}$ , temos  $||g(x,\xi) - g(x',\xi')|| < \varepsilon$ . Seja, agora,  $(x',\xi') = (x,0)$ . Assim  $|(x,\xi) - (x',\xi')| = |\xi|$ . Portanto, se  $|\xi| < \delta$ ,  $||f(x+J\xi)e^{ix\xi} - f(x)|| < \varepsilon$  para todo  $x \in \mathbb{R}^n$  com  $|x| \le R_0 + 1$ .

Se  $|x| > R_0 + 1$  e  $|\xi| < \delta$ ,  $|x + J\xi| > R_0$  pois  $|J\xi| < 1$ , e temos, por (1):

$$||f(x+J\xi)e^{ix\xi}-f(x)|| \le ||f(x+J\xi)|| + ||f(x)|| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

 $2^o$  passo: l qualquer.

Seja  $h(x) = |x|^l f(x)$ . Pelo primeiro passo, aplicado a h, temos que existe  $\sigma_l \leq d_J$  tal que, se  $|\xi| < \sigma_l$ , então

$$|||x + J\xi|^l f(x + J\xi)e^{ix\xi} - |x|^l f(x)|| < \varepsilon.$$
 (2)

E notemos que, por (2), se  $|\xi| < \sigma_l$ ,

$$|x|^{l} ||f(x+J\xi)e^{ix\xi} - f(x)|| \le |||x+J\xi||^{l} f(x+J\xi)e^{ix\xi} - |x|^{l} f(x)|| + |||x||^{l} f(x+J\xi)e^{ix\xi} - |x+J\xi|^{l} ||f(x+J\xi)e^{ix\xi}|| < \varepsilon + ||x|^{l} - |x+J\xi|^{l} ||f(x+J\xi)||.$$
(3)

Se 
$$(x, \xi) \in X_{f,l}$$
,  $|x + J\xi| \le R_l + 2$ , pois  $|J\xi| < 1$ .

Seja  $K = \sup_{|y| \leq R_l + 2} ||f(y)||$ . Se  $p(x, \xi) = |x + J\xi|^l$ , p é uniformemente contínua em  $X_{f,l}$ . Assim, dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta_l > 0$ ,  $\delta_l \leq \sigma_l$  ( $\delta_l$  depende de l), tal que se

 $(x,\xi),(x',\xi') \in X_{f,l}$  e  $|(x,\xi)-(x',\xi')| < \delta_l$  então  $|p(x,\xi)-p(x',\xi')| < \frac{\varepsilon}{K}$ . Tomando  $(x',\xi')=(x,0)$ , temos  $||x+J\xi|^l-|x|^l|<\frac{\varepsilon}{K}$  para  $|\xi|<\delta_l$  e  $|x|\leq R_l+1$ .

Logo, se  $|\xi| < \delta_l$ , temos  $|x|^l ||f(x+J\xi)e^{ix\xi} - f(x)|| < 2\varepsilon$  para  $|x| \le R_l + 1$ .

Se  $|x| > R_l + 1$ , e  $|\xi| < \delta_l \le \sigma_l \le d_J$ , temos que  $|x + J\xi| > R_l$  pois  $|J\xi| < 1$ . Sem perda de generalidade, consideremos  $R_l > 1$  e teremos:  $|J\xi| < 1 < R_l < |x + J\xi|$ .

Assim

$$|x| = |x + J\xi - J\xi| \le |x + J\xi| + |J\xi| \le 2|x + J\xi|. \tag{4}$$

O lado direito de (3) é, portanto, menor ou igual a

$$|\varepsilon + |x|^{l} ||f(x + J\xi)|| + |x + J\xi|^{l} ||f(x + J\xi)|| \le$$

$$\leq \varepsilon + 2^{l} |x + J\xi|^{l} ||f(x + J\xi)|| + |x + J\xi|^{l} ||f(x + J\xi)|| < \varepsilon + (2^{l} + 1) \frac{\varepsilon}{2},$$

por (1), já que  $|x + J\xi| > R_l$ .

Ou seja, dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta_l > 0$  tal que

$$|x|^{l} ||f(x+J\xi)||e^{ix\xi} - f(x)|| < \varepsilon(2^{l-1} + \frac{3}{2})$$

para  $x, \xi \in \mathbb{R}^n$  com  $|x| > R_l + 1$  e  $|\xi| < \delta_l$ .

Para todo  $\varepsilon'>0$ , seja  $\varepsilon>0$  de modo que  $\varepsilon(2^{l-1}+\frac{3}{2})<\varepsilon'$ , e  $2\varepsilon<\varepsilon'$ .

Assim, temos que, para qualquer  $\varepsilon' > 0$ , existe  $\delta_l > 0$  tal que  $|x|^l ||f(x+J\xi)e^{ix\xi} - f(x)|| < \varepsilon'$ , para todo  $x \in \mathbb{R}^n$  e  $\xi \in \mathbb{R}^n$  com  $|\xi| < \delta_l$ , tendo fixado  $l \in \mathbb{N}$ .

Observação 2.4. Usaremos o lema (2.3) na demonstração da proposição (2.5) do seguinte modo: estaremos considerando a função  $s(x) = (1+|x|)^n$  e vamos provar que, dado  $\varepsilon_1 > 0$ , existe  $\delta > 0$  tal que, se  $|\xi| < \delta$ ,  $s(x)||f(x+J\xi)e^{ix\xi} - f(x)|| < \varepsilon_1$ . Notemos que s(x) é uma soma finita de termos do tipo  $c_l|x|^l$ , onde  $c_l \in \mathbb{Z}^+$  é uma constante, e  $l \in \{0, 1, \dots, n\}$ . Dado qualquer  $\varepsilon_1 > 0$ , escolhemos  $\varepsilon > 0$  de modo que  $\sum c_l \varepsilon < \varepsilon_1$ . Para cada valor de l, aplicamos o lema (2.3). Isto demonstra a afirmação.

**Proposição 2.5.** Dada J, matriz anti-simétrica  $n \times n$ , existe uma seqüência  $(e_k)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  tal que, para toda  $f \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , temos  $\lim_{k\to 0} L_{e_k}(f) = f$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  com  $\|\cdot\|_2$ .

**Demonstração.** Como A é separável, admite uma aproximação da unidade que é uma seqüência ([5, Remark(3.11)]). Seja  $(u_k)_{k \in I\!\!N}$  uma aproximação da unidade para A, com  $u_k \geq 0$  e  $||u_k|| \leq 1$  para todo  $k \in I\!\!N$ .

Seja  $\psi \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n), \psi \geq 0$  tal que o suporte de  $\psi$  está contido na bola unitária,  $(\operatorname{supp}(\psi) \subseteq B(0,1)), \ e \int_{\mathbb{R}^n} \psi(\xi) d\xi = 1.$  Para  $k \in \mathbb{Z}^+$ , seja  $\psi_k(\xi) = k^n \psi(k\xi)$ ; assim  $\operatorname{supp}(\psi_k) \subseteq B(0,\frac{1}{k}).$  Seja  $\phi_k = \psi_k u_k.$  Assim  $\operatorname{supp}(\phi_k) \subseteq B(0,\frac{1}{k})$  e  $\int_{\mathbb{R}^n} \phi_k(\xi) d\xi = u_k.$  Seja  $\varphi_k$  dada por  $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-iy\xi} \varphi_k(y) dy = \phi_k(\xi).$  Como  $\phi_k \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n,A), \varphi_k \in S^A(\mathbb{R}^n).$  Como feito na proposição, 1.1, e, por  $[1, (1.13)], \text{ para } f \in S^A(\mathbb{R}^n) \text{ temos que } R_f(\varphi_k)(x) = \int e^{ix\xi} \phi_k(\xi) f(x+J\xi) d\xi.$ 

Como 
$$\int \phi_k(\xi) f(x) d\xi = u_k f(x)$$
, temos:

$$\|(2\pi)^{\frac{n}{2}}R_f(\varphi_k)(x) - u_k f(x)\| \le \int \|e^{ix\xi}\phi_k(\xi)f(x+J\xi) - \phi_k(\xi)f(x)\|d\xi \le$$
$$\le \int \|\phi_k(\xi)\| \|e^{ix\xi}f(x+J\xi) - f(x)\|d\xi.$$

Pela observação (2.4) temos que, para todo  $\varepsilon>0$  existe  $\delta>0$  tal que, se  $k>\frac{1}{\delta}$ :

$$|s(x)||(2\pi)^{\frac{n}{2}}R_f(\varphi_k)(x) - u_k f(x)|| \le \varepsilon \int_{B(0,\frac{1}{k})} ||\phi_k(\xi)|| d\xi < \varepsilon,$$

pois

$$\int_{B(0,\frac{1}{k})} \|\phi_k(\xi)\| d\xi = \int_{B(0,\frac{1}{k})} \psi_k(\xi) d\xi \|u_k\| \le 1, \text{ para } k > \frac{1}{\delta}.$$

Portanto

$$\|(2\pi)^{\frac{n}{2}}R_f(\varphi_k) - u_k f\|_2^2 \le \int_{\mathbb{R}^n} \|(2\pi)^{\frac{n}{2}}R_f(\varphi_k)(x) - u_k f(x)\|^2 dx \le \varepsilon^2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{s(x)^2} dx. \tag{1}$$

Por outro lado,  $||f - u_k f||_2^2 \le \int ||(f - u_k f)(x)||^2 dx$ . Como  $u_k$  é aproximação da unidade em A, para cada  $x \in \mathbb{R}^n$  temos que  $\lim_{k\to\infty} ||f(x) - u_k f(x)|| = 0$ . Além disso,  $||f(x) - u_k f(x)|| \le 2||f(x)||$ . Como  $2||f(x)|| \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , pelo Teorema da Convergência Dominada, temos que  $\lim_{k\to\infty} \int ||(f - u_k f)(x)||^2 dx = 0$ , o que implica que

$$\lim_{k \to \infty} ||f - u_k f||_2 = 0.$$
 (2)

Portanto, por (1) e (2),  $\lim_{k\to\infty} \|(2\pi)^{\frac{n}{2}} R_f(\varphi_k) - f\|_2 = 0$ . Tomando  $e_k = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \varphi_k$ , temos que  $\lim_{k\to\infty} \|R_f(e_k) - f\|_2 = 0$ .

Observamos que  $R_f(e_k) = e_k \times_J f = L_{e_k}(f)$ . Portanto, temos que para toda  $f \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,  $\lim_{k \to \infty} L_{e_k}(f) = f$  em  $(S^A(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_2)$ .

Usamos agora argumentos semelhantes a [9, secção 1].

**Definição 2.6.** Dada  $F \in \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , para cada  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$  definimos  $L_F(g) = R_g(F)$ . Como  $R_g$  é contínuo em  $(S^A(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_2)$ , se estende a  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , logo  $L_F$  está bem definido, como operador de  $S^A(\mathbb{R}^n)$  em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ .

Corolário 2.7. Dado  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  que comuta com  $R_g$  para qualquer  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , existe  $(F_k)$  em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  tal que  $\lim_{k\to\infty} L_{F_k}(g) = T(g)$ ,  $\forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

**Demonstração.** Pela proposição (2.5) existe uma seqüência  $(e_k)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\lim_{k\to\infty} L_{e_k}(g) = g, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

Por outro lado, temos que  $L_{Te_k}g = R_gTe_k = TR_ge_k = TL_{e_k}g$ . Portanto,

$$\lim_{k\to\infty} L_{T_{e_k}}(g) = T(g), \ \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n).$$

Tomando  $F_k = Te_k$  temos a tese.

**Observação 2.8.** Notemos que o operador  $L_{F_k}$  acima é contínuo para todo  $k \in \mathbb{Z}^+$ , pois  $||L_{F_k}|| = ||L_{Te_k}|| = ||TL_{e_k}|| \le ||T|| ||L_{e_k}||$ .

**Proposição 2.9.** Sejam  $U, V \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  operadores que preservam  $S^A(\mathbb{R}^n)$ . Suponhamos que para toda  $h \in S^A(\mathbb{R}^n)$  vale  $U^*L_hU = V^*L_hV$ . Então, dada  $F \in \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , temos  $U^*L_FU = V^*L_FV$ . Aqui estamos vendo os operadores  $U^*L_FU$  e  $V^*L_FV$  como operadores de  $S^A(\mathbb{R}^n)$  em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , não necessariamente limitados.

**Demonstração.** Dada  $F \in \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , existe uma seqüência  $(h_k)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\lim_{k\to\infty}h_k=F$  em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ . Dada  $g\in S^A(\mathbb{R}^n)$ , como  $R_g$  é contínuo em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , temos

$$L_F(g) = R_g(F) = \lim_{k \to \infty} R_g(h_k).$$

Calculemos (lembrando que  $U(g) \in S^A(I\!\!R^n)$  e  $V(g) \in S^A(I\!\!R^n)$ ):

$$U^*L_F U(g) = U^* \lim_{k \to \infty} R_{U(g)}(h_k) = \lim_{k \to \infty} U^* R_{U(g)}(h_k) =$$

$$= \lim_{k \to \infty} U^* L_{h_k} U(g) = \lim_{k \to \infty} V^* L_{h_k} V(g) = V^* \lim_{k \to \infty} R_{V(g)}(h_k) = V^* L_F V(g). \blacksquare$$

**Lema 2.10.** Dada  $h \in S^A(\mathbb{R}^n)$  vale que  $(L_h)_{z,\zeta} = (L_h)_{z-J\zeta,0}$ .

**Demonstração.** Lembremos que  $(L_h)_{z,\zeta} = E_{z,\zeta}^{-1} L_h E_{z,\zeta}$ , onde  $E_{z,\zeta} = M_{\zeta} T_z$ , com  $M_{\zeta} u(x) = e^{i\zeta x} u(x)$ ,  $T_z(u)(x) = u(x-z)$  para  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$  (ver capítulo 1 e notação (2.1)). Além disso,

$$E_{z,\zeta}^{-1}u(x) = T_{-z}M_{-\zeta}u(x) = e^{-i\zeta(x+z)}u(x+z).$$

Dada  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,

$$\begin{split} \widehat{E_{z,\zeta}(g)}(\xi) &= \int e^{-i\xi y} E_{z,\zeta} g(y) /\!\!\!/ y = \\ &= \int e^{-i\xi y} e^{i\zeta y} g(y-z) /\!\!\!/ y = \int e^{-i(\xi-\zeta)(y+z)} g(y) /\!\!\!/ y = e^{-iz(\xi-\zeta)} \hat{g}(\xi-\zeta). \end{split}$$

Portanto, por [1, (3.1)]

$$\begin{split} (L_h)_{z,\zeta}g(x) &= e^{-i\zeta(x+z)}L_hE_{z,\zeta}g(x+z) = e^{-i\zeta(x+z)}\int e^{i(x+z)\xi}h(x+z-J\xi)\widehat{E_{z,\zeta}g}(\xi) = \\ &= e^{-i\zeta(x+z)}\int e^{ix\xi}e^{i\zeta z}h(x+z-J\xi)\widehat{g}(\xi-\zeta) \not d\xi = e^{-i\zeta x}\int e^{ix(\xi+\zeta)}h(x+z-J(\xi+\zeta))\widehat{g}(\xi) \not d\xi = \\ &= \int e^{ix\xi}h\left(x+z-J\zeta-J\xi\right)\widehat{g}(\xi) \not d\xi. \end{split}$$

Isto é,

$$(L_h)_{z,\zeta}g(x) = \int e^{ix\xi}h(x+z-J\zeta-J\xi)\hat{g}(\xi)d\xi$$

para qualquer  $(z,\zeta) \in \mathbb{R}^{2n}$ .

Logo,

$$(L_h)_{z-J\zeta,0}g(x) = \int e^{ix\xi}h(x+(z-J\zeta)-J\xi)\hat{g}(\xi)d\xi.$$

Portanto, para qualquer  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,  $(L_h)_{z,\zeta}(g) = (L_h)_{z-J\zeta,0}(g)$ . Como  $L_h$  é contínua em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , temos  $(L_h)_{z,\zeta} = (L_h)_{z-J\zeta,0}$ .

Corolário 2.11. Dada  $F \in \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , temos  $(L_F)_{z,\zeta} = (L_F)_{z-J\zeta,0}$ , como operadores de  $S^A(\mathbb{R}^n)$  em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ .

**Demonstração.** Sejam  $U = E_{z,\zeta}$  e  $V = E_{z-J\zeta,0}$ . Notemos que, dada  $h \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , U(h) e V(h) pertencem a  $S^A(\mathbb{R}^n)$ . Logo, por (2.9) e (2.10), temos

$$(L_F)_{z,\zeta} = (L_F)_{z-J\zeta,0}$$
.

**Teorema 2.12.** Seja  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$  com  $TR_g = R_gT$  para toda  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Se T é suave por translações, então T é Heisenberg-suave.

**Demonstração.** Pelo corolário (2.7), temos que existe uma seqüência  $(F_k)$  em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  tal que  $\lim_{k\to\infty} L_{F_k}(g) = T(g)$ ,  $\forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Isto implica que para  $(z,\zeta) \in \mathbb{R}^{2n}$  temos  $\lim_{k\to\infty} (L_{F_k})_{z,\zeta}(g) = T_{z,\zeta}(g)$ ,  $\forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Além disso, pelo (2.11), temos que  $\lim_{k\to\infty} (L_{F_k})_{z,\zeta}(g) = \lim_{k\to\infty} (L_{F_k})_{z-J\zeta,0}(g)$ ,  $\forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Assim,  $T_{z,\zeta}(g) = T_{z-J\zeta,0}(g)$ ,  $\forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$  e, como T é contínua, temos  $T_{z,\zeta} = T_{z-J\zeta,0}$ .

Como T é suave por translações, a aplicação

$$(z,\zeta) \longrightarrow z - J\zeta \longrightarrow T_{z-J\zeta,0}$$

é  $C^{\infty}$ , ou seja  $(z,\zeta) \longrightarrow T_{z,\zeta}$  é  $C^{\infty}$ .

# Capítulo 3

Neste capítulo veremos uma generalização do teorema de Calderón-Vaillancourt [10] para operadores pseudo-diferenciais com símbolos tomando valores numa  $C^*$ -álgebra separável, baseada na demonstração feita por Seiler em [11].

Dadas uma  $C^*$ -álgebra separável A e uma função a em  $CB^\infty(I\!\!R^{2n},A),$  veremos que o operador a(x,D) dado por

(I) 
$$a(x,D)u(x) = \int e^{i(x-y)\xi} a(x,\xi)u(y) dy d\xi \text{ para } u \text{ em } S^A(I\!\!R^n)$$

é contínuo com a norma  $\| \|_2$ ;  $\| u \|_2 = \| \int u(x)^* u(x) dx \|^{\frac{1}{2}}$ .

A integral em (I) deve ser entendida como uma integral oscilatória. Mais precisamente, para cada  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $a(x,D)u(x) = \lim_{k,m\to\infty} \int \int e^{i(x-y)\xi} a(x,\xi)u(y)\psi_m(y)\psi_k'(\xi)dyd\xi$ , onde  $\psi_m, \psi_k'$  são as seqüências introduzidas na segunda página do capítulo 1. Demonstrase, então, que a integral oscilatória é igual à integral iterada (não necessariamente absolutamente convergente)  $\int e^{ix\xi}a(x,\xi) \left[\int e^{-iy\xi}u(y)dy\right]d\xi.$ 

Observação 3.1. Notemos que o operador dado por

$$a(x,D)_R u(x) = \int e^{i(x-y)\xi} u(y) a(x,\xi) d\!\!\!/ y d\!\!\!/ \xi, \quad u \in S^A(I\!\!R^n),$$

não é um homomorfismo de módulos à direita em  $\overline{S^A(I\!\!R^n)}$ , se A não é comutativa, pois, dados  $b \in A, u \in S^A(I\!\!R^n)$ ,  $a(x,D)_R(ub)(x) = \int e^{i(x-y)\xi}u(y)ba(x,\xi) dy d\xi$  e  $a(x,D)_R(u)$   $b(x) = \int e^{i(x-y)\xi}u(y)a(x,\xi)bdy d\xi$ . Ou seja, em geral,  $a(x,D)_R(ub)$  e  $a(x,D)_R(u)b$  não são iguais.

**Definição 3.2.** Definimos a transformada de Fourier de u em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  como segue:

$$\hat{u}(\xi) = \int e^{-iy\xi} u(y) dy.$$

Observação 3.3. Temos (como no caso escalar) que a transformada de Fourier é um operador contínuo e inversível em  $S^A(\mathbb{R}^n)$ . Além disso, é uma isometria com relação à norma  $\| \|_2$ , (corolário B.4). Assim,  $a(x,D)u(x) = \int e^{ix\xi}a(x,\xi)\hat{u}(\xi)d\xi$ .

**Observação 3.4.** Notemos que, pelo Teorema da Convergência Dominada (A.7), a(x, D) u é uma função contínua, pois  $||e^{ix\xi}a(x,\xi)\hat{u}(\xi)|| \leq ||a||_{\infty}||\hat{u}(\xi)|| \in L^1(\mathbb{R}^n)$ .

**Definição 3.5.** Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ , seja  $\pi(a) = \sup\{\|\partial_y^{\beta}\partial_{\eta}^{\gamma}a\|_{\infty}, \beta, \gamma \leq (1, 1, \cdots, 1)\}.$ 

Notação 3.6.  $\alpha = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{N}^n$ 

**Lema 3.7.** Seja  $\phi \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^{2n})$  com  $\phi \equiv 1$  perto do zero. Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ , seja  $a_{\varepsilon}(y, \eta) = \phi(\varepsilon y, \varepsilon \eta)a(y, \eta)$ ,  $0 < \varepsilon \leq 1$ . Então existe uma constante  $c_1 \in \mathbb{R}^+$ , independente de  $a \in \varepsilon$ , tal que  $\pi(a_{\varepsilon}) \leq c_1 \pi(a)$ .

**Demonstração.** Dados os multi-índices  $\beta, \gamma \leq \alpha$ ,

$$\begin{split} \partial_{y}^{\beta}\partial_{\eta}^{\gamma}a_{\varepsilon}(y,\eta) &= \partial_{y}^{\beta}[\partial_{\eta}^{\gamma}\phi(\varepsilon y,\varepsilon\eta)a(y,\eta)] = \partial_{y}^{\beta}\left[\sum_{\gamma_{1}+\gamma_{2}=\gamma}\partial_{\eta}^{\gamma_{1}}\phi(\varepsilon y,\varepsilon\eta)\partial_{\eta}^{\gamma_{2}}a(y,\eta)\right] = \\ &= \sum_{\beta_{1}+\beta_{2}=\beta}\sum_{\gamma_{1}+\gamma_{2}=\gamma}\partial_{y}^{\beta_{1}}\partial_{\eta}^{\gamma_{1}}\phi(\varepsilon y,\varepsilon\eta)\partial_{y}^{\beta_{2}}\partial_{\eta}^{\gamma_{2}}a(y,\eta). \end{split}$$

Portanto, se  $\phi_{\varepsilon}(x,y) = \phi(\varepsilon y, \varepsilon x)$ , temos:

$$\|\partial_y^{\beta} \partial_{\eta}^{\gamma} a_{\varepsilon}\|_{\infty} \leq \sum_{\beta_1 \leq \beta} \sum_{\gamma_1 \leq \gamma} \|\partial_y^{\beta_1} \partial_{\eta}^{\gamma_1} \phi_{\varepsilon}\|_{\infty} \pi(a).$$

Assim,

$$\pi(a_{\varepsilon}) \leq \sum_{\beta,\gamma \leq \alpha} \varepsilon^{|\beta+\gamma|} \|\partial_y^{\beta} \partial_\eta^{\gamma} \phi\|_{\infty} \pi(a) \leq \sum_{\beta,\gamma \leq \alpha} \|\partial_y^{\beta} \partial_\eta^{\gamma} \phi\|_{\infty} \pi(a). \quad \blacksquare$$

Nota 3.8. Dadas  $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n, A)$  (ver A.9),  $(f|g) = \int f(x)^* g(x) dx$  está bem definido, pois  $f^*g \in L^1(\mathbb{R}^n, A)$  (ver A.9) por Hölder [3, 6.2]. E temos que  $(\cdot|\cdot): L^2(\mathbb{R}^n, A) \times L^2(\mathbb{R}^n, A) \to A$  é contínua como função das duas variáveis, pois  $||(f|g)|| \le ||f||_{L^2} ||g||_{L^2}$ . Notemos que, se  $h_1, h_2 \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,  $(h_1|h_2) = \langle h_1, h_2 \rangle$ . E temos que  $||h||_2 \le ||h||_{L_2}$ , para  $h \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

**Proposição 3.9.**  $L^2(\mathbb{R}^n, A) \subseteq \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  e a inclusão é contínua.

**Demonstração.** Definamos  $\iota: (S^A(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{L_2}) \to \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  por  $\iota(h) = h, h \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Notemos que  $\|\iota(h)\|_2 = \|h\|_2 \le \|h\|_{L_2}$ . Portanto,  $\iota$  é contínua.

Seja  $\mathcal{I}: L^2(\mathbb{R}^n, A) \to \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  a única extensão contínua de  $\iota$ . Provemos que  $\mathcal{I}$  é injetora; ou seja que se  $\mathcal{I}(f) = 0 \Rightarrow f = 0$ , para  $f \in L^2(\mathbb{R}^n, A)$ .

Dada  $f \in L^2(\mathbb{R}^n, A)$ , seja  $(f_m)$  uma seqüência em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\lim_{m \to \infty} \|f_m - f\|_{L_2} = 0$  (ver A.19). Para  $g \in L^2(\mathbb{R}^n, A)$  temos que (por Hölder):  $\|(f_m - f|g)\| \le \int \|(f_m - f)(x)^*g(x)\|dx \le \|f_m - f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$ . Logo,

$$(1) (f_m|g) \to (f|g), \forall g \in L^2(\mathbb{R}^n, A).$$

Se  $\mathcal{I}(f) = 0$ , como  $\mathcal{I}$  è continua,  $\mathcal{I}(f_m) \to 0$ , ou seja,  $||f_m||_2 \to 0$ . Assim, dada  $h \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,  $|| < f_m, h > || \le ||f_m||_2 ||h||_2 \to 0$  por Cauchy-Schwartz [6, lemma 1.1.2]. Ou seja,

(2) 
$$\mathcal{I}(f) = 0 \Rightarrow \langle f_m, h \rangle \to 0, \quad \forall h \in S^A(\mathbb{R}^n).$$

Suponhamos  $\mathcal{I}(f) = 0$ . Então, dada  $h \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , por (1) e (2) temos (f|h) = 0; em particular, para todo  $m \in \mathbb{N}$ ,  $(f|f_m) = 0$ . Novamente por (1), tomando g = f, temos que  $(f|f_m) \to (f|f)$  e, portanto, (f|f) = 0, ou seja, f = 0, (A.17) e  $\mathcal{I}$  é injetora.

Corolário 3.10. Se  $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n, A)$ , então  $\langle f, g \rangle = (f|g)$ . Em particular,  $||f||_2 = \left\| \int f(x)^* f(x) dx \right\|^{\frac{1}{2}}$ .

**Demonstração.** Sejam  $(f_m)$  e  $(g_k)$  seqüências em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  que convergem em  $L^2(\mathbb{R}^n, A)$  para f e g, respectivamente. Como a inclusão  $L^2(\mathbb{R}^n, A) \subseteq \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  é contínua, (pela proposição 3.9),  $(f_m)$  e  $(g_k)$  convergem em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  para f e g, respectivamente. Portanto, (ver 3.8),

$$(f|g) \longleftarrow (f_m|g_k) = \langle f_m, g_k \rangle \longrightarrow \langle f, g \rangle.$$

Isto  $\acute{e} < f, g >= \int f(x)^* g(x) dx$ .

**Observação 3.11.** Se  $D_{y_j} = -i\partial_{y_j}$ , vale que  $(i+x)^{\alpha}e^{ixy} = (i+D_y)^{\alpha}e^{ixy}$ ,  $x, y \in \mathbb{R}^n$ . (Escrevemos (i+x) querendo dizer  $(i\alpha+x)$ ).

**Proposição 3.12.** Dadas  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  e  $u \in S^{A}(\mathbb{R}^{n})$ , então  $a(x, D)(u) \in L^{2}(\mathbb{R}^{n}, A)$ .

**Demonstração.** Notemos que, pela observação 3.4, a(x,D)(u)(x) é uma função contínua de  $\mathbb{R}^n$  em A e, portanto, mensurável.

$$a(x,D)(u)(x) = \int e^{ix\eta} a(x,\eta) \hat{u}(\eta) d\eta = \int (i+x)^{-\alpha} [(i+x)^{\alpha} e^{ix\eta}] a(x,\eta) \hat{u}(\eta) d\eta =$$

$$= (i+x)^{-\alpha} \int [(i+D_{\eta})^{\alpha} e^{ix\eta}] a(x,\eta) \hat{u}(\eta) d\eta = (i+x)^{-\alpha} \int e^{ix\eta} [(i-D_{\eta})^{\alpha} a(x,\eta) \hat{u}(\eta)] d\eta$$
(para a última igualdade fizemos integração por partes, ver A.15).

Como  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  e  $\hat{u} \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , (3.3) , a última integral é limitada; digamos que, em norma, é menor ou igual que  $c_2 \in \mathbb{R}^+$ . Veremos na observação (3.14) que  $c_2$  depende de a e de u, mas não depende de x. Assim, temos  $||a(x,D)(u)||_{L_2}^2 \leq c_2^2 \int |i+x|^{-2|\alpha|} dx$  e portanto  $a(x,D)(u) \in L^2(\mathbb{R}^n,A)$ .

Corolário 3.13. Pela Proposição (3.9)  $a(x, D)(u) \in \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ 

**Observação 3.14.** Sobre a constante  $c_2$  da proposição (3.12).

$$\left\| \int e^{ix\eta} [(i-D_{\eta})^{\alpha} a(x,\eta) \hat{u}(\eta)] d\eta \right\| \leq \int \|(i-D_{\eta})^{\alpha} a(x,\eta) \hat{u}(\eta)\| d\eta$$

e temos que  $(i - D_{\eta})^{\alpha} a(x, \eta) \hat{u}(\eta)$  é soma de termos do tipo  $D_{\eta}^{\alpha_1} a(x, \eta) D_{\eta}^{\alpha_2} \hat{u}(\eta)$  (multiplicados por uma potência de i) e vale

$$||D_{\eta}^{\alpha_1} a(x,\eta) D_{\eta}^{\alpha_2} \hat{u}(\eta)|| \le \pi(a) ||D_{\eta}^{\alpha_2} \hat{u}(\eta)||,$$

onde  $\alpha_1, \alpha_2 \leq \alpha$ . Assim,  $\|\int e^{ix\eta}[(i-D_\eta)^\alpha a(x,\eta)\hat{u}(\eta)] d\eta\| \leq M\pi(a)$ , onde  $M \in \mathbb{R}^+$  é uma constante (que depende de n e de u) que tem a ver com a soma citada acima (número de termos e módulo das constantes) e com a soma das integrais do tipo  $\int \|D_\eta^{\alpha_2} \hat{u}(\eta)\| d\eta$ . Logo, a constante  $c_2$  mencionada acima é  $M\pi(a)$ , onde M não depende de a nem de x.

A seguinte proposição foi baseada no lema 3.13 de [11].

**Proposição 3.15.** Dados a e  $a_{\varepsilon}$  como no lema (3.7) e  $u, v \in S^{A}(\mathbb{R}^{n})$ , vale que

$$\langle v, a_{\varepsilon}(x, D)u \rangle \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} \langle v, a(x, D)u \rangle \text{ em } A.$$

**Demonstração.** Sejam  $b_{\varepsilon} = a_{\varepsilon} - a$   $(b_{\varepsilon} \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A))$  e  $B_{\varepsilon} = b_{\varepsilon}(x, D)$ . Provemos que  $\langle v, B_{\varepsilon}u \rangle \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} 0$   $B_{\varepsilon}u(x) = \int e^{ix\eta}b_{\varepsilon}(x, \eta)\hat{u}(\eta)/\!\!/\!\!/\eta$ , e temos que  $\|e^{ix\eta}b_{\varepsilon}(x, \eta)\hat{u}(\eta)\| \le \pi(b_{\varepsilon})\|\hat{u}(\eta)\|$ .

Observemos que, pelo lema (3.7), existe  $c_1 \in \mathbb{R}^+$ , independente de  $b_{\varepsilon}$ , tal que  $\pi(b_{\varepsilon}) = \pi(a_{\varepsilon} - a) \leq \pi(a_{\varepsilon}) + \pi(a) \leq (c_1 + 1)\pi(a)$ . Portanto,  $||e^{ix\eta}b_{\varepsilon}(x,\eta)\hat{u}(\eta)|| \leq (c_1 + 1)\pi(a)||\hat{u}(\eta)||$ .

Como  $||e^{ix\eta}b_{\varepsilon}(x,\eta)\hat{u}(\eta)|| \to 0$  e  $\int ||\hat{u}(\eta)|| d\eta < \infty$ , pelo Teorema da Convergência Dominada,  $||B_{\varepsilon}u(x)|| \to 0$ , para cada  $x \in \mathbb{R}^n$ .

Por outro lado, como visto na proposição (3.12) e na observação (3.14), existe uma constante  $M \in \mathbb{R}^+$ , independente de  $\varepsilon$ , tal que

$$\int \|B_{\varepsilon}u(x)\|^2 dx \le M^2 \pi (b_{\varepsilon})^2 \int |i+x|^{-2|\alpha|} dx \le M^2 (c_1+1)^2 \pi (a)^2 \int |i+x|^{-2|\alpha|} dx < \infty.$$

Novamente, pelo Teorema da Convergência Dominada,  $||B_{\varepsilon}u||_{L_2} \to 0$ . Isto implica que  $||B_{\varepsilon}u||_2 \to 0$  por (3.8) . Finalmente, por Cauchy-Schwarz, como  $||< v, B_{\varepsilon}u>|| \le ||v||_2 ||B_{\varepsilon}u||_2$ , temos que  $< v, a_{\varepsilon}(x,D)u> \to < v, a(x,D)u>$  em A.

**Nota 3.16.** Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ , pelo visto na proposição (3.12) ,  $a(x, D)(u) \in L^2(\mathbb{R}^n, A)$ , para  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Assim, pela nota (3.8) ,  $\langle v, a(x, D)u \rangle$  está bem definido para  $v \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

**Lema 3.17.** Dada  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$  seja  $f(x,\xi) = \int e^{-iy\xi} (i+x-y)^{-\alpha} u(y) dy$ . Então,  $f \in L^2(\mathbb{R}^{2n}, A)$ .

**Demonstração.** Como para qualquer  $N \in \mathbb{N}$ 

$$\frac{(1-\Delta_y)^N e^{-iy\xi}}{(1+|\xi|^2)^N} = e^{-iy\xi},$$

temos

$$f(x,\xi) = \frac{1}{(1+|\xi|^2)^N} \int \left[ (1-\Delta_y)^N e^{-iy\xi} \right] (i+x-y)^{-\alpha} u(y) dy.$$

Queremos provar que a integral acima é combinação linear de termos do tipo

$$\int e^{-iy\xi} \partial_y^{\beta} u(y) (i+x-y)^{-\gamma} dy, \quad \beta \ge 0 \ e \ \gamma \ge \alpha.$$

Para isto, calculemos, para  $j=1,\cdots,n,\ M,P\leq N$ :

$$\int \partial_{y_j} \left[ (1 - \Delta_y)^M e^{-iy\xi} \right] \left[ (1 - \Delta_y)^P u(y) (i + x - y)^{-\alpha} \right] dy = (*).$$

Para  $(x, \xi)$  fixo, o integrando acima é uma função de  $L^1(\mathbb{R}^n, A)$ , pois  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Sejam  $g(y) = (1 - \Delta_y)^M e^{-iy\xi}$  e  $h(y) = (1 - \Delta_y)^P u(y) (i + x - y)^{-\alpha}$ . Pelo corolário A.16, temos que

$$\int \left[\partial_{y_1} g(y)\right](y)dy = -\int g(y)(\partial_{y_1} h(y))dy.$$

Pelo Teorema de Fubini (A.13), temos, tomando j = 1 sem perda de generalidade:

$$(*) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_{y_1} g(y) h(y) dy_1 \right) dy_2 \cdots dy_n =$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left[ \lim_{R \to +\infty} g(R, y_2, \cdots, y_n) h(R, y_2, \cdots, y_n) - \lim_{R \to -\infty} g(R, y_2, \cdots, y_n) h(R, y_2, \cdots, y_n) \right] dy_2, \cdots, dy_n,$$

pelo Teorema Fundamental do Cálculo, A.14.

Cada um dos limites acima é igual a zero. Portanto,

$$\int [\partial_{y_1} g(y)]h(y)dy = -\int g(y)[\partial_{y_1} h(y)]dy,$$

isto é, podemos fazer a integração por partes. Deste modo, temos que  $f(x,\xi)$  é combinação linear de termos do tipo

$$\frac{1}{(1+|\xi|^2)^N} \int e^{-iy\xi} \partial_y^\beta u(y) (i+x-y)^{-\gamma} dy, \quad \beta \ge 0, \gamma \ge \alpha,$$

onde a integral é finita pois  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

Por outro lado, pela desigualdade de Petree ([15, (3.6)]), temos que

$$|(i+x-y)^{-\gamma}| \le 4^n \frac{\sqrt{1+y_1^2}\cdots\sqrt{1+y_n^2}}{\sqrt{1+x_1^2}\cdots\sqrt{1+x_n^2}}$$

E, além disso,

$$\partial_{y_1}(i+x-y)^{-\gamma} = -\gamma_1(i+x_1-y_1)^{-\gamma_1-1}(i+x_2-y_2)^{-\gamma_2}\cdots(i+x_n-y_n)^{-\gamma_n}.$$

Deste modo,  $\|f(x,\xi)\|$  é menor ou igual que uma combinação linear de termos do tipo

$$\frac{4^n}{(1+|\xi|^2)^N\sqrt{1+x_1^2}\cdots\sqrt{1+x_n^2}}\int \|\partial_y^\beta u(y)\|\sqrt{1+y_1^2}\cdots\sqrt{1+y_n^2}dy, \quad \beta \ge 0,$$

que pertence a  $L^2(\mathbb{R}^{2n})$  para  $N \geq \frac{n}{2}$ . Então  $f \in L^2(\mathbb{R}^{2n}, A)$ .

**Lema 3.18.** Dada  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , seja  $f(x,\xi) = \int e^{-iy\xi} (i+x-y)^{-\alpha} u(y) dy$ . Então existe  $c_3 \in \mathbb{R}^+$ , independente de f e de u, tal que  $||f||_2 \le c_3 ||u||_2$ .

**Demonstração.** Sejam  $h(z) = (i-z)^{-\alpha}$  e  $h_z(y) = h(y-z)$ ; assim,  $f(x,\xi) = \int e^{-iy\xi} h_x(y) u(y) dy = \widehat{h_x u}(\xi)$ . (Notemos que  $h_x u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .) Como a transformada de Fourier é um operador "unitário" em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  (B.3), temos que, dados  $g, p \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,  $< \hat{p}, \hat{g} > = < p, g >$ .

Vimos no lema (3.17) que  $f \in L^2(I\!\!R^{2n},A)$ , logo, pelo Teorema de Fubini, (A.13), temos

$$\int f(x,\xi)^* f(x,\xi) dx d\xi = \int [\widehat{h_x u}(\xi)]^* \widehat{h_x u}(\xi) d\xi dx = \int \langle \widehat{h_x u}, \widehat{h_x u} \rangle dx =$$

$$= \int \langle h_x u, h_x u \rangle dx = \int u(\xi)^* \overline{h_x(\xi)} h_x(\xi) u(\xi) d\xi dx = \int u(\xi)^* \int \overline{h_x(\xi)} h_x(\xi) dx u(\xi) d\xi =$$

$$= \int u(\xi)^* \int \overline{h(\xi - x)} h(\xi - x) dx u(\xi) d\xi = \int \overline{h(x)} h(x) dx \int u(\xi)^* u(\xi) d\xi.$$

Logo, se  $c_3 = ||h||_{L_2}$ , (3.9), temos  $||f||_2 \le c_3 ||u||_2$ .

O próximo teorema foi enunciado e demonstrado baseando-nos no teorema 3.14 de [11].

**Teorema 3.19.** Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ , então a induz um operador contínuo em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  como pré-módulo de Hilbert. Além disso, existe uma constante  $k \in \mathbb{R}^+$ , independente de a, tal que  $||a(x, D)|| \le k\pi(a)$ .

**Demonstração.** Suponhamos, primeiramente, que a tem suporte compacto. Seja T = a(x, D). Calculemos, para  $u, v \in S^A(\mathbb{R}^n), \langle \hat{v}, \widehat{Tu} \rangle = \langle v, Tu \rangle$ .

$$\begin{split} Tu(x) &= \int e^{i\xi(x-y)} a(x,\xi) u(y) dy d\xi \\ \widehat{Tu}(\eta) &= \int e^{-ix\eta} e^{i\xi(x-y)} a(x,\xi) u(y) dy d\xi dx \\ &< \hat{v}, \widehat{Tu} > = \int e^{-ix\eta} e^{i\xi(x-y)} \hat{v}(\eta)^* a(x,\xi) u(y) dy d\xi dx d\eta = \\ &= \int e^{-ix\eta} (i+x-y)^{-\alpha} \hat{v}(\eta)^* [(i+x-y)^{\alpha} e^{i\xi(x-y)}] a(x,\xi) u(y) d\xi dx dy d\eta. \end{split}$$

Como a tem suporte compacto e  $u, v \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , vale Fubini (A.13), o que justifica as igualdades acima; além disso, podemos aplicar a integração por partes e, pela observação (3.11), temos:

$$\begin{split} &<\hat{v},\widehat{Tu}> = \int e^{-ix\eta}(i+x-y)^{-\alpha}\hat{v}(\eta)^*[(i+D_\xi)^\alpha e^{i\xi(x-y)}]a(x,\xi)u(y) \not d\xi \not dx \not dy d\eta = \\ &= \int e^{-ix\eta}(i+x-y)^{-\alpha}v(\eta)^*e^{i\xi x}e^{-i\xi y}[(i-D_\xi)^\alpha a(x,\xi)]u(y) \not d\xi \not dx \not dy d\eta = \\ &= \int e^{-iy\xi}(i+x-y)^{-\alpha}(i+\xi-\eta)^{-\alpha}[(i+\xi-\eta)^\alpha e^{ix(\xi-\eta)}]\hat{v}(\eta)^*[(i-D_\xi)^\alpha a(x,\xi)]u(y) \not d\xi \not dx \not dy d\eta = \end{split}$$

$$= \int e^{-iy\xi} (i+x-y)^{-\alpha} (i+\xi-\eta)^{-\alpha} [(i+D_x)^{\alpha} e^{ix(\xi-\eta)}] \hat{v}(\eta)^* [(i-D_\xi)^{\alpha} a(x,\xi)] u(y) dx d\xi dy d\eta = 0$$

$$= \int e^{-iy\xi} (i+x-y)^{-\alpha} e^{-ix\eta} (i+\xi-\eta)^{-\alpha} e^{ix\xi} \hat{v}(\eta)^* [(i-D_x)^{\alpha} (i-D_\xi)^{\alpha} a(x,\xi)] u(y) dx d\xi dy d\eta = 0$$

$$= \int e^{ix\xi} (e^{-ix\eta} h_{\xi}(\eta) \hat{v}(\eta)^* [(i-D_x)^{\alpha} (i-D_{\xi})^{\alpha} a(x,\xi)] (e^{-iy\xi} h_x(y) u(y)) dy d\eta dx d\xi$$

usando a notação do lema (3.18).

Sejam

$$f(x,\xi) = \int e^{-ix\eta} h_{\xi}(\eta) \hat{v}(\eta)^* d\eta$$
$$g(x,\xi) = \int e^{-iy\xi} h_{x}(y) u(y) dy.$$

Então:

$$<\hat{v},\widehat{Tu}>=\int e^{ix\xi}f(x,\xi)[(i-D_x)^{\alpha}(i-D_\xi)^{\alpha}a(x,\xi)]g(x,\xi)dxd\xi.$$

Abusando da notação, colocando as variáveis das funções, temos:

$$\| < \hat{v}, \widehat{Tu} > \| = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \| < e^{-ix\xi} f^*(x,\xi), [(i-D_x)^{\alpha} (i-D_\xi)^{\alpha} a(x,\xi)] g(x,\xi) > \|.$$

Seja  $c(x,\xi) = (i-D_x)^{\alpha}(i-D_\xi)^{\alpha}a(x,\xi)$ . Como  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n},A)$ , temos que  $\|c\|_{\infty} = \sup_{(x,\xi)\in\mathbb{R}^{2n}}\|c(x,\xi)\| < \infty$ . Além disso, pela definição de c, existe uma constante  $l \in \mathbb{R}^+$ , que não depende de a, tal que  $\|c\|_{\infty} \leq l\pi(a)$ . E temos, pela demonstração do teorema 2.2.5 de  $[\mathbf{5}]$ ,

$$\leq ||c||_{\infty}^2 \int g(x,\xi)^* g(x,\xi) dx d\xi.$$

Portanto, pelo lema (3.18) ,  $||cg||_2 \le l\pi(a)c_3||u||_2$ .

Como  $f^*(x,\xi) = \int e^{ix\eta} \overline{h_{\xi}(\eta)} \hat{v}(\eta) d\eta$ , de um modo análogo ao feito na demonstração do lema (3.18) , temos  $||f^*||_2 \le c_3 ||\hat{v}||_2 = c_3 ||v||_2$  (ver observação (3.3) ). Logo, por Cauchy-Schwarz,

 $\| < \hat{v}, \widehat{Tu} > \| \le \frac{lc_3^2}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \pi(a) \|u\|_2 \|v\|_2.$ 

Tomando  $k_1 = \frac{lc_3^2}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}$ , temos que  $\| \langle v, a(x, D)u \rangle \| \leq k_1\pi(a)\|u\|_2\|v\|_2$ , onde  $k_1$  não depende de a, e então a(x, D) é contínuo em  $S^A(\mathbb{R}^n)$ .

Para o caso geral, consideremos  $a_{\varepsilon}$  como na proposição (3.15) . Então, pelo feito acima, temos:

$$\| \langle v, a(x, D)u \rangle \| \underset{\varepsilon \to 0}{\longleftarrow} \| \langle v, a_{\varepsilon}(x, D)u \rangle \| \leq k_1 \pi(a_{\varepsilon}) \|u\|_2 \|v\|_2.$$

Portanto, pelo lema (3.7) ,  $\| < v, a(x, D)u > \| \le k_1c_1\pi(a)\|u\|_2\|v\|_2$ . E, assim, existe  $k \in \mathbb{R}^+, k = k_1c_1$ , independente de a, tal que  $\| < v, a(x, D)u > \| \le k\pi(a)\|u\|_2\|v\|_2$ .

Tomemos v=a(x,D)(u). Como  $v\in L^2(\mathbb{R}^n,A)$ , proposição (3.12) , pela nota (3.8) , a seguinte desigualdade faz sentido:

$$\| \langle a(x,D)(u), a(x,D)(u) \rangle \| \le k\pi(a)\|u\|_2\|a(x,D)(u)\|_2, \ \forall u \in S^A(\mathbb{R}^n).$$

Portanto,  $||a(x,D)(u)||_2 \le k\pi(a)||u||_2$ , e temos  $||a(x,D)|| \le k\pi(a)$ .

Corolário 3.20. Nas condições do teorema, vemos que a(x, D) se estende ao módulo de Hilbert  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , continuamente.

## Capítulo 4

No capítulo 1, vimos a demonstração da conjectura proposta por Rieffel no final do capítulo 4 de [1] para o caso da  $C^*$ -álgebra dos números complexos. Foi necessária a caracterização feita por Cordes ([2, capítulo 8]) dos operadores suaves pela ação do grupo de Heisenberg, os operadores pseudo-diferenciais. Neste capítulo, veremos que uma generalização da caracterização de Cordes para uma  $C^*$ - álgebra, A, qualquer, implicaria que a conjectura proposta por Rieffel é verdadeira.

Suponhamos então que vale a seguinte generalização da caracterização de Cordes:

**4.1.** Seja  $\mathcal{HS}$  o conjunto dos operadores Heisenberg-suaves em  $\mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$ . Então a aplicação  $O: CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A) \to \mathcal{HS}$ , dada por O(a) = a(x, D) é uma bijeção, onde a(x, D) é o operador definido em (I) do capítulo 3.

Vejamos que O (acima) está bem definida.

**Lema 4.2.** Dado  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ , de suporte compacto, o operador O(a) possui adjunto; ou seja, existe um operador T em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ , contínuo, tal que

$$\langle O(a)u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$$
, se  $u, v \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

Demonstração.

$$\begin{split} & < O(a)u,v> = \int \left[ \int e^{i(x-y)\xi} a(x,\xi) u(y) \mathrm{d}y \mathrm{d}\xi \right]^* v(x) dx = \\ & = \int \int e^{i(y-x)\xi} u(y)^* a(x,\xi)^* \mathrm{d}y \mathrm{d}\xi v(x) dx = \int u(y)^* \left[ \int e^{i(y-x)\xi} a(x,\xi)^* v(x) \mathrm{d}x \mathrm{d}\xi \right] \mathrm{d}y, \end{split}$$

para a última igualdade aplicamos o Teorema de Fubini, A.13, pois a tem suporte compacto e  $u, v \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

Como a tem suporte compacto,  $a \in S^A(\mathbb{R}^{2n})$ . Seja  $F_2$  a transformada de Fourier, na segunda variável, definido em  $S^A(\mathbb{R}^{2n})$ . Com esta notação, seja

$$c(y,z) = \int e^{iz\xi} a(y-z,\xi)^* d\xi = F_2^{-1} a^*(y-z,z) \quad (1).$$

e temos  $c \in S^A(\mathbb{R}^{2n})$ .

Seja  $p(y,z) = F_2c(y,z)$ ,  $(p \in S^A(\mathbb{R}^{2n})$ , ver início do Apêndice B), então

$$\begin{split} c(y,z) &= F_2^{-1} p(y,z) \qquad (2) \\ \text{Por } (1), \text{ temos } c(y,y-x) &= \int e^{i(y-x)\xi} a(x,\xi)^* \not d\xi \text{ e, por } (2), c(y,y-x) &= \int e^{i(y-x)\xi} p(y,\xi) \not d\xi. \\ \text{Portanto, } \int e^{i(y-x)\xi} a(x,\xi)^* v(x) \not d\xi \not dx &= \int e^{i(y-x)\xi} p(y,\xi) v(x) \not d\xi \not dx. \end{split}$$

Assim,

$$\int u(y)^* \left[ \int e^{i(y-x)\xi} a(x,\xi)^* v(x) dx d\xi \right] dy = \int u(y)^* \left[ \int e^{i(y-x)} p(y,\xi) v(x) dx d\xi \right] dy$$
 ou seja,  $< O(a)u, v> = < u, O(p)v>$ ,  $\forall u,v \in S^A(I\!\!R^n)$ .

**Observação 4.3.** Sobre a função p do lema 4.2,

$$\begin{split} p(y,\xi) &= F_2 c(y,\xi) = \int e^{-i\xi z} c(y,z) d\hspace{-0.1cm}/ z = \int e^{-i\xi z} \int e^{iz\zeta} a(y-z,\zeta)^* d\hspace{-0.1cm}/ \zeta d\hspace{-0.1cm}/ z = \\ &= \int e^{-iz(\xi-\zeta)} a(y-z,\zeta)^* d\hspace{-0.1cm}/ \zeta d\hspace{-0.1cm}/ z = \int e^{-iz\eta} a(y-z,\xi-\eta)^* d\hspace{-0.1cm}/ \eta d\hspace{-0.1cm}/ z. \end{split}$$

**Observação 4.4.** Notemos que, como visto no capítulo 1,  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  é um espaço de Fréchet, com as semi-normas

$$||F||_j = \sup_{|\alpha| \le j} ||\partial^{\alpha} F||_{\infty},$$

onde  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A), \ j \in \mathbb{N}, \ \alpha$  é um multi-índice e  $\|\partial^{\alpha} F\|_{\infty} = \sup_{(x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}} \|\partial^{\alpha} F(x,\xi)\|.$ 

Temos também que  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n},CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n},A))$  é um espaço de Fréchet com as semi-normas

$$||G||_{jk} = \sup_{i \le j} \sup_{|\beta| < k} ||\partial^{\beta} G||_{i},$$

 $G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A))$ , onde

$$||G||_i = \sup_{(z,\eta) \in \mathbb{R}^{2n}} ||G(z,\eta)||_i;$$

lembremos que, para cada  $(z,\eta) \in \mathbb{R}^{2n}$ ,  $G(z,\eta)$  é uma função em  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n},A)$ .

Aplicaremos no próximo lema os resultados de [1] sobre integrais oscilatórias, para funções tomando valores no espaço de Fréchet  $CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ .

**Lema 4.5.** Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ , se  $p(y, \xi) = \int e^{-iz\eta} a(y-z, \xi-\eta)^* dz d\eta$ , então  $p \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ .

**Demonstração.** Seja  $G: \mathbb{R}^{2n} \to CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  dada por  $G(z, \eta)(y, \xi) = a(y-z, \xi-\eta)$ . Provemos que  $G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A))$ .

Dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  tal que, se  $\|(z,\eta) - (z',\eta')\| < \delta$ ,  $(\Leftrightarrow \|(y-z,\xi-\eta) - (y-z',\xi-\eta')\| < \delta$ ,  $\forall (y,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}$ , então  $\|(\partial^{\alpha}a)(y-z,\xi-\eta) - (\partial^{\alpha}a)(y-z',\xi-\eta')\| < \varepsilon$ , pois  $\partial^{\alpha}a$  é uniformemente contínua.

Como, para cada  $(z,\eta) \in \mathbb{R}^{2n}$ ,  $G(z,\eta)$  é uma função de variável  $(y,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}$ , escrevemos  $\partial^{\alpha}(G(z,\eta))$  para denotar a derivada de multi-índice  $\alpha$  da função  $G(z,\eta) \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n},A)$ , para  $(z,\eta)$  fixado. E, como  $\partial^{\alpha}(G(z,\eta))(y,\xi)=(\partial^{\alpha}a)(y-z,\xi-\eta)$ , temos  $\|\partial^{\alpha}(G(z,\eta))-\partial^{\alpha}(G(z',\eta'))\|_{\infty}<\varepsilon$ . Logo, dados  $j\in\mathbb{N}$  e  $\varepsilon>0$ , existe  $\delta>0$  tal que, se  $\|(z,\eta)-(z',\eta')\|<\delta$ ,  $\|G(z,\eta)-G(z',\eta')\|_{j}<\varepsilon$ , e G é contínua.

Além disso, é fácil ver que  $\forall j \in I\!\!N, \forall (z,\eta) \in I\!\!R^{2n}, \|G(z,\eta)\|_j \leq \|a\|_j$ , i.e. G é limitada.

Vejamos agora que G é derivável. Para isto, provemos que G possui derivadas parciais de primeira ordem.

Se 
$$e_j = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$$
, provemos que

$$\lim_{t\to 0} \frac{G(z+te_j,\eta) - G(z,\eta)}{t} = H(z,\eta), \qquad (z,\eta) \in \mathbb{R}^{2n},$$

onde

$$H(z,\eta)(y,\xi) = \lim_{k\to 0} \frac{a(y-z-ke_j,\xi-\eta) - a(y-z,\xi-\eta)}{k}.$$

Notemos que  $H(z, \eta) \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ .

Consideraremos  $t \geq 0$ , o caso  $t \leq 0$  é análogo.

Dado  $(y,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}$ , pelo Teorema Fundamental do Cálculo A.14, temos:

$$\frac{G(z + te_{j}, \eta)(y, \xi) - G(z, \eta)(y, \xi)}{t} - H(z, \eta)(y, \xi) =$$

$$= \frac{a(y - z - te_{j}, \xi - \eta) - a(y - z, \xi - \eta)}{t} + \partial_{j}a(y - z, \xi - \eta) =$$

$$= \int_{[0,t]} \frac{-\partial_{j}a(y - z - he_{j}, \xi - \eta)}{t} + \partial_{j}a(y - z, \xi - \eta)dh =$$

$$= -\int_{[0,t]} \frac{\partial_{j}a(y - z - he_{j}, \xi - \eta) - \partial_{j}a(y - z, \xi - \eta)}{t}dh =$$

$$= \int_{[0,t]} \int_{[0,h]} \frac{\partial_{j}^{2}a(y - z - se_{j}, \xi - \eta)}{t}dsdh, \qquad h \in [0,t].$$

Aqui estamos usando a notação  $\partial_j a(y,\zeta) = \lim_{k\to 0} \frac{a(y+ke_j,\xi)-a(y,\xi)}{k}$ . Logo, para todo  $(y,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}$ ,

$$\left\| \frac{G(z + te_j, \eta)(y, \xi) - G(z, \eta)(y, \xi)}{t} - H(z, \eta)(y, \xi) \right\| \le \int_{[0,t]} \int_{[0,h]} \frac{\|a\|_2}{t} ds dh \le t \|a\|_2,$$

o que implica que, para qualquer  $(z, \eta) \in \mathbb{R}^{2n}$ ,

$$\sup_{(y,\xi)\in \mathbb{I\!\!R}^{2n}} \left\| \frac{G(z+te_j,\eta)(y,\xi) - G(z,\eta)(y,\xi)}{t} - H(z,\eta)(y,\xi) \right\| \le t \|a\|_2.$$

Aplicando o mesmo resultado para  $\partial^{\alpha}(G(z,\eta)), \ |\alpha| \leq j$ , a derivada de ordem  $\alpha$  da função  $G(z,\eta)$ , temos:

$$\lim_{t \to 0} \left\| \frac{G(z + te_j, \eta) - G(z, \eta)}{t} - H(z, \eta) \right\|_{j} \le$$

$$\le \lim_{t \to 0} \sup_{|\alpha| \le j} \left\| \frac{\partial^{\alpha} (G(z + te_j, \eta)) - \partial^{\alpha} (G(z, \eta))}{t} - \partial^{\alpha} (H(z, \eta)) \right\|_{\infty} \le$$

$$\leq \lim_{t \to 0} \sup_{|\alpha| < j} \|\partial^{\alpha} a\|_{2}.t = 0, \quad \forall j \in \mathbb{N}.$$

Do mesmo modo, vemos que existem todas as derivadas parciais de G e portanto  $G \in C^{\infty}$ . Como antes, vemos que estas derivadas são limitadas e, portanto,  $G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A))$ .

Assim, pela definição de integral oscilatória ([1, (1.3)]),

$$\int e^{iz\eta}G(z,\eta)dzd\eta\in CB^{\infty}(I\!\!R^{2n},A)$$

e, portanto,  $\left(\int e^{iz\eta}G(z,\eta)dzd\eta\right)^*\in CB^\infty(I\!\!R^{2n},A)$ , ou seja

$$p(y,\xi) = \int e^{-iz\eta} a(y-z,\xi-\eta)^* dz d\eta \in CB^{\infty}(I\!\!R^{2n},A). \quad \blacksquare$$

**Proposição 4.6.** Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ , existe  $p \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  tal que, se  $u, v \in S^{A}(\mathbb{R}^{n})$ , < O(a)u, v > = < u, O(p)v >.

**Demonstração.** Seja  $p(y,\xi) = \int e^{-iz\eta} a(y-z,\xi-\eta)^* dz d\eta$ . Vimos no lema 4.5 que  $p \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n},A)$ . A integral acima é uma integral oscilatória.

Sejam  $\psi_m, \psi_k' \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ , como no capítulo 1 e sejam  $a_{m,k}(x,w) = \psi_m(x)\psi_k'(w)a(x,w)$  e  $p_{m,k}(y,\xi) = \int e^{-iz\eta}a_{m,k}(y-z,\xi-\eta)^* dz d\eta$ . Segue da proposição 1.6 de [1] que, para cada  $(y,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}$ ,  $\lim_{m,k} p_{m,k}(y,\xi) = p(y,\xi)$ .

Dadas  $u, v \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,

$$\begin{split} < u, O(p)v> &= \int u(y)^* \left[ \int e^{iy\xi} p(y,\xi) \hat{v}(\xi) d\!\!\!/ \xi \right] dy = \\ &= \int u(y)^* \left[ \int e^{iy\xi} \lim_{m,k} p_{m,k}(y,\xi) \hat{v}(\xi) d\!\!\!/ \xi \right] dy \end{split}$$

É fácil ver que decorre da desigual dade básica 1.4 de [1] (e da definição de  $\psi_m$  e  $\psi_k'$ ) que existem  $j \in I\!\!N$  e uma constante  $M \in I\!\!R^+$ , que não depende de a nem de  $\psi_m$  ou  $\psi_k'$  (é possível escolher  $\psi_m$  tais que  $\sup_{\alpha,m} |\psi_m^{(\alpha)}| < \infty$ , e analogamente para  $\psi_k'$ ), tais que  $||p_{mk}(y,\xi)|| \le M||a||_{2j}$ .

Assim,  $||u(y)^*p_{m,k}(y,\xi)\hat{v}(\xi)|| \le M||a||_{2j}||u(y)||||\hat{v}(\xi)|| \in L^1(\mathbb{R}^{2n}).$ 

Pelo Teorema de Fubini (A.15) temos:

$$\int u(y)^* \left[ \int e^{iy\xi} p_{m,k}(y,\xi) \hat{v}(\xi) d\xi \right] dy = \int \int u(y)^* e^{iy\xi} p_{m,k}(y,\xi) \hat{v}(\xi) d\xi dy.$$

Pelo Teorema da Convergência Dominada (A.7), temos:

$$\begin{split} \lim_{m,k} \int \int u(y)^* e^{iy\xi} p_{m,k}(y,\xi) \hat{v}(\xi) d\xi dy &= \int \int u(y)^* e^{iy\xi} \lim_{m,k} p_{m,k}(y,\xi) \hat{v}(\xi) d\xi dy = \\ &= \int u(y)^* \left[ \int e^{iy\xi} \lim_{m,k} p_{m,k}(y,\xi) \hat{v}(\xi) d\xi \right] dy \end{split}$$

(novamente pelo Teorema de Fubini).

Portanto, 
$$\langle u, O(p)v \rangle = \lim_{m,k} \langle u, O(p_{m,k})v \rangle$$
.

Pelo lema 4.2 e pela observação 4.3,  $< O(a_{m,k})u, v> = < u, O(p_{m,k})v>$ . Além disso, como  $a_{m,k}(x,\xi) = \psi_m(x)\psi_k'(\xi)a(x,\xi)$ , temos  $||a_{m,k}(x,\xi)|| \le ||a(x,\xi)||$ ,  $\forall m, \forall k$ . Portanto,  $||\hat{u}(\xi)^*a(x,\xi)^*v(x)|| \le ||a||_{\infty}||\hat{u}(\xi)||||v(x)|| \in L^1(\mathbb{R}^{2n})$ .

Aplicando Fubini e o Teorema da Convergência Dominada, temos

$$\lim_{m,k} \langle O(a_{m,k})u, v \rangle = \lim_{m,k} \int \left[ \int e^{-ix\xi} \hat{u}(\xi)^* a_{m,k}(x,\xi)^* d\xi \right] v(x) dx =$$

$$= \int \left[ \int e^{-ix\xi} \hat{u}(\xi)^* a(x,\xi)^* d\xi \right] v(x) dx = \langle O(a)u, v \rangle.$$

Ou seja,  $\langle O(a)u, v \rangle = \langle u, O(p)v \rangle$ .

**Proposição 4.7.** Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A), O(a)$  é Heisenberg-suave.

#### Demonstração.

Seja T=a(x,D) e  $T_{z,\zeta}=E_{z,\zeta}^{-1}TE_{z,\zeta}$  (como no capítulo 1). Vemos que o símbolo de  $T_{z,\zeta}$  é  $a_{z,\zeta}$ , com  $a_{z,\zeta}(x,\xi)=a(x+z,\xi+\zeta)$ , (da mesma maneira como no caso A=C [2, 2.20]). Queremos provar que a aplicação  $(z,\zeta)\mapsto T_{z,\zeta}$  é  $C^{\infty}$ .

Vejamos que  $(z,\zeta) \mapsto T_{z,\zeta}$  é contínua em  $(z_0,\zeta_0)$ , i.e., que  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , tal que, se  $\|(z,\zeta) - (z_o.\zeta_o)\| < \delta$ , então  $\|T_{z,\zeta} - T_{z_0.\zeta_0}\| < \varepsilon$ .

Vimos no capítulo 3 (3.19) que existe uma constante  $k \in \mathbb{R}^+$ , independente de a, tal que  $||O(a)|| \le k\pi(a)$ , onde  $\pi(a) = \sup\{||\partial_x^\beta \partial_\xi^\gamma a||_\infty, \beta, \gamma \le (1, \dots, 1)\}$ .

Como  $T_{z,\zeta} - T_{z_0,\zeta_0}$  tem símbolo  $a_{z,\zeta} - a_{z_0,\zeta_0}$ , temos que  $||T_{z,\zeta} - T_{z_0,\zeta_0}|| \le k\pi(a_{z,\zeta} - a_{z_0,\zeta_0})$ .

Dados  $\beta, \gamma \leq (1, \dots, 1),$ 

$$\|\partial_x^{\beta} \partial_{\xi}^{\gamma} (a_{z,\zeta} - a_{z_0,\zeta_0})\|_{\infty} = \sup_{(x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}} \|\partial_x^{\beta} \partial_{\xi}^{\gamma} a_{z,\zeta}(x,\xi) - \partial_x^{\beta} \partial_{\xi}^{\gamma} a_{z_0,\zeta_0}(x,\xi)\| =$$

$$= \sup_{(x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}} \|(\partial_x^{\beta} \partial_{\xi}^{\gamma} a)(x + z.\xi + \zeta) - (\partial_x^{\beta} \partial_{\xi}^{\gamma})(x + z_0, \xi + \zeta_0)\|.$$

Como  $\partial_x^\beta \partial_{\varepsilon}^{\gamma} a$  é uniformemente contínua,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \sigma > 0$  tal que, se

$$\|(y,\eta)-(y',\eta')\|<\sigma\Rightarrow\|\partial_x^\beta\partial_{\varepsilon}^\gamma a(y,\eta)-\partial_x^\beta\partial_{\varepsilon}^\gamma a(y',\eta')\|<\varepsilon$$

se

$$\|(z,\zeta) - (z_0,\zeta_0)\| < \sigma \Rightarrow \|(z+x,\zeta+\xi) - (z_0+x,\zeta_0+\xi)\| < \sigma, \quad \forall (x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|(\partial_x^\beta \partial_\xi^\gamma a)(x+z,\xi+\zeta) - (\partial_x^\beta \partial_\xi^\gamma a)(x+z_0,\xi+\zeta_0)\| < \varepsilon, \quad \forall (x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}.$$
Portanto, 
$$\|\partial_x^\beta \partial_\xi^\gamma (a_{z,\zeta} - a_{z_0,\zeta_0})\|_{\infty} < \varepsilon, \quad \text{se } \|(z,\zeta) - (z_0,\zeta_0)\| < \sigma.$$

Notemos que  $\sigma$  depende de  $\beta$  e  $\gamma$ . Como  $\beta, \gamma$  são finitos, tomamos  $\delta > 0$  como sendo o mínimo dos  $\sigma$  acima e temos que  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta > 0$  tal que,  $\|(z,\zeta) - (z_0,\zeta_0)\| < \delta \Rightarrow \pi(a_{z,\zeta} - a_{z_0,\zeta_0}) < \varepsilon$ . Logo,  $\|T_{z,\zeta} - T_{z_0,\zeta_0}\| < \varepsilon$  e  $(z,\zeta) \mapsto T_{z,\zeta}$  é contínua em  $\mathbb{R}^{2n}$ .

Por outro lado, se  $\{e_i\}$  é a base canônica de  $\mathbb{R}^n$ , seja

$$\partial_i T_{z,\zeta} = \lim_{h \to 0} \frac{T_{z+he_i,\zeta} - T_{z,\zeta}}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{O(a_{z+he_i,\zeta}) - O(a_{z,\zeta})}{h}.$$

Provemos que  $\partial_i T_{z,\zeta} = O(\partial_i a_{z,\zeta})$ , onde  $\partial_i a_{z,\zeta}(x,\xi) = \lim_{h\to 0} \frac{a_{z,\zeta}(x+he_i,\xi) - a_{z,\zeta}(x,\xi)}{h}$  e  $a_{z,\zeta}(x,\xi) = a(x+z,\xi+\zeta)$ .

Temos, como antes, que

$$\left\| \frac{T_{z+he_i,\zeta} - T_{z,\zeta}}{h} - O(\partial_i a_{z,\zeta}) \right\| = \left\| \frac{O(a_{z+he_i,\zeta} - a_{z,\zeta} - h\partial_i a_{z,\zeta})}{h} \right\|$$

$$\leq \frac{k}{h} \pi (a_{z+he_i,\zeta} - a_{z,\zeta} - h\partial_i a_{z,\zeta}).$$

Dados  $(x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}$ ,  $h \geq 0$  (o caso  $h \leq 0$  é análogo), pelo Teorema Fundamental do Cálculo, (A.14),

$$a(x+he_i+z,\xi+\zeta) - a(x+z,\xi+\zeta) - h\partial_i a(x+z,\xi+\zeta) =$$

$$= \int_{[0,h]} \partial_i a(x+z+te_i,\xi+\zeta) dt - h\partial_i a(x+z,\xi+\zeta) =$$

$$= \int_{[0,h]} \left[ \partial_i a(x+z+te_i,\xi+\zeta) - \partial_i a(x+z,\xi+\zeta) \right] dt =$$

$$= \int_{[0,h]} \int_{[0,t]} \partial_i (\partial_i a)(x+z+se_i,\xi+\zeta) ds dt =$$

$$= \int_{[0,h]} \int_{[0,t]} \partial_i^2 a(x+z+se_i,\xi+\zeta) ds dt.$$

A última igualdade determina o significado da notação  $\partial_i^2 a$ .

Logo,

$$||a(x+he_i+z,\xi+\zeta) - a(x+z,\xi+\zeta) - h\partial_i a(x+x,\xi+\zeta)|| \le$$

$$\le h^2 \sup_{(x,\xi)\in \mathbb{I}\!\!R^{2n}} ||\partial_i^2 a_{z,\zeta}(x,\xi)||.$$

De modo análogo, dados  $\beta, \gamma \leq (1, 1, \dots, 1)$ , temos que

$$\|(\partial_x^{\beta}\partial_{\xi}^{\gamma}a)(x+z+he_i,\xi+\zeta)-\partial_x^{\beta}\partial_{\xi}^{\gamma}a)(x+z,\xi+\zeta)-$$

$$-h(\partial_x^{\beta}\partial_{\xi}^{\gamma}a)(x+z,\xi+\zeta)\| \leq$$

$$h^2 \sup_{(x,\xi)\in \mathbb{R}^{2n}} \|\partial_i^2\partial_x^{\beta}\partial_{\xi}^{\gamma}a_{z,\zeta}(x,\xi)\| \leq h^2\pi(\partial_i^2a_{z,\zeta}).$$

Portanto,

$$\lim_{h \to 0} \left\| \frac{O(a_{z+he_i,\zeta}) - O(a_{z,\zeta})}{h} - O(\partial_i a_{z,\zeta}) \right\| \le \lim_{h \to 0} k \cdot h\pi(\partial_i^2 a_{z,\zeta}) = 0.$$

ou seja,  $\partial_i T_{z,\zeta} = O(\partial_i a_{z,\zeta})$ .

Do mesmo modo, temos que  $\partial_z^\beta \partial_\zeta^\gamma T_{z,\zeta} = O\left(\partial_z^\beta \partial_\zeta^\gamma a_{z,\zeta}\right)$ , e temos, como antes, que  $(z,\zeta) \mapsto \partial_z^\beta \partial_\zeta^\gamma T_{z,\zeta}$  é contínua, i.e.,  $(z,\zeta) \mapsto T_{z,\zeta}$  é  $C^\infty$ .

Corolário 4.8. Dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A), \ O(a) \in \mathcal{HS}.$ 

Nosso objetivo agora é provar que, se vale 4.1, dado um operador  $T \in \mathcal{HS}$  tal que para toda  $G \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  comuta com  $R_G$ , então existe  $F \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$  de modo que  $T = L_F$ .

Na verdade, provaremos o resultado acima com uma hipótese mais fraca, que o operador  $T \in \mathcal{HS}$  comuta com  $R_g$ , para toda  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

Consideraremos primeiramente o caso n = 1.

**Lema 4.9.** Dada  $f \in CB^{\infty}(\mathbb{R}, A)$  temos que

$$\int \gamma(t)(1-\partial_t)^2 f(t)dt = f(0),$$

onde

$$\gamma(t) = \begin{cases} te^{-t} & \text{se } t \ge 0\\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

.

**Demonstração.** Como  $f \in CB^{\infty}(\mathbb{R}, A), \gamma(t)(1 - \partial_t)^2 f(t) \in L^1(\mathbb{R}, A).$ 

$$\int \gamma(t)(1-\partial_t)^2 f(t)dt = \int_{\mathbb{R}^+} te^{-t}(f(t)-2\partial_t f(t)+\partial_t^2 f(t))dt.$$

Fazendo integração por partes (ver A.15), para  $R \in \mathbb{R}^+$ ,

$$\int_{[0,R]} te^{-t} \partial_t f(t) dt = Re^{-R} f(R) - \int_{[0,R]} \partial_t (te^{-t}) f(t) dt.$$

$$\int_{[0,R]} te^{-t} \partial_t^2 f(t) dt = Re^{-R} \partial_t f(R) - \int_{[0,R]} \partial_t (te^{-t}) \partial_t f(t) dt =$$

$$= Re^{-R} \partial_t f(R) - \left[ (e^{-R} - Re^{-R}) f(R) - f(0) - \int_{[0,R]} \partial_t^2 (te^{-t}) f(t) dt \right].$$

Assim, como  $\int_{R^+} te^{-t}(1-\partial_t)^2 f(t)dt = \lim_{R\to\infty} \int_{[0,R]} te^{-t}(1-\partial_t)^2 f(t)dt$ , pela observação A.6, temos:

$$\int \gamma(t)(1-\partial_t)^2 f(t)dt = \int_{R^+} \left[ te^{-t} + 2\partial_t (te^{-t}) + \partial_t^2 (te^{-t}) \right] f(t)dt + f(0) = f(0). \blacksquare$$

**Nota 4.10.** Para o caso geral, consideramos  $\overline{\gamma}(x) = \prod_{j=1}^{n} \gamma(x_j)$ , onde  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 

e temos, de modo análogo, que  $\int \overline{\gamma}(x) \prod_{j=1}^{n} (1 - \partial_{x_j})^2 f(x) dx = f(0)$ , se  $f \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ .

De fato, pelo Teorema de Fubini (A.13), temos

$$\int \overline{\gamma}(x) \prod_{j=1}^{n} (1 - \partial_{x_{j}})^{2} f(x) dx =$$

$$= \int \prod_{j=2}^{n} \gamma(x_{j}) \left( \int \gamma(x_{1}) (1 - \partial_{x_{1}})^{2} \left[ \prod_{j=2}^{n} (1 - \partial_{x_{j}})^{2} f(x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}) \right] dx_{1} \right) dx_{2} \dots dx_{n} =$$

$$= \int \prod_{j=3}^{n} \gamma(x_{j}) \left( \int \gamma_{x_{2}} (1 - \partial_{x_{2}})^{2} \left[ \prod_{j=3}^{n} (1 - \partial_{x_{j}})^{2} f(0, x_{2}, \dots, x_{n}) \right] dx_{2} \right) dx_{3} \dots dx_{n} =$$

$$= \dots = f(0, \dots, 0) = f(0).$$

A proposição seguinte, para o caso  $A=\mathbb{C},$  foi provada por Cordes em [2, corolário 2.4].

**Proposição 4.11.** Dadas  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^2, A)$  e  $b = (1 + \partial_y)^2 (1 + \partial_\eta)^2 a$  então temos que  $a(x, \xi) = \int \gamma(y) \gamma(\eta) b(x - y, \xi - \eta) dy d\eta.$ 

Demonstração. Notemos que

 $b(x - y, \xi - \eta) = [(1 + \partial_y)^2 (1 + \partial_\eta)^2 a](x - y, \xi - \eta) = (1 - \partial_y)^2 (1 - \partial_\eta)^2 [a(x - y, \xi - \eta)].$ Logo,

$$\int \gamma(y)\gamma(\eta)b(x-y,\xi-\eta)dyd\eta = \int \gamma(y)\gamma(\eta)(1-\partial_y)^2(1-\partial_\eta)^2a(x-y,\xi-\eta)dyd\eta.$$

Como  $\gamma(y)\gamma(\eta)(1-\partial_y)^2(1-\partial_\eta)^2a(x-y,\xi-\eta)\in L^1(\mathbb{R}^2,A)$ , podemos aplicar o Teorema de Fubini e, considerando que  $(1-\partial_\eta)^2a(x-y,\xi-\eta)\in CB^\infty(\mathbb{R},A)$  para  $x,\xi,\eta$  fixados, aplicamos o lema 4.9:

$$\int \gamma(\eta) \int \gamma(y) (1 - \partial_y)^2 (1 - \partial_\eta)^2 a(x - y, \xi - \eta) dy d\eta = \int \gamma(\eta) (1 - \partial_y)^2 a(x, \xi - \eta) d\eta.$$

Novamente, para  $x, \xi$  fixos, pelo lema 4.9,  $\int \gamma(\eta)(1-\partial_{\eta})^2 a(x,\xi-\eta)d\eta = a(x,\xi)$ 

Corolário 4.12. Nas hipóteses da proposição 4.11, temos

$$a(z,\zeta) = \int \gamma(-x)\gamma(-\xi)b(x+z,\xi+\zeta)dxd\xi.$$

Nota 4.13. Para o caso geral, dada  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$ , seja  $b = \prod_{j=1}^{n} (1 + \partial_{y_j})^2 (1 + \partial_{\eta_j})^2 a$ , e temos, de modo análogo, que  $a(z, \zeta) = \int \overline{\gamma}(-x)\overline{\gamma}(-\xi)b(x+z, \xi+\zeta)dxd\xi$ , usando a notação da nota 4.10.

**Lema 4.14.** Sejam F a transformada de Fourier e  $E_{z,\zeta}$  definido como no capítulo 1. Então temos:

1. 
$$FE_{z,\zeta} = (E_{-\zeta,z})^{-1}F$$

2. 
$$F(E_{z,\zeta})^{-1} = E_{-\zeta,z}F$$
.

### Demonstração.

Dada  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,

1. 
$$FE_{z,\zeta}u(x) = \int e^{-ixy}E_{z,\zeta}u(y)dy = \int e^{-ixy}e^{i\zeta y}u(y-z)dy =$$

$$= \int e^{-i(y+z)(x-\zeta)}u(y)dy = e^{-iz(x-\zeta)}Fu(x-\zeta) = T_{\zeta}M_{-z}Fu(x) = (E_{-\zeta,z})^{-1}Fu(x).$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.} & FE_{z,\zeta}^{-1}u(x) = \int e^{-ixy}T_{-z}M_{-\zeta}u(y) d\!\!/ y = \int e^{-ixy}e^{-i\zeta(y+z)}u(y+z) d\!\!/ y = \\ & \int e^{-ix(y-z)}e^{-i\zeta y}u(y) d\!\!/ y = e^{ixz}\int e^{-iy(x+\zeta)}u(y) d\!\!/ y = e^{ixz}Fu(x+\zeta) = M_zT_{-\zeta}Fu(x) = \\ & E_{-\zeta,z}Fu(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

**Observação 4.15.** Lembremos que, como vimos na demonstração da proposição 2.5, dadas  $g, u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , temos que  $R_g u(x) = \int e^{ix\xi} Fu(\xi)g(x+J\xi) d\xi$ 

**Lema 4.16.** Dada  $g \in S(\mathbb{R}^n)$ , vale que

1. 
$$E_{z,\zeta}^{-1}R_g = R_{T_{-z-J\zeta}g}E_{z,\zeta}^{-1}$$

$$2. E_{z,\zeta}R_g = R_{T_{z+J\zeta}g}E_{z,\zeta}.$$

#### Demonstração.

1. Dada  $u \in S(\mathbb{R}^n)$ , pelo lema 4.14,

$$E_{z,\zeta}^{-1} R_g u(x) = e^{-i\zeta(x+z)} R_g u(x+z) = e^{-i\zeta(x+z)} \int e^{i(x+z)\xi} Fu(\xi) g(x+z+J\xi) d\xi.$$

$$\begin{split} R_{T_{-z-J\zeta}g}E_{z,\zeta}^{-1}u(x) &= \int e^{ix\xi}F(E_{z,\zeta}^{-1}u)(\xi)T_{-z-J\zeta}g(x+J\xi) \not d\xi = \\ &= \int e^{ix\xi}E_{-\zeta,z}Fu(\xi)g(x+z+J(\xi+\zeta)\not d\xi = \int e^{ix\xi}e^{iz\xi}Fu(\xi+\zeta)g(x+z+J(\xi+\zeta))\not d\xi = \\ &= \int e^{i(x+z)(\xi-\zeta)}Fu(\xi)g(x+z+J\xi)\not d\xi = E_{z,\zeta}^{-1}R_gu(x). \end{split}$$

$$\mathbf{2.} \qquad E_{z,\zeta}R_gu(x) = e^{i\zeta x}R_gu(x-z) = e^{i\zeta x}\int e^{i(x-z)\xi}Fu(\xi)g(x-z+J\zeta)d\xi.$$

$$\begin{split} R_{T_{z+J\zeta}g}E_{z,\zeta}u(x) &= \int e^{ix\xi}F(E_{z,\zeta}u)(\xi)T_{z+J\zeta}g(x+J\xi) \not d\xi = \\ &= \int e^{ix\xi}(E_{-\zeta,z})^{-1}Fu(\xi)g(x-z+J(\xi-\zeta)) \not d\xi = \int e^{ix\xi}e^{-iz(\xi-\zeta)}Fu(\xi-\zeta)g(x-z+J(\xi-\zeta)) \not d\xi = \\ &= \int e^{ix(\xi+\zeta)}e^{-iz\xi}Fu(\xi)g(x-z+J\xi) \not d\xi = E_{z,\zeta}R_gu(x). \quad \blacksquare \end{split}$$

**Proposição 4.17.** Dado  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$ , se  $[T, R_g] = 0, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , então  $[T_{z,\zeta}, R_g] = 0, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

Demonstração. Pelo lema 4.16, temos

$$T_{z,\zeta}R_g = E_{z,\zeta}^{-1}TE_{z,\zeta}R_g = E_{z,\zeta}^{-1}TR_{T_{z+J\zeta}g}E_{z,\zeta} = E_{z,\zeta}^{-1}R_{T_{z+J\zeta}g}TE_{z,\zeta} = R_gE_{z,\zeta}^{-1}TE_{z,\zeta} = R_gT_{z,\zeta}. \quad \blacksquare$$

Proposição 4.18. Dadas  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  e  $b = \prod_{j=1}^{n} (1 + \partial_{x_j})^2 (1 + \partial_{\xi_j})^2 a$ , se  $O(a) \in \mathcal{HS}$  e  $[O(a), R_g] = 0$ , para todo  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , então  $O(b) \in \mathcal{HS}$  e  $[O(b), R_g] = 0, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

**Demonstração.** Notemos que, como visto na demonstração de 4.7, se T = O(a) e B = O(b),  $B_{z,\zeta} = \prod_{j=1}^{n} (1 + \partial_{z_j})^2 (1 + \partial_{\zeta_j})^2 T_{z,\zeta}$ .

Logo, se 
$$(z,\zeta) \mapsto T_{z,\zeta} \in C^{\infty}, (z,\zeta) \mapsto B_{z,\zeta} \in C^{\infty}.$$

Vimos na proposição 4.17 que se  $[T, R_g] = 0, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , então  $[T_{z,\zeta}, R_g] = 0, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Assim, se  $\{e_j\}$  é a base canônica de  $\mathbb{R}^n$ ,

$$(\partial_{z_j} T_{z,\zeta}) R_g = \lim_{h \to 0} \frac{T_{z+he_j,\zeta} - T_{z,\zeta}}{h} R_g =$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{T_{z+he_j,\zeta} R_g - T_{z,\zeta} R_g}{h} = \lim_{h \to 0} R_g \frac{T_{z+he_j,\zeta} - T_{z,\zeta}}{h} = R_g (\partial_{z_j} T_{z,\zeta}).$$

De modo análogo, provamos que  $[R_g, B] = 0, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

**Teorema 4.19.** Dado  $T \in \mathcal{B}^*(\overline{S^A(\mathbb{R}^n)})$ , Heisenberg-suave, tal que para toda  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ ,  $[T, R_g] = 0$ . Supondo que vale 4.1, então existe  $F \in CB^\infty(\mathbb{R}^n, A)$  de modo que  $T = L_F$ .

**Demonstração.** Por 4.1 temos que existe  $a \in CB^{\infty}(\mathbb{R}^{2n}, A)$  de modo que T = O(a). Sejam  $b = \prod_{j=1}^{n} (1 + \partial_{x_j})^2 (1 + \partial_{\xi_j})^2 a$  e B = O(b). Pela proposição 4.18, temos que  $[B, R_g] = 0, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ . Logo,  $[B_{z,\zeta}, R_g] = 0, \forall g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , pela proposição 4.17. Assim, pelo visto na demonstração do teorema 2.12,  $B_{z,\zeta} = B_{z-J\zeta,0}$ .

Por outro lado, o símbolo de  $B_{z,\zeta}$  é  $b(x+z,\xi+\zeta)$  e o símbolo de  $B_{z-J\zeta,0}$  é  $b(x+z-J\zeta,\xi)$ . Portanto, por 4.1, temos que  $b(x+z,\xi+\zeta)=b(x+z-J\zeta,\xi)$ . Assim, pela nota 4.13, temos:

$$a(z,\zeta) = \int \overline{\gamma}(-x)\overline{\gamma}(-\xi)b(x+z,\xi+\zeta)dxd\xi =$$

$$= \int \overline{\gamma}(-x)\overline{\gamma}(-\xi)b(x+z-J\zeta,\xi)dxd\xi = a(z-J\zeta,0).$$

Tomando F(z)=a(z,0), temos  $F\in CB^{\infty}(I\!\!R^n,A)$  e  $a(z,\zeta)=F(z-J\zeta)$ , e, pela observação 1.8, portanto,  $T=L_F$ .

## Apêndice A

Veremos agora alguns resultados sobre integrais de funções que chegam num espaço de Banach, Integral de Bochner. Para isto, nos baseamos fundamentalmente no apêndice E de [13].

Seja E um espaço de Banach separável e seja  $\mathcal{B}(E)$  a  $\sigma$ -álgebra gerada pelos subconjuntos abertos de E.

**Definição A.1.** Dizemos que uma função  $f: \mathbb{R}^n \to E$  é mensurável se é mensurável com respeito a  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  e a  $\mathcal{B}(E)$ .

É fácil ver que, se f é mensurável, então  $x\mapsto \|f(x)\|$  é mensurável.

**Definição A.2.** Uma função mensurável  $f: \mathbb{R}^n \to E$  é dita simples se  $f(\mathbb{R}^n)$  é um subconjnto finito de E. Na verdade, se  $f(\mathbb{R}^n) = \{a_1, \dots, a_p\}$ , seja  $J_l = f^{-1}(a_l)$ ; então,  $f(x) = \sum_{l=1}^p a_l \chi_{J_l}(x)$ , onde  $\chi_{J_l}$  é a função característica de  $J_l$  e onde os conjuntos  $J_l$  são disjuntos e pertencem a  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ .

**Lema A.3.** Dada  $f: \mathbb{R}^n \to E$ , seja  $D \subseteq E$  enumerável denso em  $f(\mathbb{R}^n)$ . Então,  $\forall \varepsilon > 0, \forall a \in f(\mathbb{R}^n)$ , existem  $d \in D$  e  $r \in \mathbb{Q}$ , tais que  $||rd|| \le ||a||$  e  $||rd - a|| < \varepsilon$ .

**Demonstração.** Dado  $1 > \varepsilon > 0$ , como D é denso em  $f(\mathbb{R}^n)$ , existe  $d \in D$  tal que  $\|a - d\| < \varepsilon$ . Seja  $r \in \mathbb{Q}^+$  tal que  $1 - \varepsilon < r < 1$  e  $r \leq \frac{\|a\|}{\|d\|}$ . Assim,  $\|rd\| \leq \|a\|$  e temos

$$||rd - a|| \le ||d - rd|| + ||a - d|| \le ||d||(1 - r) + \varepsilon \le \frac{||a||}{r}\varepsilon + \varepsilon \le ||a||\frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} + \varepsilon.$$

Dado  $\varepsilon_1 > 0$ , escolhemos  $\varepsilon > 0$  de modo que  $||a|| \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon} + \varepsilon \le \varepsilon_1$  e temos  $||rd-a|| < \varepsilon_1$  e  $||d|| \le ||a|| \blacksquare$ 

**Proposição A.4.** Dada  $f: \mathbb{R}^n \to E$ , mensurável, existe uma seqüência  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$  de funções simples tal que  $\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) = \lim_{k \to \infty} f_k(x)$ , e  $||f_k(x)|| \le ||f(x)||, \forall k \in \mathbb{N}$ .

**Demonstração.** Suponhamos que f é não nula.

Seja  $D \subseteq E$  enumerável, denso em  $f(\mathbb{R}^n)$ . Seja D' o conjunto dos múltiplos racionais de D,  $D' = \{c_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ . Podemos assumir que  $c_1 = 0$ .

Para cada  $x \in \mathbb{R}^n$ , e cada  $k \in \mathbb{N}$ , seja  $E_k(x) \subseteq E$  dado por:

$$E_k(x) = \{c_j \in D', j \le k \in ||c_j|| \le ||f(x)||\}.$$

Como  $c_1 = 0$ ,  $E_k(x)$  é não vazio.

Vamos construir a sequência  $(f_k)_{k \in IV}$ , tomando  $f_k(x)$  o elemento de  $E_k(x)$  que está mais próximo de f(x).

Consideremos

$$A_k(x) = \{c_i \in E_k(x) / ||f(x) - c_i|| = \inf\{||f(x) - c_i||, c_i \in E_k(x)\}\}.$$

Seja  $I_k(x)$  o conjunto dos índices dos  $c_i \in A_k(x)$  e seja  $i_0 = \min I_k(x)$  e  $f_k(x) = c_{i_0}$ . Como os conjuntos  $\{x \in \mathbb{R}^n, f_k(x) = c_{i_0}\}$  podem ser descritos por meio de desigualdades envolvendo  $||f(x)||, ||c_j||, j = 1, \dots, k$ , e  $||f(x) - c_j||, j = 1, \dots, k$ , cada  $f_k$  é mensurável. É fácil ver, então, que  $f_k$  é simples,  $\forall k \in \mathbb{N}$ . Além disso, por construção de  $f_k$  e de  $E_k(x)$ , temos que  $||f_k(x)|| \leq ||f(x)||, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N}$ .

Vejamos agora que  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$  converge pontualmente para f. Consideremos:

- 1. Pelo lema A.3, para todo  $\varepsilon > 0$ , para todo  $x \in \mathbb{R}^n$ , existe  $c_{h_0} \in D'$  tal que  $\|c_{h_0}\| \leq \|f(x)\|$  (isto implica  $c_{h_0} \in E_{h_0}(x)$ ) e  $\|c_{h_0} f(x)\| < \varepsilon$ .
- 2. Se  $k \ge h_0$ ,  $E_{h_0}(x) \subseteq E_k(x)$ .
- 3.  $||f(x) f_k(x)|| \le ||f(x) c_k||$ , para qualquer  $c_k \in E_k(x)$ .

Assim, dado  $\varepsilon > 0$ , seja  $h_0 \in \mathbb{N}$  como em (1). Então temos,  $\forall k \geq h_0$ ,  $||f(x) - f_k(x)|| \leq ||f(x) - c_{h_0}|| < \varepsilon$ .

**Definição A.5.** Seja  $f: \mathbb{R}^n \to E$ , mensurável. Dizemos que f é Bochner integrável (integrável) se a função  $x \mapsto ||f(x)||$  é integrável.

Dada  $f: \mathbb{R}^n \to E$ , simples e integrável, com  $f(x) = \sum_{l=1}^p a_l \chi_{J_l}$ ,  $a_l \in E$  e  $J_l \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ , definimos a integral de f como segue:

$$\int f(x)dx = \sum_{l=1}^{p} a_l \mu(J_l),$$

onde  $\mu$  é a medida de Lebesgue em  $\mathbb{R}^n$ . É claro que f integrável implica que  $\mu(J_l) < \infty, \ l = 1, \dots, p$ .

É fácil ver que

$$\left\| \int f(x)dx \right\| \le \int \|f(x)\|dx$$

e que, se  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  e g uma função simples integrável,

$$\int (\alpha f + \beta g)(x)dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx.$$

Dada  $f: \mathbb{R}^n \to E$  integrável, seja  $(f_k)_{k \in \mathbb{I\! N}}$  uma seqüência de funções simples tal que  $f(x) = \lim_{k \to \infty} f_k(x), \forall x \in \mathbb{R}^n$  e tal que  $x \mapsto \sup_k \|f_k(x)\| = \|f(x)\|$  é integrável (ver A.4). Como  $\|f_k(x) - f(x)\| \le 2\|f(x)\|$ , pelo Teorema da Convergência Dominada,  $\int \|f_k(x) - f(x)\| dx \xrightarrow[x \to \infty]{} 0$ . Logo, a seqüência  $(\int f_k)_{k \in \mathbb{I\! N}}$  é de Cauchy em E e portanto converge.

Definimos

$$\int f(x)dx = \lim_{k \to \infty} \int f_k(x)dx.$$

É fácil ver que esta definição não depende da escolha da seqüência  $(f_k)_{k\in I\!\!N}$  [13, pg.352].

**Proposição A.6.** Seja  $f: \mathbb{R}^n \to E$ , integrável. Então

$$\left\| \int f(x)dx \right\| \le \int \|f(x)\|dx.$$

**Demonstração.** Seja  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$  uma seqüência de funções simples (como na proposição A.5), tal que  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ ,  $\sup_k \|f_k(x)\| \le \|f(x)\|$  e  $f(x) = \lim_k f_k(x)$ .

Logo, 
$$\left\| \int f_k(x) dx \right\| \le \int \|f_k(x)\| dx \le \int \|f(x)\| dx$$
. Como  $\int f(x) dx = \lim_{k \to \infty} \int f_k(x) dx$ , vale a tese.

Teorema da Convergência Dominada A.7. Sejam  $f, f_1, f_2, \cdots$  funções de  $\mathbb{R}^n$  em E, mensuráveis, tais que  $f(x) = \lim_{k \to \infty} f_k(x)$  para quase todo  $x \in \mathbb{R}^n$  e  $||f_k(x)|| \le g(x)$ , q.s., para todo  $k \in \mathbb{N}$ , onde  $g : \mathbb{R}^n \to [0, +\infty]$ , integrável. Então,  $f, f_1, \cdots$  são integráveis e  $\int f(x) dx = \lim_{k \to \infty} \int f_k(x) dx$ .

**Demonstração.** Como  $||f_k(x)|| \leq g(x)$  q.s.,  $\forall k \in I\!\!N$ , a integrabilidade de  $f_1, f_2, \cdots$  é imediata. Além disso, temos  $||f(x)|| \leq g(x)$  q.s. e f é integrável. Portanto,  $||(f_k - f)(x)|| \leq 2g(x)$  q.s.. Pelo Teorema da Convergência Dominada (caso escalar) temos então que  $\lim_{k \to \infty} \int ||(f_k - f)(x)|| dx = 0$ , e, pela proposição A.6, temos  $||\int (f_k - f)(x) dx|| \leq \int ||(f_k - f)(x)|| dx \underset{k \to \infty}{\to} 0$ .

**Observação A.8.** Se  $f: \mathbb{R}^n \to E$  é integrável e  $J \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ , definimos

$$\int_{I} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}^{n}} f(x)\chi_{J}(x)dx.$$

Se  $g: \mathbb{R} \to E$  é integrável, notemos que  $\int_{\mathbb{R}} g(t)dt = \lim_{R \to \infty} \int_{[-R,R]} g(t)dt$ , pois, se  $(R_k)_{k \in \mathbb{N}}$  é uma seqüência em  $\mathbb{R}^+$ , crescente, com  $\lim_{k \to \infty} R_k = +\infty$ , e se  $g_k(t) = g(t)\chi_{[-R_k,R_k]}(t)$ , temos que, para cada  $t \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{k \to \infty} g_k(t) = g(t)$  e  $\sup_k \|g_k(t)\| \le \|g(t)\|$ ; portanto, pelo Teorema da Convergência Dominada A.7

$$\int_{\mathbb{R}} g(t)dt = \lim_{k \to \infty} \int_{\mathbb{R}} g_k(t)dt = \lim_{k \to \infty} \int_{[-R_k, R_k]} g(t)dt.$$

**Definição A.9.** Seja  $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n, E)$  o conjunto das funções de  $\mathbb{R}^n$  em E integráveis. Definimos

$$||f||_{L^1} = \int ||f(x)|| dx$$
, para  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n, E)$ .

É claro que  $\|\cdot\|_{L^1}$  é semi-norma. É fácil ver que o conjunto  $L^1(\mathbb{R}^n, E)$  das classes de equivalência de  $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n, E)$ , com respeito à igualdade quase sempre, é um espaço vetorial normado onde  $\|\cdot\|_{L^1}$  é a norma ([13, proposição E.4]). Também podemos provar que  $L^1(\mathbb{R}^n, E)$  é completo adaptando a demonstração de [13, teorema 3.4.1].

De um modo análogo, definimos os espaços de Banach  $L^p(\mathbb{R}^n, E)$  das classes de equivalência de funções iguais q.s. que tem a propriedade  $\int \|f(x)\|^p dx < \infty$ . A norma é dada por  $\|f\|_{L^p} = \left(\int \|f(x)\|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$ , para  $f \in L^p(\mathbb{R}^n, E)$ .

**Proposição A.10.** As funções simples do tipo  $\sum_{l=1}^{q} a_l \chi_{J_l}, \ \mu(J_l) < \infty, a_l \in E$ , são densas em  $L^p(\mathbb{R}^n, E)$ .

**Demonstração.** É fácil ver, pela definição A.5, que as funções simples do enunciado pertencem a  $L^p(\mathbb{R}^n, E)$ . Dada uma função  $f \in L^p(\mathbb{R}^n, E)$ , seja uma seqüência de funções simples  $(f_k)_{k \in \mathbb{I\! N}}$ , como na proposição A.4, tal que, para quase todo  $x \in \mathbb{I\! R}^n$ , vale que  $f(x) = \lim_{k \to \infty} f_k(x)$  e  $||f_k(x)|| \le ||f(x)||$ . Assim,  $||(f_k - f)(x)||^p \le 2^p ||f(x)||^p$ . Logo, pelo Teorema da Convergência Dominada, (A.7),  $\lim_{k \to \infty} \int ||(f_k - f)(x)||^p dx = 0$ , o que implica  $||f - f_k||_{L^p} \underset{k \to \infty}{\to} 0$ .

Um resultado útil, mas que não provaremos aqui, é o teorema E.9 de [13], que diz o seguinte:

**Teorema A.11.** Uma função  $f: \mathbb{R}^n \to E$  é mensurável se e somente se, para todo funcional linear contínuo  $\varphi$  em  $E^*$ , a função  $\varphi \circ f$  é mensurával.

**Proposição A.12.** Dada  $f: \mathbb{R}^n \to E$ , integrável, então, para qualquer funcional linear contínuo  $\varphi \in E^*$  vale que

$$\int \varphi \circ f(x)dx = \varphi \left( \int f(x)dx \right) \quad (*)$$

Além disso, se existe  $a_0 \in E$  tal que  $\forall \varphi \in E^*, \varphi(a_0) = \int \varphi \circ f(x) dx$ , então  $a_0 = \int f(x) dx$ .

**Demonstração.** Dado qualquer  $\varphi \in E^*$ , por (A.11), sabemos que  $\varphi \circ f$  é mensurável. Vejamos que  $\varphi \circ f$  é integrável.

$$\int |\varphi \circ f(x)| dx \le \int \|\varphi\| \|f(x)\| dx = \|\varphi\| \int \|f(x)\| dx.$$

Como f é integrável,  $\varphi \circ f$  é integrável.

Suponhamos que f é simples,  $f(x) = \sum_{l=1}^{p} a_l \chi_{J_l}(x)$ ,  $a_l \in E$  e  $\mu(J_l) < \infty$ , onde  $J_l$  são disjuntos,  $l = 1, \dots, p$ .

$$\varphi\left(\int f(x)dx\right) = \varphi\left(\sum_{l=1}^{p} a_{l}\mu(J_{l})\right) = \sum_{l=1}^{p} \varphi(a_{l})\mu(J_{l}).$$

$$\int \varphi \circ f(x)dx = \int \varphi\left(\sum_{l=1}^{p} a_{l}\chi_{J_{l}}(x)\right)dx = \int \sum_{l=1}^{p} \varphi(a_{l})\chi_{J_{l}}(x)dx = \sum_{l=1}^{p} \varphi(a_{l})\mu(J_{l}).$$

Portanto, vale (\*) para funções simples.

Seja agora  $f: \mathbb{R}^n \to E$  integrável e  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$  uma seqüência de funções simples tal que, para quase todo  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(x) = \lim_{k \to \infty} f_k(x)$  e  $\sup_k \|f_k(x)\| \le \|f(x)\|$ . Desta maneira, é claro que  $f_k$  é integrável para todo  $k \in \mathbb{N}$  e temos que

$$\varphi\left(\int f_k(x)dx\right) = \int \varphi \circ f_k(x)dx.$$
 (1)

Além disso,  $||f_k(x)|| \le ||f(x)|| \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , para quase todo  $x \in \mathbb{R}^n$ ; então, pelo Teorema da Convergência Dominada (A.7),  $\lim_{k\to\infty} \int f_k(x)dx = \int f(x)dx$  e, portanto,

$$\lim_{k \to \infty} \varphi \left( \int f_k(x) dx \right) = \varphi \left( \int f(x) dx \right). \quad (2)$$

Por outro lado,  $|\varphi \circ f_k(x)| \leq ||\varphi|| ||f_k(x)|| \leq ||\varphi|| ||f(x)|| \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , para quase todo  $x \in \mathbb{R}^n$  e  $\forall k \in \mathbb{N}$ . Como  $\lim_{k \to \infty} \varphi \circ f_k(x) = \varphi \circ f(x)$  q.s., pelo Teorema da Convergência Dominada,  $\varphi \left( \int f(x) dx \right) = \lim_{k \to \infty} \varphi \left( \int f_k(x) dx \right) = \lim_{k \to \infty} \int \varphi \circ f_k(x) dx = \int \varphi \circ f(x) dx$ , e vale (\*).

Suponhamos que existe  $a_0 \in E$  tal que  $\varphi(a_0) = \int \varphi \circ f dx$ ,  $\forall \varphi \in E^*$ . Deste modo, temos que  $\varphi\left(a_0 - \int f(x) dx\right) = 0$ ,  $\forall \varphi \in E^*$ . Logo, pelo Teorema de Hahn-

Banach, (ver também [13, corolário E.8]), existe 
$$\psi \in E^*$$
 tal que  $\psi \left( a_0 - \int f(x) dx \right) = \left\| a_0 - \int f(x) dx \right\|$ , ou seja,  $\left\| a_0 - \int f(x) dx \right\| = 0$  e portanto  $a_0 = \int f(x) dx$ .

Tendo este resultado, podemos ver que várias propriedades que são válidas para integração de funções complexas são válidas também para funções que tomam valores num espaço de Banach separável.

**Teorema de Fubini A.13.** Se  $f \in L^1(\mathbb{R}^{2n}, E)$ , então  $y \mapsto f(x, y)$  pertence a  $L^1(\mathbb{R}^n, E)$  para quase todo  $x \in \mathbb{R}^n$  e  $x \mapsto f(x, y)$  pertence a  $L^1(\mathbb{R}^n, E)$  para quase todo  $y \in \mathbb{R}^n$ . Além disso, as funções  $h(x) = \int f(x, y) dy$  e  $k(y) = \int f(x, y) dx$  definidas q.s. pertencem a  $L^1(\mathbb{R}^n, E)$  e vale:

$$\int f(x,y)dxdy = \int \left[\int f(x,y)dy\right]dx = \int \left[\int f(x,y)dx\right]dy.$$

**Demonstração.** Por definição, temos que  $||f|| \in L^1(\mathbb{R}^{2n})$ . Logo, pelo Teorema de Fubini, [13, (2.37)], temos que, para quase todo  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $y \mapsto ||f(x,y)||$  pertence a  $L^1(\mathbb{R}^n)$ , isto é,  $y \mapsto f(x,y) \in L^1(\mathbb{R}^n,E)$  q.s.. Analogamente para  $x \mapsto f(x,y)$ .

Também temos que, se  $\overline{h}(x) = \int \|f(x,y)\| dy$ ,  $\overline{h} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ . E, como  $\|h(x)\| \le \overline{h}(x)$ ,  $h \in L^1(\mathbb{R}^n, E)$ . Do mesmo modo,  $k \in L^1(\mathbb{R}^n, E)$ .

Por outro lado, dado qualquer  $\varphi \in E^*$ , temos  $\varphi \circ f \in L^1(\mathbb{R}^{2n})$ , pois  $\int \|\varphi \circ f(x,y)\| dxdy \leq \|\varphi\| \int \|f(x,y)\| dxdy < \infty$ . Também  $\varphi \circ k$ ,  $\varphi \circ h \in L^1(\mathbb{R}^n)$ . Então, apliquemos [3, 2.37]:

$$\int \varphi \circ h(x)dx = \int \left[\varphi \left(\int f(x,y)dy\right)\right]dx = \int \left[\int \varphi \circ f(x,y)dy\right]dx =$$

$$= \int \left[\int \varphi \circ f(x,y)dx\right]dy = \int \varphi \circ k(y)dy.$$

Logo, pela proposição A.12,  $\varphi\left(\int h(x)dx\right)=\varphi\left(\int k(y)dy\right),\ \forall \varphi\in E^*,$  e então  $\int h(x)dx=\int k(y)dy$ , ou seja,

$$\int \left[ \int f(x,y)dy \right] dx = \int \left[ \int f(x,y)dx \right] dy.$$

Do mesmo modo, temos

$$\int \varphi \circ f(x,y) dx dy = \int \varphi \circ k(y) dy, \ \forall \varphi \in E^* \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int f(x,y) dx dy = \int k(y) dy = \int \left[ \int f(x,y) dx \right] dy. \blacksquare$$

Teorema Fundamental do Cálculo A.14. Seja  $f:[a,b]\to E$  uma função contínua e diferenciável tal que f' (a função derivada de f) é limitada. Então:

$$\int_{[a,b]} f'(t)dt = f(b) - f(a).$$

**Demonstração.** Dado  $\varphi \in E^*$ , qualquer, consideremos a função  $\varphi \circ f : [a, b] \to C$ . Seja  $F(t) = \varphi \circ f(t)$ . Notemos que

$$F'(t_0) = \lim_{h \to 0} \frac{F(t_0 + h) - F(t_0)}{h} = \lim_{h \to 0} \varphi\left(\frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h}\right) = \varphi \circ f'(t_0).$$

Logo, F é contínua, diferenciável, com derivada limitada. Além disso, como F' é mensurável, isto é,  $\varphi \circ f'$  é mensurável para todo  $\varphi \in E^*$ , pelo teorema A.11 temos que f' é mensurável. Assim, por  $[\mathbf{3},\ (3.36)]$ , temos:  $\int_a^b F'(t)dt = F(b) - F(a)$ , isto é,  $\varphi\left(\int_{[a,b]} f'(t)dt\right) = \varphi(f(b) - f(a))$ ,  $\forall \varphi \in E^*$  e, portanto,  $\int_{[a,b]} f'(t)dt = f(b) - f(a)$ .

Corolário A.15. Integração por partes. Dadas  $f,g \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n,E)$ , então, para  $-\infty < a < b < \infty$ , vale que

$$\int_{[a,b]} f(x)g'(x)dx + \int_{[a,b]} f'(x)g(x)dx = f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

**Demonstração.** Notemos que  $fg \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n, E)$ . Além disso, (fg)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x). Logo, pelo Teorema Fundamental do Cálculo A.14 aplicado à função fg,

$$\int_{[a,b]} f(x)g'(x)dx + \int_{[a,b]} f'(x)g(x)dx = f(b)g(b) - f(a)g(a). \quad \blacksquare$$

Corolário A.16. Seja A uma  $C^*$ -álgebra separável. Dadas  $f \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n, A)$ , com  $f(x) = x^{\gamma}e^{ix\xi}$ ,  $\gamma \in \mathbb{N}^n$  dado, e  $g \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , então temos que

$$\int \left[\partial_{x_j} f(x)\right] g(x) dx = -\int f(x) \left[\partial_{x_j} g(x)\right] dx.$$

**Demonstração.** Suponhamos, sem perda da generalidade, que j=1. Como  $fg \in L^1(\mathbb{R}^n, A)$ , temos, pelo Teorema de Fubini A.13, que

$$\int \partial_{x_1} \left[ f(x)g(x) \right] dx = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left( \int_{\mathbb{R}} \partial_{x_1} \left[ f(x)g(x) \right] dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n =$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left( \lim_{R \to \infty} \int_{[-R,R]} \partial_{x_1} \left[ f(x)g(x) \right] dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n =$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left( \lim_{R \to \infty} \left[ f(R, x_2, \cdots, x_n) g(R, x_2, \cdots, x_n) - f(R, x_2, \cdots, x_n) g(R, x_2, \cdots, x_n) \right] \right) dx_2 \cdots dx_n = 0$$

(ver Observação A.8), pelo corolário A.15. Portanto,

$$\int \left[\partial_{x_1} f(x)\right] g(x) dx = -\int f(x) \left[\partial_{x_1} g(x)\right] dx. \quad \blacksquare$$

**Proposição A.17.** Seja A uma C\*-álgebra separável e seja  $f \in L^2(\mathbb{R}^n, A)$ . Então, se  $\int f(x)^* f(x) dx = 0, f(x) = 0, \text{ para quase todo } x \in \mathbb{R}^n.$ 

**Demonstração.** Dado um funcional positivo,  $\psi \in A^*$ , temos que  $\psi(f(x)^*f(x)) \geq 0$ . Por outro lado, pela proposição (A.12) ,  $\int \psi(f(x)^*f(x)) \, dx = 0$ , o que implica  $\psi(f(x)^*f(x)) = 0$  q.s.. Como qualquer funcional linear  $\varphi \in A^*$  é dado por  $\varphi = (\psi_1^+ - \psi_1^-) + i(\psi_2^+ - \psi_2^-)$ , onde  $\psi_i^+, \psi_i^-$  são funcionais lineares positivos, i = 1, 2 ([5, teorema 3.3.10 e comentários acima]), temos que  $\varphi(f^*(x)f(x)) = 0$ , q.s.,  $\forall \varphi \in A^*$ .

Notemos que a bola unitária,  $\mathcal{B}$ , de  $A^*$  é compacta na topologia fraca\* pelo teorema de Banach-Alaoglu ([6, 3.15]) e portanto, como A é separável,  $\mathcal{B}$  é metrizável na topologia fraca\* ([6, 3.16]). Logo a bola unitária de  $A^*$  é separável (todo espaço métrico

compacto é separável). Seja  $\mathcal{D}\subseteq\mathcal{B}$  um subconjunto enumerável denso na topologia fraca\*.

Vimos que para qualquer  $\varphi_m \in \mathcal{D}$ ,  $\varphi_m(f^*(x)f(x)) = 0$  q.s.. Portanto, o conjunto  $E = \{x \in \mathbb{R}^n : \varphi_m(f^*(x)f(x)) \neq 0$ , para algum  $\varphi_m \in \mathcal{D}\}$  tem medida nula. Além disso, se  $x \notin E$  temos que  $\varphi_m(f^*(x)f(x)) = 0$  para todo  $\varphi_m \in \mathcal{D}$  e então  $\phi(f^*(x)f(x)) = 0$  para todo  $\phi \in \mathcal{B}$ . Assim, se  $x \notin E$ ,  $\varphi(f^*(x)f(x)) = 0$ ,  $\forall \varphi \in A^*$ . Logo, se  $x \notin E$ , f(x) = 0; ou seja, f(x) = 0 para quase todo  $x \in \mathbb{R}^n$ .

Proposição A.18. Mudança de variável. Sejam  $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$  um difeomorfismo  $C^1$  e  $D_xT$  a transformação linear dada pela matriz  $\left(\frac{\partial T_i}{\partial x_j}(x)\right)_{ij}$ ; e seja det  $D_xT$  o determinante da matriz acima. Se  $f \in L^1(\mathbb{R}^n, A)$ , temos que

$$\int f(x)dx = \int f \circ T(x)|\det D_x T|dx.$$

**Demonstração.** Dado qualquer  $\varphi \in A^*$ ,  $\varphi \circ f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ . Logo, por [3, (2.47)],  $\int \varphi \circ f(x) dx = \int \varphi \circ f \circ T |\det D_x T| dx, \text{ o que implica que, } \forall \varphi \in A^*, \varphi \left(\int f(x) dx\right) = \varphi \left(\int f \circ T |\det D_x T| dx\right) \text{ e portanto } \int f(x) dx = \int f \circ T |\det D_x T| dx. \blacksquare$ 

**Proposição A.19.** Dada uma  $C^*$ -álgebra separável, A, temos que  $S^A(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $L^2(\mathbb{R}^n,A)$ .

**Demonstração.** Vemos em [3, (8.17)] a demonstração de que  $S(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ . A demonstração de que  $S^A(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $L^2(\mathbb{R}^n, A)$  é feita seguindo os mesmos passos. Primeiro, provamos que as funções contínuas de suporte compacto são densas em  $L^2(\mathbb{R}^n, A)$ . Depois, a demonstração de que as funções  $C^{\infty}$  de suporte compacto são densas em  $L^2(\mathbb{R}^n, A)$  segue por convolução como no caso escalar.

## Apêndice B

Usaremos aqui vários resultados do apêndice A e, portanto, consideraremos A uma  $C^*$ -álgebra separável.

**Definição B.1.** Dada  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , definimos a Transformada de Fourier, F, de u, como segue:

$$F(u)(x) = \int e^{-ix\xi} u(\xi) d\xi$$
, onde  $d\xi = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} d\xi$ .

Temos, como no caso escalar ([12, teorema V.1.1]), que F é um operador contínuo de  $S^A(\mathbb{R}^n)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$ .

**Proposição B.2.** F é continuamente inversível de  $S^A(\mathbb{R}^n)$  em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  e vale que

$$F^{-1}(u)(x) = \int e^{ix\xi} u(\xi) d\xi, \quad u \in S^A(I\!\!R^n). \quad (*)$$

**Demonstração.** Usaremos a função auxiliar  $\phi(x) = e^{-\frac{|x|^2}{2}}$ . Notemos que  $\hat{\phi}(\xi) = \phi(\xi)$  ([12, exemplo V.1.2]), onde  $\hat{\phi}$  é a transformada de Fourier (usual) de  $\phi$ . Tomemos, em (\*), u = F(v), para  $v \in S^A(\mathbb{R}^n)$ .

$$v(x) = \int e^{ix\xi} \left[ \int e^{-iy\xi} u(y) dy \right] d\xi.$$

Aqui não podemos trocar a ordem de integração pois  $e^{i(x-y)\xi}v(y)$  não é integrável em  $\xi$  se  $v(y) \neq 0$ . Por este motivo, vamos usar a função  $\phi$  do seguinte modo:

Seja  $\phi_{\varepsilon}(x) = \phi(\varepsilon x)$ , para  $\varepsilon > 0$ , dado. É fácil ver que  $\hat{\phi}_{\varepsilon}(x) = \varepsilon^{-n}\phi(\frac{x}{\varepsilon})$ . Assim, aplicando o Teorema de Fubini (A.13),

$$\int \phi_{\varepsilon}(\xi) e^{ix\xi} \left[ \int e^{-iy\xi} v(y) dy \right] d\xi = \int e^{-iy\xi} v(y) \left[ \int e^{ix\xi} \phi_{\varepsilon}(\xi) d\xi \right] dy = 0$$

$$= \int v(y) \left[ \int e^{-i(y-x)\xi} \phi_{\varepsilon}(\xi) d\xi \right] dy = \int v(y) \hat{\phi_{\varepsilon}}(y-x) dy = \int v(y+x) \hat{\phi_{\varepsilon}}(y) dy = \int v(y+x) \hat{\phi_{\varepsilon}}(y)$$

E temos  $\lim_{\varepsilon\to 0}\phi_\varepsilon(x)=1$ ,  $\lim_{\varepsilon\to 0}v(x+\varepsilon y)=v(x)$  e, pelo visto acima:

$$\int e^{ix\xi}\phi_{\varepsilon}(\xi)F(v)(\xi)d\xi = \int v(x+\varepsilon y)\phi(y)dy.$$

Por outro lado,  $||e^{ix\xi}\phi_{\varepsilon}(\xi)F(v)(\xi)|| \leq ||F(v)(\xi)|| \in L^{1}(\mathbb{R}^{n})$  e  $||v(x+\varepsilon y)\phi(y)|| \leq \sup_{x\in\mathbb{R}^{n}}||v(x)||||\phi(y)|| \in L^{1}(\mathbb{R}^{n})$ .

Tomando  $\varepsilon \to 0$ , pelo Teorema da Convergência Dominada (A.7), temos

$$\int e^{ix\xi} F(v)(\xi) d\xi = \int v(x)\phi(y) dy.$$

Como 
$$\int \phi(y) dy = 1$$
,  $v(x) = \int e^{ix\xi} F(v)(\xi) d\xi$ , o que prova (\*). A continuidade de  $F^{-1}$  se demonstra de modo análogo à continuidade de  $F$ , ([12,

A continuidade de  $F^{-1}$  se demonstra de modo análogo à continuidade de F, ([12, teorema V.1.1]).

**Proposição B.3.** F é um operador "unitário" em  $S^A(\mathbb{R}^n)$ , com respeito ao produto interno definido no início do capítulo 1.

**Demonstração.** Dadas  $u, v \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , pelo Teorema de Fubini,

$$< F(u), v> = \int \left[ \int e^{-ix\xi} u(\xi) d\!\!\!/ \xi \right]^* v(x) dx = \int u(\xi)^* \left[ \int e^{ix\xi} v(x) d\!\!\!/ x \right] d\xi = < u, F^{-1}(v)>.$$

Portanto  $F^* = F^{-1}$  e F é unitário em  $S^A(I\!\!R^n)$ .  $\blacksquare$ 

Corolário B.4. Se  $u \in S^A(\mathbb{R}^n)$ , então  $||F(u)||_2 = ||u||_2$ .

**Demonstração.**  $< F(u), F(u) > = < u, F^{-1}(F(u)) > = < u, u >$ , portanto  $||F(u)||_2 = ||u||_2$ .

Corolário B.5. Dadas  $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n, A)$ , temos que  $\langle F(f), F(g) \rangle = \langle f, g \rangle$ .

**Demonstração.** Sabemos, pela proposição (3.9) que  $L^2(\mathbb{R}^n,A)\subseteq \overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$ . Assim, existem seqüências  $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$  e  $(g_l)_{l\in\mathbb{N}}$  de funções em  $S^A(\mathbb{R}^n)$  tais que  $\lim_{k\to\infty}\|f_k-f\|_2=0$  e  $\lim_{l\to\infty}\|g_l-g\|_2=0$ . Pelo corolário B.4, F é contínua em  $\overline{S^A(\mathbb{R}^n)}$  com a norma  $\|\cdot\|_2$ . Assim, pela proposição B.3,  $< F(f), F(g) >= \lim_{k,l} < F(f_k), F(g_l) >= \lim_{k,l} < f_k, g_l >=< f, g > .$ 

# Referências Bibliográficas

- [1] Marc A. Rieffel, Deformation Quantization for actions of  $\mathbb{R}^d$ , A.M.S. Memoirs, 506, 1993, ix+93pp.
- [2] H. O. Cordes, The technique of pseudifferencial operators, London Math. Soc. Lect. N. Series 202, 1995, xii+382pp.
- [3] Gerald B. Folland, *Real Analysis*, J. Wiley & S. Interscience, 1984, xiv+350pp.
- [4] M. Reed & B. Simon, Methods of Modern Mathematical Physics, I, 1972, xvi+400pp.
- [5] Gerard T. Murphy,  $C^*$ -algebras and Operator Theory, Ac. Press, 1990, x+286pp.
- [6] Walter Rudin, Functional Analysis, Mc-Graw Hill, 1991, xvi+424pp.
- [7] K. K. Jensen & K. Thomsen, *Elements of KK-Theory*, Birkhäuser, 1991, viii+202pp.
- [8] François Treves, Topological vector spaces, Distributions and Kernels, Ac. Press, 1967, xvi+565pp.
- [9] Marc A. Rieffel, Square Integrable Representations of Hilbert Algebras, J. Funct. Analysis 3 (1969) 265-300.
- [10] A. P. Calderón & R. Vaillancourt, On the boundedness of pseudodifferential operators, J. Math. Soc. Japan 23 (1971) 374-378.

- [11] Jörg Seiler, Continuity of Edge and Corner Pseudodifferential Operators, Math. Nach. 205 (1999) 163-182.
- [12] Jorge Hounie, *Teoria Elementar das Distribuições*, 12º Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1979, vi+164pp.
- [13] Donald C. Cohn Measure Theory, Birkhäuser, 1980, x+372pp...
- [14] S. T. Melo & M. I. Merklen, On a conjectured noncommutative Beals-Cordes-type characterization, A.M.S. Proc. 130 (2002) 1997-2000.
- [15] J. J. Kohn & L. Niremberg, An Algebra of Pseudo-Differential Operators, Comm. Pure Appl. Math. 18 (1965) 269-305.
- [16] C. Evans Lawrence, Partial Differential Equations, A. M. S., 1991.
- [17] H. O. Cordes, On pseuso-differential operators and smoothness of special Lie-group representations, Manuscripta Math. 28 (1979) 51-69.