

Basis Manifold

Aleks Kleyn

ABSTRACT. In this paper we study a symmetry group of vector space. Basis manifold is a homogeneous space of a symmetry group. This concept leads us to the definition of active and passive transformations on basis manifold. Active transformation can be expressed as a transformation of vector space. Passive transformation gives ability to define concepts of invariance and of geometrical object.

1. INTRODUCTION

This paper was written under the great influence of the book [1]. The studying of a homogenous space of a group of symmetry of a vector space leads us to the definition of a basis of this space and a basis manifold. We introduce two types of transformation of a basis manifold: active and passive transformations. The difference between them is that the active transformation can be expressed as a transformation of an original space. As it is shown in [1] passive transformation gives ability to define concepts of invariance and of geometrical object.

Two opposite points of view about a geometrical object meet in definition 6.3. On the one hand we determine coordinates of the geometrical object relative to a given basis and introduce the law of transition of coordinates during transformation of the basis. At the same time we study the set of coordinates of the geometrical object relative to different bases as a single whole. This gives us an opportunity to study the geometrical object without using coordinates.

2. REPRESENTATION OF GROUP

Definition 2.1. We call the map

$$t : M \rightarrow M$$

nonsingular transformation, if there exists inverse map. $\square$

Definition 2.2. Transformations is **left-side transformations** if it acts from left

$$u' = tu$$

We denote $l(M)$ the set of left-side nonsingular transformations of set M . $\square$

Definition 2.3. Transformations is **right-side transformations** if it acts from right

$$u' = ut$$

We denote $r(M)$ the set of right-side nonsingular transformations of set M . $\square$

We denote δ identical transformation.

Key words and phrases. vector space, differential geometry, basis, geometrical object.
Aleks_Kleyn@MailAPS.org.

Definition 2.4. Let G be group. We call map

$$(2.1) \quad f : G \rightarrow l(M)$$

left-side representation of group G in set M if map f holds

$$(2.2) \quad f(ab)u = f(a)(f(b)u)$$

$$(2.3) \quad f(e) = \delta$$

□

Definition 2.5. Let G be group. We call map

$$(2.4) \quad f : G \rightarrow r(M)$$

right-side representation of group G in set M if map f holds

$$(2.5) \quad uf(ab) = (uf(a))f(b)$$

$$(2.6) \quad f(e) = \delta$$

□

Any statement which holds for left-side representation of group holds also for right-side representation. For this reason we use the common term **representation of group** and use notation for left-side representation in case when it does not lead to misunderstanding.

Theorem 2.6. For any $g \in G$

$$(2.7) \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

Proof. Since (2.2) and (2.3), we have

$$u = \delta u = f(gg^{-1})u = f(g)(f(g^{-1})u)$$

This completes the proof.

□

Theorem 2.7. Let $l(M)$ be a group with respect to multiplication

$$(2.8) \quad (t_1 t_2)u = t_1(t_2 u)$$

and δ be unit of group $l(M)$. Let map (2.1) be a homomorphism of group

$$(2.9) \quad f(ab) = f(a)f(b)$$

Then this map is representation of group G which we call **left-side covariant representation**.

Proof. Since f is homomorphism of group, we have $f(e) = \delta$.

Since (2.8) and (2.9), we have

$$f(ab)u = (f(a)f(b))u = f(a)(f(b)u)$$

According definition 2.4 f is representation.

□

Theorem 2.8. Let $r(M)$ be a group with respect to multiplication

$$(2.10) \quad u(t_1 t_2) = (ut_1)t_2$$

and δ be unit of group $r(M)$. Let map (2.4) be a homomorphism of group

$$(2.11) \quad f(ab) = f(a)f(b)$$

Then this map is representation of group G which we call **right-side covariant representation**.

Proof. Since f is homomorphism of group, we have $f(e) = \delta$.

Since (2.10) and (2.11), we have

$$uf(ab) = u(f(a)f(b)) = (uf(a))f(b)$$

Accordinging definition 2.5 f is representation. □

Theorem 2.9. Let $l(M)$ be a group with respect to multiplication

$$(2.12) \quad (t_2 t_1)u = t_1(t_2 u)$$

and δ be unit of group $l(M)$. Let map (2.1) be an antihomomorphism of group

$$(2.13) \quad f(ba) = f(a)f(b)$$

Then this map is representation of group G which we call **left-side contravariant representation**.

Proof. Since f is antihomomorphism of group, we have $f(e) = \delta$.

Since (2.12) and (2.13), we have

$$f(ab)u = (f(b)f(a))u = f(a)(f(b)u)$$

Accordinging definition 2.4 f is representation. □

Theorem 2.10. Let $r(M)$ be a group with respect to multiplication

$$(2.14) \quad u(t_2 t_1) = (ut_1)t_2$$

and δ be unit of group $r(M)$. Let map (2.4) be an antihomomorphism of group

$$(2.15) \quad f(ba) = f(a)f(b)$$

Then this map is representation of group G which we call **right-side contravariant representation**.

Proof. Since f is antihomomorphism of group, we have $f(e) = \delta$.

Since (2.14) and (2.15), we have

$$uf(ab) = u(f(b)f(a)) = (uf(a))f(b)$$

Accordinging definition 2.5 f is representation. □

Example 2.11. The group operation determines two different representations on the group: the **left shift** which we introduce by the equation

$$(2.16) \quad b' = L(a)b = ab$$

and the **right shift** which we introduce by the equation

$$(2.17) \quad b' = R(a)b = ba$$

□

Theorem 2.12. Let representation

$$u' = f(a)u$$

be covariant representation. Then representation

$$u' = h(a)u = f(a^{-1})u$$

is contravariant representation.

Proof. Statement follows from chain of equations

$$h(ab) = f((ab)^{-1}) = f(b^{-1}a^{-1}) = f(b^{-1})f(a^{-1}) = h(b)h(a)$$

□

Definition 2.13. Let f be representation of the group G in set M . For any $v \in M$ we define **orbit of representation of the group G** as set

$$\mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v) = \{w = f(g)v : g \in G\}$$

□

Since $f(e) = \delta$ we have $v \in \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$.

Theorem 2.14. *Suppose*

$$(2.18) \quad v \in \mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u)$$

Then

$$\mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u) = \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$$

Proof. From (2.18) it follows that there exists $a \in G$ such that

$$(2.19) \quad v = f(a)u$$

Suppose $w \in \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$. Then there exists $b \in G$ such that

$$(2.20) \quad w = f(b)v$$

If we substitute (2.19) into (2.20) we get

$$(2.21) \quad w = f(b)(f(a)u)$$

Since (2.2), we see that from (2.21) it follows that $w \in \mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u)$. Thus

$$\mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v) \subseteq \mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u)$$

Since (2.7), we see that from (2.19) it follows that

$$(2.22) \quad u = f(a)^{-1}v = f(a^{-1})v$$

From (2.22) it follows that $u \in \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$ and therefore

$$\mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u) \subseteq \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$$

This completes the proof. □

Theorem 2.15. *Suppose f_1 is representation of group G in set M_1 and f_2 is representation of group G in set M_2 . Then we introduce **direct product of representations f_1 and f_2 of group***

$$\begin{aligned} f &= f_1 \otimes f_2 : G \rightarrow M_1 \otimes M_2 \\ f(g) &= (f_1(g), f_2(g)) \end{aligned}$$

Proof. To show that f is a representation, it is enough to prove that f satisfies the definition 2.4.

$$\begin{aligned} f(e) &= (f_1(e), f_2(e)) = (\delta_1, \delta_2) = \delta \\ f(ab)u &= (f_1(ab)u_1, f_2(ab)u_2) \\ &= (f_1(a)(f_1(b)u_1), f_2(a)(f_2(b)u_2)) \\ &= f(a)(f_1(b)u_1, f_2(b)u_2) \\ &= f(a)(f(b)u) \end{aligned}$$

□

3. SINGLE TRANSITIVE REPRESENTATION OF GROUP

Definition 3.1. We call **kernel of inefficiency of representation of group G** a set

$$K_f = \{g \in G : f(g) = \delta\}$$

If $K_f = \{e\}$ we call representation of group G **effective**. □

Theorem 3.2. A kernel of inefficiency is a subgroup of group G .

Proof. Assume $f(a_1) = \delta$ and $f(a_2) = \delta$. Then

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2)u &= f(a_1)(f(a_2)u) = u \\ f(a^{-1}) &= f^{-1}(a) = \delta \end{aligned}$$

□

If an action is not effective we can switch to an effective one by changing group $G_1 = G/K_f$ using factorization by the kernel of inefficiency. This means that we can study only an effective action.

Definition 3.3. We call a representation of group **transitive** if for any $a, b \in V$ exists such g that

$$a = f(g)b$$

We call a representation of group **single transitive** if it is transitive and effective. □

Theorem 3.4. Representation is single transitive if and only if for any $a, b \in V$ exists one and only one $g \in G$ such that $a = f(g)b$

Definition 3.5. We call a space V **homogeneous space of group G** if we have single transitive representation of group G on V . □

Theorem 3.6. If we define a single transitive representation f of the group G on the manifold A then we can uniquely define coordinates on A using coordinates on the group G .

If f is a covariant representation than $f(a)$ is equivalent to the left shift $L(a)$ on the group G . If f is a contravariant representation than $f(a)$ is equivalent to the right shift $R(a)$ on the group G .

Proof. We select a point $v \in A$ and define coordinates of a point $w \in A$ as coordinates of the transformation a such that $w = f(a)v$. Coordinates defined this way are unique up to choice of an initial point $v \in A$ because the action is effective.

If f is a covariant representation we will use the notation

$$f(a)v = av$$

Because the notation

$$f(a)(f(b)v) = a(bv) = (ab)v = f(ab)v$$

is compatible with the group structure we see that the covariant representation f is equivalent to the left shift.

If f is a contravariant representation we will use the notation

$$f(a)v = va$$

Because the notation

$$f(a)(f(b)v) = (vb)a = v(ba) = f(ba)v$$

is compatible with the group structure we see that the contravariant representation f is equivalent to the right shift. $\square$

Theorem 3.7. *Left and right shifts on group G are commuting.*

Proof. This is the consequence of the associativity on the group G

$$(L(a)R(b))c = a(cb) = (ac)b = (R(b)L(a))c$$

$\square$

Theorem 3.8. *If we defined a single transitive representation f on the manifold A then we can uniquely define a single transitive representation h such that diagram*

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{h(a)} & M \\ \downarrow f(b) & & \downarrow f(b) \\ M & \xrightarrow{h(a)} & M \end{array}$$

*is commutative for any $a, b \in G$.*¹

Proof. We use group coordinates for points $v \in A$. For the simplicity we assume that f is a covariant representation. Then according to theorem 3.6 we can write the left shift $L(a)$ instead of the transformation $f(a)$.

Let points $v_0, v \in A$. Then we can find one and only one $a \in G$ such that

$$v = v_0 a = R(a)v_0$$

We assume

$$h(a) = R(a)$$

For some $b \in G$ we have

$$w_0 = f(b)v_0 = L(b)v_0 \quad w = f(b)v = L(b)v$$

According to theorem 3.7 the diagram

$$(3.1) \quad \begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=R(a)} & v \\ \downarrow f(b)=L(b) & & \downarrow f(b)=L(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)=R(a)} & w \end{array}$$

is commutative.

Changing b we get that w_0 is an arbitrary point of A .

We see from the diagram that if $v_0 = v$ then $w_0 = w$ and therefore $h(e) = \delta$. On other hand if $v_0 \neq v$ then $w_0 \neq w$ because the representation f is single transitive. Therefore the representation h is effective.

In the same way we can show that for given w_0 we can find a such that $w = h(a)w_0$. Therefore the representation is single transitive.

¹The theorem 3.8 is really very interesting. However its meaning becomes more clear when we apply this theorem to basis manifold, see section 5.

In general the representation f is not commutative and therefore the representation h is different from the representation f . In the same way we can create a representation f using the representation h . $\square$

Remark 3.9. It is clear that transformations $L(a)$ and $R(a)$ are different until the group G is nonabelian. However they both are maps onto. Theorem 3.8 states that if both right and left shift presentations exist on the manifold A we can define two commuting representations on the manifold A . The left shift or the right shift only cannot present both types of representation. To understand why it is so let us change diagram (3.1) and assume $h(a)v_0 = L(a)v_0 = v$ instead of $h(a)v_0 = R(a)v_0 = v$ and let us see what expression $h(a)$ has at the point w_0 . The diagram

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=L(a)} & v \\ \downarrow f(b)=L(b) & & \downarrow f(b)=L(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

is equivalent to the diagram

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=L(a)} & v \\ \uparrow f^{-1}(b)=L(b^{-1}) & & \downarrow f(b)=L(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

and we have $w = bv = bav_0 = bab^{-1}w_0$. Therefore

$$h(a)w_0 = (bab^{-1})w_0$$

We see that the representation of h depends on its argument. $\square$

4. LINEAR REPRESENTATION OF GROUP

Suppose we introduce additional structure on set M . Then we create an additional requirement for the representation of group.

Since we introduce continuity on set M , we suppose that transformation

$$u' = f(a)u$$

is continuous in u . Therefore, we get

$$\left| \frac{\partial u'}{\partial u} \right| \neq 0$$

Suppose M is a group. Then representations of left and right shifts have great importance.

Definition 4.1. Let M be vector space $\mathcal{V}$ over field F . We call the representation of group G in vector space $\mathcal{V}$ **linear representation** if $f(a)$ is homomorphism of space $\mathcal{V}$ for any $a \in G$. $\square$

Remark 4.2. Let transformation $f(a)$ be linear homogeneous transformation. $f_\gamma^\beta(a)$ are elements of the matrix of transformation. We usually assume that the lower index enumerates rows in the matrix and the upper index enumerates columns.

According to the matrix product rule we can present coordinates of a vector as a row of a matrix. We call such vector a **row vector**. We can also study a vector

whose coordinates form a column of a matrix. We call such vector a **column vector**.

Left-side linear representation in column vector space

$$u' = f(a)u \quad u'_\alpha = f_\alpha^\beta(a)u_\beta \quad a \in G$$

is covariant representation

$$u''_\gamma = f_\gamma^\beta(ba)u_\beta = f_\gamma^\alpha(b)(f_\alpha^\beta(a)u_\beta) = (f_\gamma^\alpha(b)f_\alpha^\beta(a))u_\beta$$

Left-side linear representation in row vector space

$$u' = f(a)u \quad u'^\alpha = f_\beta^\alpha(a)u^\beta \quad a \in G$$

is contravariant representation

$$u''^\gamma = f_\beta^\gamma(ba)u^\beta = f_\alpha^\gamma(b)(f_\beta^\alpha(a)u^\beta) = (f_\beta^\alpha(a)f_\alpha^\gamma(b))u^\beta$$

Right-side representation in column vector space

$$u' = uf(a) \quad u'_\alpha = u_\beta f_\alpha^\beta(a) \quad a \in G$$

is contravariant representation

$$u''_\gamma = u_\beta f_\gamma^\beta(ab) = (u_\beta f_\alpha^\beta(a))f_\gamma^\alpha(b) = u_\beta(f_\gamma^\alpha(b)f_\alpha^\beta(a))$$

Right-side representation in row vector space

$$u' = uf(a) \quad u'^\alpha = u^\beta f_\beta^\alpha(a) \quad a \in G$$

is covariant representation

$$u''^\gamma = u^\beta f_\beta^\gamma(ab) = (u^\beta f_\alpha^\beta(a))f_\gamma^\alpha(b) = u^\beta(f_\beta^\alpha(a)f_\alpha^\gamma(b))$$

□

Remark 4.3. Studying linear representations we clearly use tensor notation. We can use only upper index and notation $u^\bullet_\alpha$ instead of u_α . Then we can write the transformation of this object in the form

$$u'^\bullet_\alpha = f^\bullet_\alpha{}^\beta u^\bullet_\beta$$

This way we can hide the difference between covariant and contravariant representations. This similarity goes as far as we need. □

5. BASIS IN VECTOR SPACE

Assume we have vector space $\mathcal{V}$ and contravariant right-side effective linear representation of group $G = G(\mathcal{V})$. We usually call group $G(\mathcal{V})$ **symmetry group**. Without loss of generality we identify element g of group G with corresponding transformation of representation and write its action on vector $v \in \mathcal{V}$ as vg .

This point of view allows introduction of two types of coordinates for element g of group G . We can either use coordinates defined on the group, or introduce coordinates as elements of the matrix of the corresponding transformation. The former type of coordinates is more effective when we study properties of group G . The latter type of coordinates contains redundant data; however, it may be more convenient when we study representation of group G . The latter type of coordinates is called **coordinates of representation**.

A maximal set of linearly independent vectors $\bar{e} = \langle e_{(i)} \rangle$ is called a **basis**. In case when we want to show clearly that this is the basis in vector $\mathcal{V}$ we use notation $\bar{e}_\mathcal{V}$.

Any homomorphism of the vector space maps one basis into another. Thus we can extend a covariant representation of the symmetry group to the set of bases. We write the action of element g of group G on basis $\bar{e}$ as $R(g)\bar{e}$. However not every two bases can be mapped by a transformation from the symmetry group because not every nonsingular linear transformation belongs to the representation of group G . Therefore, we can present the set of bases as a union of orbits of group G .

Properties of basis depend on the symmetry group. We can select basis $\bar{e}$ vectors of which are in a relationship which is invariant relative to symmetry group. In this case all bases from orbit $\mathcal{O}(\bar{e}, g \in G, R(g)\bar{e})$ have vectors which satisfy the same relationship. Such a basis we call **G -basis**. In each particular case we need to prove the existence of a basis with certain properties. If such a basis does not exist we can choose an arbitrary basis.

Definition 5.1. We call orbit $\mathcal{O}(\bar{e}, g \in G, R(g)\bar{e})$ of the selected basis $\bar{e}$ the **basis manifold $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ of vector space $\mathcal{V}$** . $\square$

Theorem 5.2. *Representation of group G on basis manifold is single transitive representation.*

Proof. According to definition 5.1 at least one transformation of representation is defined for any two bases. To prove this theorem it is sufficient to show that this transformation is unique.

Consider elements g_1, g_2 of group G and a basis $\bar{e}$ such that

$$(5.1) \quad R_{g_1}\bar{e} = R_{g_2}\bar{e}$$

From (5.1) it follows that

$$(5.2) \quad R_{g_2^{-1}}R_{g_1}\bar{e} = R_{g_1g_2^{-1}}\bar{e} = \bar{e}$$

Because any vector has a unique expansion relative to basis $\bar{e}$ it follows from (5.2) that $R_{g_1g_2^{-1}}$ is an identical transformation of vector space $\mathcal{V}$. $g_1 = g_2$ because representation of group G is effective on vector space $\mathcal{V}$. Statement of the theorem follows from this. $\square$

Theorem 5.2 means that the basis manifold $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ is a homogenous space of group G . We constructed contravariant right-side single transitive linear representation of group G on the basis manifold. Such representation is called **active representation**. A corresponding transformation on the basis manifold is called **active transformation** ([2]) because the homomorphism of the vector space induced this transformation.

According to theorem 3.6 because basis manifold $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ is a homogenous space of group G we can introduce on $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ two types of coordinates defined on group G . In both cases coordinates of basis $\bar{e}$ are coordinates of the homomorphism mapping a fixed basis $\bar{e}_0$ to the basis $\bar{e}$. Coordinates of representation are called **standard coordinates of basis**. We can show that standard coordinates e_k^i of basis $\bar{e}$ for certain value of k are coordinates of vectors $\bar{e}_k \in \bar{e}$ relative to a fixed basis $\bar{e}_0$.

Basis $\bar{e}$ creates coordinates in $\mathcal{V}$. In different types of space it may be done in different ways. In affine space $\xrightarrow{\bar{e}}$ if node of basis is point A than point B has the same coordinates as vector $\overrightarrow{AB}$ relative basis $\bar{e}$. In a general case we introduce coordinates of a vector as coordinates relative to the selected basis. Using only bases of type G means using of specific coordinates on $\mathcal{A}_n$. To distinguish them we call this **G -coordinates**. We also call the space $\mathcal{V}$ with such coordinates **G -space**.

According to theorem 3.8 another representation, commuting with passive, exists on the basis manifold. As we see from remark 3.9 transformation of this representation is different from a passive transformation and cannot be reduced to transformation of space $\mathcal{V}$. To emphasize the difference this transformation is called a **passive transformation** of vector space $\mathcal{V}$ and the representation is called **passive representation**. We write the passive transformation of basis $\bar{e}$, defined by element $g \in G$, as $L(g)\bar{e}$.

5.1. Basis in Affine Space. We identify vectors of the affine space $\mathcal{A}_n$ with pair of points $\overrightarrow{AB}$. All vectors that have a common beginning A create a vector space that we call a tangent vector space $T_A\mathcal{A}_n$.

A topology that $\mathcal{A}_n$ inherits from the map $\mathcal{A}_n \rightarrow R^n$ allows us to study smooth transformations of $\mathcal{A}_n$ and their derivatives. More particularly, the derivative of transformation f maps the vector space $T_A\mathcal{A}_n$ into $T_{f(A)}\mathcal{A}_n$. If f is linear then its derivative is the same at every point. Introducing coordinates $A^1, \dots, A^n$ of a point $A \in \mathcal{A}_n$ we can write a linear transformation as

$$(5.3) \quad A'^i = P_j^i A^j + R^i \quad \det P \neq 0$$

Derivative of this transformation is defined by matrix $\|P_j^i\|$, and does not depend on point A . Vector $(R^1, \dots, R^n)$ expresses displacement in affine space. Set of transformations (5.3) is the group Lie which we denote as $GL(\mathcal{A}_n)$ and call **affine transformation group**.

Definition 5.3. Affine basis $\bar{e} = \langle O, \bar{e}_i \rangle$ is set of linear independent vectors $\bar{e}_i = \overrightarrow{OA_i} = (e_i^1, \dots, e_i^n)$ with common start point $O = (O^1, \dots, O^n)$. $\square$

Definition 5.4. Basis manifold $\mathcal{B}(\mathcal{A}_n)$ of affine space is set of bases of this space. $\square$

An active transformation is called **affine transformation**. A passive transformation is called **quasi affine transformation**.

If we do not concern about starting point of a vector we see little different type of space which we call central affine space $\mathcal{CA}_n$. In the central affine space we can identify all tangent spaces and denote them $T\mathcal{CA}_n$. If we assume that the start point of vector is origin O of coordinate system in space then we can identify any point $A \in \mathcal{CA}_n$ with the vector $a = \overrightarrow{OA}$. This leads to identification of $\mathcal{CA}_n$ and $T\mathcal{CA}_n$. Now transformation is simply map

$$a'^i = P_j^i a^j \quad \det P \neq 0$$

and such transformations build up Lie group GL_n .

Definition 5.5. Central affine basis $\bar{e} = \langle \bar{e}_i \rangle$ is set of linearly independent vectors $\bar{e}_i = (e_i^1, \dots, e_i^n)$. $\square$

Definition 5.6. Basis manifold $\mathcal{B}(\mathcal{CA}_n)$ of central affine space is set of bases of this space. $\square$

5.2. Basis in Euclid Space. When we introduce a metric in a central affine space we get a new geometry because we can measure a distance and a length of vector. If a metric is positive defined we call the space Euclid $\mathcal{E}_n$ otherwise we call the space pseudo Euclid $\mathcal{E}_{nm}$.

Transformations that preserve length form Lie group $SO(n)$ for Euclid space and Lie group $SO(n, m)$ for pseudo Euclid space where n and m number of positive and negative terms in metrics.

Definition 5.7. Orthonormal basis $\bar{e} = \langle \bar{e}_i \rangle$ is set of linearly independent vectors $\bar{e}_i = (e_i^1, \dots, e_i^n)$ such that length of each vector is 1 and different vectors are orthogonal. $\square$

We can prove existence of orthonormal basis using Gram-Schmidt orthogonalization procedure.

Definition 5.8. Basis manifold $\mathcal{B}(\mathcal{E}_n)$ of Euclid space is set of orthonormal bases of this space. $\square$

A active transformation is called **movement**. An passive transformation is called **quasi movement**.

6. GEOMETRICAL OBJECT OF VECTOR SPACE

An active transformation changes bases and vectors uniformly and coordinates of vector relative basis do not change. A passive transformation changes only the basis and it leads to change of coordinates of vector relative to basis.

Let passive transformation $L(a) \in G$ defined by matrix (a_j^i) maps basis $\bar{e} = \langle e_i \rangle \in \mathcal{B}(\mathcal{V})$ into basis $\bar{e}' = \langle e'_i \rangle \in \mathcal{B}(\mathcal{V})$

$$(6.1) \quad e'_j = a_j^i e_i$$

Let vector $v \in \mathcal{V}$ have expansion

$$(6.2) \quad v = v^i e_i$$

relative to basis $\bar{e}$ and have expansion

$$(6.3) \quad v = v'^i e'_i$$

relative to basis $\bar{e}'$. From (6.1) and (6.3) it follows that

$$(6.4) \quad v = v'^j a_j^i e_i$$

Comparing (6.2) and (6.4) we get

$$(6.5) \quad v^i = v'^j a_j^i$$

Because a_j^i is nonsingular matrix we get from (6.5)

$$(6.6) \quad v'^i = v^j a^{-1j}_i$$

Coordinate transformation (6.6) does not depend on vector v or basis $\bar{e}$, but is defined only by coordinates of vector v relative basis $\bar{e}$.

Suppose we select basis $\bar{e}$. Then the set of coordinates (v^i) relative to this basis forms a vector space $\tilde{\mathcal{V}}$ isomorphic to vector space $\mathcal{V}$. This vector space is called **coordinate vector space**. This isomorphism is called **coordinate isomorphism**. Denote by $\bar{\delta}_k = (\delta_k^i)$ the image of vector $e_k \in \bar{e}$ under this .

Theorem 6.1. *Coordinate transformations (6.6) form right-side contravariant effective linear representation of group G which is called **coordinate representation**.*

Proof. Suppose we have two consecutive passive transformations $L(a)$ and $L(b)$. Coordinate transformation (6.6) corresponds to passive transformation $L(a)$. Coordinate transformation

$$(6.7) \quad v''^k = v'^i b^{-1k}_i$$

corresponds to passive transformation L_b . Product of coordinate transformations (6.6) and (6.7) has form

$$(6.8) \quad v''^k = v^j a^{-1j}_i b^{-1k}_i = v^j (ba)^{-1k}_j$$

and is coordinate transformation corresponding to passive transformation L_{ba} . It proves that coordinate transformations form contravariant right-side linear representation of group G .

Suppose coordinate transformation does not change vectors δ_k . Then unit of group G corresponds to it because representation is single transitive. Therefore, coordinate representation is effective. $\square$

Let homomorphism of group G to the group of passive transformations of vector space $\mathcal{W}$ be coordinated with symmetry group of vector space $\mathcal{V}$. This means that passive transformation $L(a)$ of vector space $\mathcal{W}$ corresponds to passive transformation $L(a)$ of vector space $\mathcal{V}$.

$$(6.9) \quad E'_\alpha = A^\beta_\alpha(a) E_\beta$$

Then coordinate transformation in $\mathcal{W}$ gets form

$$(6.10) \quad w'^\alpha = w^\beta A(a^{-1})^\alpha_\beta = w^\beta A(a)^{-1\alpha}_\beta$$

Definition 6.2. Orbit

$$\mathcal{O}((w, \bar{e}_\mathcal{V}), a \in G, (wA(a)^{-1}, L(a)\bar{e}_\mathcal{V}))$$

is called **geometrical object in coordinate representation** defined in vector space $\mathcal{V}$. For any basis $\bar{e}'_\mathcal{V} = L(a)\bar{e}_\mathcal{V}$ corresponding point (6.10) of orbit defines **coordinates of geometrical object** relative basis $\bar{e}'_\mathcal{V}$. $\square$

Definition 6.3. Orbit

$$\mathcal{O}((w, \bar{e}_\mathcal{W}, \bar{e}_\mathcal{V}), a \in G, (wA(a)^{-1}, L(a)\bar{e}_\mathcal{W}, L(a)\bar{e}_\mathcal{V}))$$

is called **geometrical object** defined in vector space $\mathcal{V}$. For any basis $\bar{e}'_\mathcal{V} = L(a)\bar{e}_\mathcal{V}$ corresponding point (6.10) of orbit defines **coordinates of a geometrical object** relative to basis $\bar{e}'_\mathcal{V}$ and the corresponding vector

$$w = w'^\alpha E'_\alpha$$

is called **representative of geometrical object** in basis $\bar{e}'_\mathcal{V}$. $\square$

We also say that w is a **geometrical object of type A**

Since a geometrical object is an orbit of representation, we see that according to theorem 2.14 the definition of the geometrical object is a proper definition.

Definition 6.2 introduces a geometrical object in coordinate space. We assume in definition 6.3 that we selected a basis in vector space $\mathcal{W}$. This allows using a representative of the geometrical object instead of its coordinates.

Theorem 6.4 (invariance principle). *Representative of geometrical object does not depend on selection of basis $\bar{e}'_\mathcal{V}$.*

Proof. To define representative of geometrical object, we need to select basis $\bar{e}_{\mathcal{V}}$, basis $\bar{e}_{\mathcal{V}} = (E_{\alpha})$ and coordinates of geometrical object w^{α} . Corresponding representative of geometrical object has form

$$w = w^{\alpha} E_{\alpha}$$

Suppose we map basis $\bar{e}_{\mathcal{V}}$ to basis $\bar{e}'_{\mathcal{V}}$ by passive transformation $L(a)$. According building this forms passive transformation (6.9) and coordinate transformation (6.10). Corresponding representative of geometrical object has form

$$w' = w'^{\alpha} E'_{\alpha} = w^{\beta} A(a)^{-1}_{\beta}{}^{\alpha} A^{\gamma}_{\alpha}(a) E_{\gamma} = w'^{\beta} E'_{\beta} = w$$

Therefore representative of geometrical object is invariant relative selection of basis. $\square$

Definition 6.5. Let

$$\begin{aligned} w_1 &= w_1^{\alpha} E_{\alpha} \\ w_2 &= w_2^{\alpha} E_{\alpha} \end{aligned}$$

be geometrical objects of the same type defined in vector space $\mathcal{V}$. Geometrical object

$$w = (w_1^{\alpha} + w_2^{\alpha}) E_{\alpha}$$

is called **sum**

$$w = w_1 + w_2$$

of geometrical objects w_1 and w_2 . $\square$

Definition 6.6. Let

$$w_1 = w_1^{\alpha} E_{\alpha}$$

be geometrical object defined in vector space $\mathcal{V}$ over field F . Geometrical object

$$w_2 = (kw_1^{\alpha}) E_{\alpha}$$

is called **product**

$$w_2 = kw_1$$

of geometrical object w_1 **and constant** $k \in F$. $\square$

Theorem 6.7. *Geometrical objects of type A defined in vector space $\mathcal{V}$ over field F form vector space over field F .*

Proof. The statement of the theorem follows from immediate verification of the properties of vector space. $\square$

7. REFERENCES

- [1] P. K. Rashevsky, Riemann Geometry and Tensor Calculus, Moscow, Nauka, 1967
- [2] Granino A. Korn, Theresa M. Korn, Mathematical Handbook for Scientists and Engineer, McGraw-Hill Book Company, New York, San Francisco, Toronto, London, Sydney, 1968

8. INDEX

- active representation9
- active transformation on basis manifold9
- affine basis10
- affine transformation group10
- affine transformation on basis manifold10

- basis manifold of affine space10
- basis manifold of central affine space10
- basis manifold of Euclid space11
- basis manifold of vector space9
- basis of vector space8

- central affine basis10
- column vector8
- coordinate isomorphism11
- coordinate representation of group in
vector space11
- coordinate vector space11
- coordinates of geometrical object12
- coordinates of geometrical object in
coordinate representation12
- coordinates of representation8

- direct product of representations of group4

- effective representation of group5

- G -basis of vector space9
- G -coordinates of basis9
- geometrical object in coordinate
representation12
- geometrical object in vector space12
- geometrical object of type A in vector
space12
- G -space9

- homogeneous space of group5

- invariance principle in vector space12

- kernel of inefficiency of representation of
group5

- left shift on group3
- left-side contravariant representation of
group3
- left-side covariant representation of group2
- left-side representation of group2
- left-side transformation1
- linear representation of group7

- nonsingular transformation1

- orbit of representation of group4
- orthonormal basis11

- passive representation10
- passive transformation on basis manifold10

- product of geometrical object and constant
in vector space13

- quasi affine transformation on basis
manifold10
- quasi movement on basis manifold11

- representation of group2
- representative of geometrical object in
vector space12
- right shift on group3
- right-side contravariant representation of
group3
- right-side covariant representation of
group2
- right-side representation of group2
- right-side transformation1
- row vector7

- single transitive representation of group5
- standard coordinates of basis9
- sum of geometrical objects in vector
space13
- symmetry group8

- transitive representation of group5

9. SPECIAL SYMBOLS AND NOTATIONS

- $\mathcal{A}_n$ affine space **10**
- $\mathcal{B}(\mathcal{A}_n)$ basis manifold of affine space **10**
- $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ basis manifold of vector space $\mathcal{V}$ **9**
- $\mathcal{B}(\mathcal{CA}_n)$ basis manifold of central affine space **10**
- $\mathcal{B}(\mathcal{E}_n)$ basis manifold of Euclid space **11**
- $\mathcal{CA}_n$ central affine space **10**
- $\bar{\bar{e}} = \langle O, \bar{e}_i \rangle$ affine basis **10**
- $\bar{\bar{e}}$ basis of vector space **8**
- $\bar{\bar{e}}_{\mathcal{V}}$ basis in vector space $\mathcal{V}$ **8**
- $\bar{\bar{e}} = \langle \bar{e}_i \rangle$ central affine basis **10**
- $\mathcal{E}_n$ Euclid space **10**
- $\mathcal{E}_{nm}$ pseudo Euclid space **10**
- $\bar{\bar{e}} = \langle \bar{e}_i \rangle$ orthonormal basis **11**
- e_k^i standard coordinates of basis **9**
- $\bar{e}_k$ vector of basis **9**
- $GL(\mathcal{A}_n)$ affine transformation group **10**
- $G(\mathcal{V})$ group of homomorphisms of vector space $\mathcal{V}$ **8**
- $L(a)b$ left shift **3**
- $L(g)\bar{\bar{e}}$ passive transformation **10**
- $l(M)$ set of left-side nonsingular transformations of set M **1**
- $\mathcal{O}((w, \bar{\bar{e}}_{\mathcal{V}}), a \in G, (wA(a)^{-1}, L(a)\bar{\bar{e}}_{\mathcal{V}}))$
geometrical object in coordinate representation **12**
- $\mathcal{O}((w, \bar{\bar{e}}_{\mathcal{W}}, \bar{\bar{e}}_{\mathcal{V}}), a \in G, (wA(a)^{-1}, L(a)\bar{\bar{e}}_{\mathcal{W}}, L(a)\bar{\bar{e}}_{\mathcal{V}}))$
geometrical object **12**
- $\mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v) = \{w = f(g)v : g \in G\}$
orbit of representation of the group G **4**
- $R(g)\bar{\bar{e}}$ active transformation **9**
- $R(a)b$ right shift **3**
- $r(M)$ set of right-side nonsingular transformations of set M **1**
- $\tilde{\mathcal{V}}$ coordinate vector space **11**
- (v^i) coordinates in vector space **11**
- $\mathcal{V}$ vector space **8**
- δ identical transformation **1**
- $\bar{\delta}_k = (\delta_k^i)$ image of vector $\bar{e}_k \in \bar{\bar{e}}$ under isomorphism to coordinate vector space **11**

Многообразие базисов

Александр Клейн

Аннотация. В этой статье мы изучаем группу симметрий векторного пространства. Многообразие базисов является однородным пространством группы симметрий. Это приводит к определению активного и пассивного преобразований на многообразии базисов. Активное преобразование связано с преобразованием векторного пространства. Пассивное преобразование даёт возможность определить понятия инвариантности и геометрического объекта.

1. ВВЕДЕНИЕ

Эта статья была написана под большим влиянием книги [1]. Изучение однородного пространства группы симметрий векторного пространства ведёт нас к определению базиса этого пространства и многообразия базисов. Мы вводим два типа преобразований многообразия базисов: активные и пассивные преобразования. Различие между ними состоит в том, что активное преобразование может быть выражено как преобразование исходного пространства. Как показано в [1], пассивное преобразование даёт возможность определить понятия инвариантности и геометрического объекта.

Мы имеем две противоположные точки зрения на геометрический объект. С одной стороны мы фиксируем координаты геометрического объекта относительно заданного базиса и указываем закон преобразования координат при замене базиса. В то же время мы рассматриваем всю совокупность координат геометрического объекта относительно различных базисов как единое целое. Это даёт нам возможность бескоординатного изучения геометрического объекта.

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Определение 2.1. Мы будем называть отображение

$$t : M \rightarrow M$$

невырожденным преобразованием, если существует обратное отображение. $\square$

Определение 2.2. Преобразование называется левосторонним преобразованием если оно действует слева

$$u' = tu$$

Мы будем обозначать $l(M)$ множество левосторонних невырожденных преобразований множества M . $\square$

Key words and phrases. векторное пространство, дифференциальная геометрия, базис, геометрический объект.

Aleks_Kleyn@MailAPS.org.

Определение 2.3. Преобразование называется **правосторонним преобразованием** если оно действует справа

$$u' = ut$$

Мы будем обозначать $r(M)$ множество правосторонних невырожденных преобразований множества M . $\square$

Мы будем обозначать δ тождественное преобразование.

Определение 2.4. Пусть G - группа. Мы будем называть отображение

$$(2.1) \quad f : G \rightarrow l(M)$$

левосторонним представлением группы G в множестве M , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(2.2) \quad f(ab)u = f(a)(f(b)u)$$

$$(2.3) \quad f(e) = \delta$$

$\square$

Определение 2.5. Пусть G - группа. Мы будем называть отображение

$$(2.4) \quad f : G \rightarrow r(M)$$

правосторонним представлением группы G в множестве M , если отображение f удовлетворяет условиям

$$(2.5) \quad uf(ab) = (uf(a))f(b)$$

$$(2.6) \quad f(e) = \delta$$

$\square$

Любое утверждение, справедливое для левостороннего представления группы, будет справедливо для правостороннего представления. Поэтому мы будем пользоваться общим термином **представление группы** и будем пользоваться обозначениями для левостороннего представления в тех случаях, когда это не вызывает недоразумения.

Теорема 2.6. Для любого $g \in G$

$$(2.7) \quad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$$

Доказательство. На основании (2.2) и (2.3), мы можем записать

$$u = \delta u = f(gg^{-1})u = f(g)(f(g^{-1})u)$$

Это завершает доказательство. $\square$

Теорема 2.7. Пусть $l(M)$ - группа относительно умножения

$$(2.8) \quad (t_1 t_2)u = t_1(t_2 u)$$

u - единица группы $l(M)$. Если отображение (2.1) является гомоморфизмом групп

$$(2.9) \quad f(ab) = f(a)f(b)$$

то это отображение является представлением группы G , которое мы будем называть **левосторонним ковариантным представлением**.

Доказательство. Так как f - гомоморфизм групп, то $f(e) = \delta$.

Согласно (2.8) и (2.9)

$$f(ab)u = (f(a)f(b))u = f(a)(f(b)u)$$

Согласно определению 2.4 f является представлением. □

Теорема 2.8. Пусть $r(M)$ - группа относительно умножения

$$(2.10) \quad u(t_1 t_2) = (ut_1)t_2$$

и δ - единица группы $r(M)$. Если отображение (2.4) является гомоморфизмом групп

$$(2.11) \quad f(ab) = f(a)f(b)$$

то это отображение является представлением группы G , которое мы будем называть **правосторонним ковариантным представлением**.

Доказательство. Так как f - гомоморфизм групп, то $f(e) = \delta$.

Согласно (2.10) и (2.11)

$$uf(ab) = u(f(a)f(b)) = (uf(a))f(b)$$

Согласно определению 2.5 f является представлением. □

Теорема 2.9. Пусть $l(M)$ - группа относительно умножения

$$(2.12) \quad (t_2 t_1)u = t_1(t_2 u)$$

и δ - единица группы $l(M)$. Если отображение (2.1) является антигомоморфизмом групп

$$(2.13) \quad f(ba)u = f(a)f(b)$$

то это отображение является представлением группы G , которое мы будем называть **левосторонним контравариантным представлением**.

Доказательство. Так как f - антигомоморфизм групп, то $f(e) = \delta$.

Согласно (2.12) и (2.13)

$$f(ab)u = (f(b)f(a))u = f(a)(f(b)u)$$

Согласно определению 2.4 f является представлением. □

Теорема 2.10. Пусть $r(M)$ - группа относительно умножения

$$(2.14) \quad u(t_2 t_1) = (ut_1)t_2$$

и δ - единица группы $r(M)$. Если отображение (2.4) является антигомоморфизмом групп

$$(2.15) \quad f(ba)u = f(a)f(b)$$

то это отображение является представлением группы G , которое мы будем называть **правосторонним контравариантным представлением**.

Доказательство. Так как f - антигомоморфизм групп, то $f(e) = \delta$.

Согласно (2.14) и (2.15)

$$uf(ab) = u(f(b)f(a)) = (uf(a))f(b)$$

Согласно определению 2.5 f является представлением. □

Пример 2.11. Групповая операция определяет два различных представления на группе: **левый сдвиг**, который мы определяем равенством

$$(2.16) \quad b' = L(a)b = ab$$

и **правый сдвиг**, который мы определяем равенством

$$(2.17) \quad b' = R(a)b = ba$$

□

Теорема 2.12. Пусть представление

$$u' = f(a)u$$

является ковариантным представлением. Тогда представление

$$u' = h(a)u = f(a^{-1})u$$

является контравариантным представлением.

Доказательство. Утверждение следует из цепочки равенств

$$h(ab) = f((ab)^{-1}) = f(b^{-1}a^{-1}) = f(b^{-1})f(a^{-1}) = h(b)h(a)$$

□

Определение 2.13. Пусть f - представление группы G в множестве M . Для любого $v \in M$ мы определим **орбиту представления группы G** как множество

$$\mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v) = \{w = f(g)v : g \in G\}$$

□

Так как $f(e) = \delta$, то $v \in \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$.

Теорема 2.14. Если

$$(2.18) \quad v \in \mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u)$$

то

$$\mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u) = \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$$

Доказательство. Из (2.18) следует существование $a \in G$ такого, что

$$(2.19) \quad v = f(a)u$$

Если $w \in \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$, то существует $b \in G$ такой, что

$$(2.20) \quad w = f(b)v$$

Подставив (2.19) в (2.20), мы получим

$$(2.21) \quad w = f(b)(f(a)u)$$

На основании (2.2) из (2.21) следует, что $w \in \mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u)$. Таким образом,

$$\mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v) \subseteq \mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u)$$

На основании (2.7) из (2.19) следует, что

$$(2.22) \quad u = f(a)^{-1}v = f(a^{-1})v$$

Равенство (2.22) означает, что $u \in \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$ и, следовательно,

$$\mathcal{O}(u, g \in G, f(g)u) \subseteq \mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v)$$

Это завершает доказательство.

□

Теорема 2.15. Если определены представление f_1 группы G в множестве M_1 и представление f_2 группы G в множестве M_2 , то мы можем определить прямое произведение представлений f_1 и f_2 группы

$$f = f_1 \otimes f_2 : G \rightarrow M_1 \otimes M_2$$
$$f(g) = (f_1(g), f_2(g))$$

Доказательство. Чтобы показать, что f является представлением, достаточно показать, что f удовлетворяет определению 2.4.

$$f(e) = (f_1(e), f_2(e)) = (\delta_1, \delta_2) = \delta$$

$$\begin{aligned} f(ab)u &= (f_1(ab)u_1, f_2(ab)u_2) \\ &= (f_1(a)(f_1(b)u_1), f_2(a)(f_2(b)u_2)) \\ &= f(a)(f_1(b)u_1, f_2(b)u_2) \\ &= f(a)(f(b)u) \end{aligned}$$

□

3. ОДНОТРАНЗИТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Определение 3.1. Мы будем называть **ядром неэффективности представления группы G** множество

$$K_f = \{g \in G : f(g) = \delta\}$$

Если $K_f = \{e\}$, мы будем называть представление группы G **эффективным**.

□

Теорема 3.2. Ядро неэффективности - это подгруппа группы G .

Доказательство. Допустим $f(a_1) = \delta$ и $f(a_2) = \delta$. Тогда

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2)u &= f(a_1)(f(a_2)u) = u \\ f(a^{-1}) &= f^{-1}(a) = \delta \end{aligned}$$

□

Если действие не эффективно, мы можем перейти к эффективному, заменив группой $G_1 = G/K_f$, пользуясь факторизацией по ядру неэффективности. Это означает, что мы можем изучать только эффективное действие.

Определение 3.3. Мы будем называть представление группы **транзитивным**, если для любых $a, b \in V$ существует такое g , что

$$a = f(g)b$$

Мы будем называть представление группы **однотранзитивным**, если оно транзитивно и эффективно.

□

Теорема 3.4. Представление однотранзитивно тогда и только тогда, когда для любых $a, b \in V$ существует одно и только одно $g \in G$ такое, что $a = f(g)b$

Определение 3.5. Мы будем называть пространство V **однородным пространством группы G** , если мы имеем однотранзитивное представление группы G на V .

□

Теорема 3.6. Если мы определим однотранзитивное представление f группы G на многообразии A , то мы можем однозначно определить координаты на A , пользуясь координатами на группе G .

Если f - ковариантное представление, то $f(a)$ эквивалентно левому сдвигу $L(a)$ на группе G . Если f - контравариантное представление, то $f(a)$ эквивалентно правому сдвигу $R(a)$ на группе G .

Доказательство. Мы выберем точку $v \in A$ и определим координаты точки $w \in A$ как координаты преобразования a такого, что $w = f(a)v$. Координаты, определённые таким образом, однозначны с точностью до выбора начальной точки $v \in A$, так как действие эффективно.

Если f - ковариантное представление, мы будем пользоваться записью

$$f(a)v = av$$

Так как запись

$$f(a)(f(b)v) = a(bv) = (ab)v = f(ab)v$$

совместима с групповой структурой, мы видим, что ковариантное представление f эквивалентно левому сдвигу.

Если f - контравариантное представление, мы будем пользоваться записью

$$f(a)v = va$$

Так как запись

$$f(a)(f(b)v) = (vb)a = v(ba) = f(ba)v$$

совместима с групповой структурой, мы видим, что контравариантное представление f эквивалентно правому сдвигу. $\square$

Теорема 3.7. Левый и правый сдвиги на группе G перестановочны.

Доказательство. Это следствие ассоциативности группы G

$$(L(a)R(b))c = a(cb) = (ac)b = (R(b)L(a))c$$

$\square$

Теорема 3.8. Если мы определили однотранзитивное представление f на многообразии A , то мы можем однозначно определить однотранзитивное представление h такое, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{h(a)} & M \\ \downarrow f(b) & & \downarrow f(b) \\ M & \xrightarrow{h(a)} & M \end{array}$$

коммутативна для любых $a, b \in G$.¹

Доказательство. Мы будем пользоваться групповыми координатами для точек $v \in A$. Для простоты мы предположим, что f - ковариантное представление. Тогда согласно теореме 3.6 мы можем записать левый сдвиг $L(a)$ вместо преобразования $f(a)$.

¹Теорема 3.8 на самом деле очень интересна. Тем не менее её смысл становится более ясным, когда мы приложим эту теорему к многообразию базисов, смотри секцию 5.

Пусть точки $v_0, v \in A$. Тогда мы можем найти одно и только одно $a \in G$ такое, что

$$v = v_0 a = R(a)v_0$$

Мы предположим

$$h(a) = R(a)$$

Существует $b \in G$ такое, что

$$w_0 = f(b)v_0 = L(b)v_0 \quad w = f(b)v = L(b)v$$

Согласно теореме 3.7 диаграмма

$$(3.1) \quad \begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=R(a)} & v \\ \downarrow f(b)=L(b) & & \downarrow f(b)=L(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)=R(a)} & w \end{array}$$

коммутативна.

Изменяя b мы получим, что w_0 - это произвольная точка, принадлежащая A .

Мы видим из диаграммы, что, если $v_0 = v$ then $w_0 = w$ и следовательно $h(e) = \delta$. С другой стороны, если $v_0 \neq v$, то $w_0 \neq w$ потому, что представление f одностранзитивно. Следовательно представление h эффективно.

Таким же образом мы можем показать, что для данного w_0 мы можем найти a такое, что $w = h(a)w_0$. Следовательно представление одностранзитивно.

В общем случае, представление f не коммутативно и следовательно представление h отлично от представления f . Таким же образом мы можем создать представление f , пользуясь представлением h . $\square$

Замечание 3.9. Очевидно, что преобразования $L(a)$ и $R(a)$ отличаются, если группа G неабелева. Тем не менее, они являются отображениями на. Теорема 3.8 утверждает, что, если оба представления правого и левого сдвига существуют на многообразии A , то мы можем определить два перестановочных представления на многообразии A . Только левый или правый сдвиг не может представлять оба типа представления. Чтобы понять почему это так, мы можем изменить диаграмму (3.1) и предположить $h(a)v_0 = L(a)v_0 = v$ вместо $h(a)v_0 = R(a)v_0 = v$ и проанализировать, какое выражение $h(a)$ имеет в точке w_0 . Диаграмма

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=L(a)} & v \\ \downarrow f(b)=L(b) & & \downarrow f(b)=L(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

эквивалентна диаграмме

$$\begin{array}{ccc} v_0 & \xrightarrow{h(a)=L(a)} & v \\ \uparrow f^{-1}(b)=L(b^{-1}) & & \downarrow f(b)=L(b) \\ w_0 & \xrightarrow{h(a)} & w \end{array}$$

и мы имеем $w = bv = bav_0 = bab^{-1}w_0$. Следовательно

$$h(a)w_0 = (bab^{-1})w_0$$

Мы видим, что представление h зависит от его аргумента. $\square$

4. ЛИНЕЙНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Если на множестве M определена дополнительная структура, мы предъявляем к представлению группы дополнительные требования.

Если на множестве M определено понятие непрерывности, то мы полагаем, что преобразование

$$u' = f(a)u$$

непрерывно по u и, следовательно,

$$\left| \frac{\partial u'}{\partial u} \right| \neq 0$$

Если M - группа, то большое значение имеют представления левых и правых сдвигов.

Определение 4.1. Пусть M - векторное пространство $\mathcal{V}$ над полем F . Мы будем называть представление группы G в векторном пространстве $\mathcal{V}$ **линейным представлением**, если $f(a)$ - гомоморфизм пространства $\mathcal{V}$ для любого $a \in G$. $\square$

Замечание 4.2. Допустим, преобразование $f(a)$ является линейным однородным преобразованием. $f_\gamma^\beta(a)$ являются элементами матрицы преобразования. Мы обычно полагаем, что нижний индекс перечисляет строки в матрице и верхний индекс перечисляет столбцы.

Согласно закону умножения матриц мы можем представить координаты вектора как строку матрицы. Мы будем называть такой вектор **вектор-строкой**. Мы можем так же рассматривать вектор, координаты которого формируют столбец матрицы и будем называть такой вектор **вектор-столбцом**.

Левостороннее линейное представление в пространстве вектор-столбцов

$$u' = f(a)u \quad u'_\alpha = f_\alpha^\beta(a)u_\beta \quad a \in G$$

является ковариантным представлением

$$u''_\gamma = f_\gamma^\beta(ba)u_\beta = f_\gamma^\alpha(b)(f_\alpha^\beta(a)u_\beta) = (f_\gamma^\alpha(b)f_\alpha^\beta(a))u_\beta$$

Левостороннее линейное представление в пространстве вектор-строк

$$u' = f(a)u \quad u'^\alpha = f_\beta^\alpha(a)u^\beta \quad a \in G$$

является контравариантным представлением

$$u''^\gamma = f_\beta^\gamma(ba)u^\beta = f_\beta^\gamma(b)(f_\beta^\alpha(a)u^\beta) = (f_\beta^\gamma(a)f_\alpha^\beta(b))u^\beta$$

Правостороннее линейное представление в пространстве вектор-столбцов

$$u' = uf(a) \quad u'_\alpha = u_\beta f_\alpha^\beta(a) \quad a \in G$$

является контравариантным представлением

$$u''_\gamma = u_\beta f_\gamma^\beta(ab) = (u_\beta f_\alpha^\beta(a))f_\gamma^\alpha(b) = u_\beta (f_\gamma^\alpha(b)f_\alpha^\beta(a))$$

Правостороннее линейное представление в пространстве вектор-строк

$$u' = uf(a) \quad u'^\alpha = u^\beta f_\beta^\alpha(a) \quad a \in G$$

является ковариантным представлением

$$u''^\gamma = u^\beta f_\beta^\gamma(ab) = (u^\beta f_\beta^\alpha(a))f_\alpha^\gamma(b) = u^\beta(f_\beta^\alpha(a)f_\alpha^\gamma(b))$$

□

Замечание 4.3. При изучении линейного представления мы явно будем пользоваться тензорной записью. Мы можем пользоваться только верхним индексом и записью $u^\bullet_\alpha$ вместо u_α . Тогда мы можем записать преобразование этого объекта в виде

$$u'^\bullet_\alpha = f^\bullet_\alpha{}^\beta u^\bullet_\beta$$

Таким образом мы можем спрятать различие между ковариантным и контравариантным представлениями. Эта сходство идёт сколь угодно далеко. □

5. БАЗИС В ВЕКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Пусть мы имеем векторное пространство $\mathcal{V}$ и контравариантное правостороннее эффективное линейное представление группы $G = G(\mathcal{V})$. Мы обычно будем называть группу $G(\mathcal{V})$ **группой симметрии**. Не нарушая общности, мы будем отождествлять элемент g группы G с соответствующим преобразованием представления и записывать его действие на вектор $v \in \mathcal{V}$ в виде vg .

Эта точка зрения позволяет определить два типа координат для элемента g группы G . Мы можем либо пользоваться координатами, определёнными на группе, либо определить координаты как элементы матрицы соответствующего преобразования. Первая форма координат более эффективна, когда мы изучаем свойства группы G . Вторая форма координат содержит избыточную информацию, но бывает более удобна, когда мы изучаем представление группы G . Мы будем называть вторую форму координат **координатами представления**.

Мы будем называть максимальное множество линейно независимых векторов $\bar{e} = \langle e_{(i)} \rangle$ **базисом**. В том случае, когда мы хотим явно указать, что это базис пространства $\mathcal{V}$, мы будем пользоваться обозначением $\bar{e}_{\mathcal{V}}$.

Любой гомоморфизм векторного пространства отображает один базис в другой. Таким образом, мы можем распространить ковариантное представление группы симметрии на множество базисов. Мы будем записывать действие элемента g группы G на базис $\bar{e}$ в виде $R(g)\bar{e}$. Тем не менее, не всякие два базиса могут быть связаны преобразованием группы симметрии потому, что не всякое невырожденное линейное преобразование принадлежит представлению группы G . Таким образом, множество базисов можно представить как объединение орбит группы G .

Свойства базиса зависят от группы симметрии. Мы можем выбрать базисы $\bar{e}$, векторы которых находятся в отношении, которое инвариантно относительно группы симметрии. В этом случае все базисы из орбиты $\mathcal{O}(\bar{e}, g \in G, R(g)\bar{e})$ имеют векторы, которые удовлетворяют одному и тому же отношению. Такой базис мы будем называть **G -базисом**. В каждом конкретном случае мы должны доказать существование базиса с искомыми свойствами. Если подобного типа базиса не существует, мы можем выбрать произвольный базис.

Определение 5.1. Мы будем называть орбиту $\mathcal{O}(\bar{e}, g \in G, R(g)\bar{e})$ выбранного базиса $\bar{e}$ **многообразием базисов $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ векторного пространства $\mathcal{V}$** . □

Теорема 5.2. *Представление группы G на многообразии базисов одностранзитивно.*

Доказательство. Согласно определению 5.1 любые два базиса связаны по крайней мере одним преобразованием представления. Для доказательства теоремы достаточно показать, что это преобразование определено однозначно.

Допустим элементы g_1, g_2 группы G и базис $\bar{e}$ таковы, что

$$(5.1) \quad R_{g_1} \bar{e} = R_{g_2} \bar{e}$$

Из (5.1) следует

$$(5.2) \quad R_{g_2^{-1}} R_{g_1} \bar{e} = R_{g_1 g_2^{-1}} \bar{e} = \bar{e}$$

Так как любой вектор имеет единственное разложение относительно базиса $\bar{e}$, то из (5.2) следует, что $R_{g_1 g_2^{-1}}$ тождественное преобразование векторного пространства $\mathcal{V}$. Так как представление группы G эффективно на векторном пространстве $\mathcal{V}$, то $g_1 = g_2$. Отсюда следует утверждение теоремы. $\square$

Из теоремы 5.2 следует, что многообразие базисов $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ является однородным пространством группы G . Мы построили контравариантное правостороннее одностранзитивное линейное представление группы G на многообразии базисов. Мы будем называть это представление **активным представлением**, а соответствующее преобразование на многообразии базисов **активным преобразованием** ([2]) потому, что гомоморфизм векторного пространства породил это преобразование.

Согласно теореме 3.6, так как многообразие базисов $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ - однородное пространство группы G , мы можем определить на $\mathcal{B}(\mathcal{V})$ две формы координат, определённые на группе G . В обоих случаях координаты базиса $\bar{e}$ - это координаты гомоморфизма, отображающего заданный базис $\bar{e}_0$ в базис $\bar{e}$. Координаты представления называются **стандартными координатами базиса**. Нетрудно показать, что стандартные координаты e_k^i базиса $\bar{e}$ при заданном значении k являются координатами вектора $\bar{e}_k \in \bar{e}$ относительно заданного базиса $\bar{e}_0$.

Базис $\bar{e}$ порождает координаты на $\mathcal{V}$. В различных типах пространства это может быть сделано различным образом. В аффинном пространстве, если вершина базиса является точкой A , то точка B имеет те же координаты, что и вектор $\overrightarrow{AB}$ относительно базиса $\bar{e}$. В общем случае мы вводим координаты вектора как координаты относительно выбранного базиса. Использование только G -пространства означает использование специальных координат на $\mathcal{A}_n$. Для того, чтобы отличать их, мы будем называть их **G -координатами**. Мы также будем называть пространство $\mathcal{V}$ с такими координатами **G -пространством**.

Согласно теореме 3.8, на многообразии базисов существует другое представление, перестановочное с пассивным. Как мы видим из замечания 3.9 преобразование этого представления отличается от пассивного преобразования и не может быть сведено к преобразованию пространства $\mathcal{V}$. Чтобы подчеркнуть различие, это преобразование называется **пассивным преобразованием** векторного пространства $\mathcal{V}$, а представление называется **пассивным представлением**. Мы будем записывать пассивное преобразование базиса $\bar{e}$, порождённое элементом $g \in G$, в виде $L(g)\bar{e}$.

5.1. Базис в аффинном пространстве. Мы отождествляем векторы аффинного пространства $\mathcal{A}_n$ с парой точек $\overrightarrow{AB}$. Все векторы, которые имеют общее начало A порождают векторное пространство, которое мы будем называть касательным векторным пространством $T_A\mathcal{A}_n$.

Топология, которую $\mathcal{A}_n$ наследует из отображения $\mathcal{A}_n \rightarrow R^n$, позволяет нам изучать непрерывные преобразования пространства $\mathcal{A}_n$ и их производные. Более точно, производная преобразования f отображает векторное пространство $T_A\mathcal{A}_n$ в $T_{f(A)}\mathcal{A}_n$. Если f линейно, то его производная одна и та же в каждой точке. Вводя координаты $A^1, \dots, A^n$ точки $A \in \mathcal{A}_n$, мы можем записать линейное преобразование как

$$(5.3) \quad A'^i = P_j^i A^j + R^i \quad \det P \neq 0$$

Производная этого преобразования определена матрицей $\|P_j^i\|$ и не зависит от точки A . Вектор $(R^1, \dots, R^n)$ выражает смещение в аффинном пространстве. Множество преобразований (5.3) - это группа Ли, которую мы обозначим $GL(\mathcal{A}_n)$ и будем называть **группой аффинных преобразований**.

Определение 5.3. Аффинный базис $\bar{e} = \langle O, \bar{e}_i \rangle$ - это множество линейно независимых векторов $\bar{e}_i = \overrightarrow{OA_i} = (e_i^1, \dots, e_i^n)$ с общей начальной точкой $O = (O^1, \dots, O^n)$. $\square$

Определение 5.4. Многообразие базисов $\mathcal{B}(\mathcal{A}_n)$ **аффинного пространства** - это множество базисов этого пространства. $\square$

Мы будем называть активное преобразование **аффинным преобразованием**. Мы будем называть пассивное преобразование **квазиаффинным преобразованием**.

Если мы не заботимся о начальной точке вектора, мы получим несколько отличный тип пространства, которое мы будем называть **центро-аффинным пространством** $\mathcal{CA}_n$. В центро-аффинном пространстве мы можем идентифицировать все касательные пространства и обозначить их $T\mathcal{CA}_n$. Если мы предположим, что начальная точка вектора - это начало O координатной системы в пространстве, то мы можем отождествить любую точку $A \in \mathcal{CA}_n$ с вектором $a = \overrightarrow{OA}$. Это ведёт к идентификации $\mathcal{CA}_n$ и $T\mathcal{CA}_n$. Теперь преобразование - это просто отображение

$$a'^i = P_j^i a^j \quad \det P \neq 0$$

и такие преобразования порождают группу Ли GL_n .

Определение 5.5. Центро-аффинный базис $\bar{e} = \langle \bar{e}_i \rangle$ - это множество линейно независимых векторов $\bar{e}_i = (e_i^1, \dots, e_i^n)$. $\square$

Определение 5.6. Многообразие базисов $\mathcal{B}(\mathcal{CA}_n)$ **центро-аффинного пространства** - это множество базисов этого пространства. $\square$

5.2. Базис в евклидовом пространстве. Когда мы определяем метрику в центро-аффинном пространстве, мы получаем новую геометрию потому, что мы можем измерять расстояние и длину вектора. Если метрика положительно определена, мы будем называть пространство евклидовым $\mathcal{E}_n$, в противном случае мы будем называть пространство псевдоевклидовым $\mathcal{E}_{nm}$.

Преобразования, которые сохраняют длину, образуют группу Ли $SO(n)$ для евклидова пространства и группу Ли $SO(n, m)$ для псевдоевклидова пространства, где n и m числа положительных и отрицательных слагаемых в метрике.

Определение 5.7. Ортонормальный базис $\bar{e} = \langle \bar{e}_i \rangle$ - это множество линейно независимых векторов $\bar{e}_i = (e_i^1, \dots, e_i^n)$ таких, что длина каждого вектора равна 1 и различные векторы ортогональны. $\square$

Существование ортогонального базиса доказывается с помощью процесса ортогонализации Грама–Шмидта.

Определение 5.8. Многообразие базисов $\mathcal{B}(\mathcal{E}_n)$ евклидова пространства - это множество ортонормальных базисов этого пространства. $\square$

Мы будем называть активное преобразование **движением**. Мы будем называть пассивное преобразование **квазидвижением**.

6. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Активное преобразование изменяет базисы и векторы согласовано и координаты вектора относительно базиса не меняются. Пассивное преобразование меняет только базис, и это ведёт к изменению координат вектора относительно базиса.

Допустим пассивное преобразование $L(a) \in G$, заданное матрицей (a_j^i) , отображает базис $\bar{e} = \langle e_i \rangle \in \mathcal{B}(\mathcal{V})$ в базис $\bar{e}' = \langle e'_i \rangle \in \mathcal{B}(\mathcal{V})$

$$(6.1) \quad e'_j = a_j^i e_i$$

Допустим вектор $v \in \mathcal{V}$ имеет разложение

$$(6.2) \quad v = v^i e_i$$

относительно базиса $\bar{e}$ и имеет разложение

$$(6.3) \quad v = v'^i e'_i$$

относительно базиса $\bar{e}'$. Из (6.1) и (6.3) следует, что

$$(6.4) \quad v = v'^j a_j^i e_i$$

Сравнивая (6.2) и (6.4) получаем, что

$$(6.5) \quad v^i = v'^j a_j^i$$

Так как a_j^i - невырожденная матрица, то из (6.5) следует

$$(6.6) \quad v'^i = v^j a^{-1j}_i$$

Преобразование координат (6.6) не зависит от вектора v или базиса $\bar{e}$, а определено исключительно координатами вектора v относительно базиса $\bar{e}$.

Если мы фиксируем базис $\bar{e}$, то множество координат (v^i) относительно этого базиса порождает векторное пространство $\tilde{\mathcal{V}}$, изоморфное векторному пространству $\mathcal{V}$. Это векторное пространство называется **координатным векторным пространством**, а изоморфизм **координатным изоморфизмом**. Мы будем обозначать $\bar{\delta}_k = (\delta_k^i)$ образ вектора $e_k \in \bar{e}$ при этом изоморфизме.

Теорема 6.1. Преобразования координат (6.6) порождают контравариантное правостороннее эффективное линейное представление группы G , называемое **координатным представлением**.

Доказательство. Допустим мы имеем два последовательных пассивных преобразования $L(a)$ и $L(b)$. Преобразование координат (6.6) соответствует пассивному преобразованию $L(a)$. Преобразование координат

$$(6.7) \quad v''^k = v'^i b^{-1k}_i$$

соответствует пассивному преобразованию $L(b)$. Произведение преобразований координат (6.6) и (6.7) имеет вид

$$(6.8) \quad v''^k = v^j a^{-1j}_i b^{-1k}_i = v^j (ba)^{-1k}_j$$

и является координатным преобразованием, соответствующим пассивному преобразованию L_{ba} . Это доказывает, что преобразования координат порождают контравариантное правостороннее линейное представление группы G .

Если координатное преобразование не изменяет векторы δ_k , то ему соответствует единица группы G , так как пассивное представление однотранзитивно. Следовательно, координатное представление эффективно. $\square$

Предположим, что гомоморфизм группы G в группу пассивных преобразований векторного пространства $\mathcal{W}$ согласован с группой симметрий векторного пространства $\mathcal{V}$. Это означает, что пассивному преобразованию $L(a)$ векторного пространства $\mathcal{V}$ соответствует пассивное преобразование $L(a)$ векторного пространства $\mathcal{W}$.

$$(6.9) \quad E'_\alpha = A^\beta_\alpha(a) E_\beta$$

Тогда координатное преобразование в $\mathcal{W}$ принимает вид

$$(6.10) \quad w'^\alpha = w^\beta A(a^{-1})^\alpha_\beta = w^\beta A(a)^{-1\alpha}_\beta$$

Определение 6.2. Мы будем называть орбиту

$$\mathcal{O}((w, \bar{e}_\mathcal{V}), a \in G, (wA(a)^{-1}, L(a)\bar{e}_\mathcal{V}))$$

геометрическим объектом в координатном представлении, определённым в векторном пространстве $\mathcal{V}$. Для любого базиса $\bar{e}'_\mathcal{V} = L(a)\bar{e}_\mathcal{V}$ соответствующая точка (6.10) орбиты определяет **координаты геометрического объекта** относительно базиса $\bar{e}'_\mathcal{V}$. $\square$

Определение 6.3. Мы будем называть орбиту

$$\mathcal{O}((w, \bar{e}_\mathcal{W}, \bar{e}_\mathcal{V}), a \in G, (wA(a)^{-1}, L(a)\bar{e}_\mathcal{W}, L(a)\bar{e}_\mathcal{V}))$$

геометрическим объектом, определённым в векторном пространстве $\mathcal{V}$. Для любого базиса $\bar{e}'_\mathcal{V} = L(a)\bar{e}_\mathcal{V}$ соответствующая точка (6.10) орбиты определяет **координаты геометрического объекта** относительно базиса $\bar{e}'_\mathcal{V}$ и соответствующий вектор

$$w = w'^\alpha E'_\alpha$$

называется **представителем геометрического объекта** в базисе $\bar{e}'_\mathcal{V}$. $\square$

Мы будем также говорить, что w - это **геометрический объект типа A**

Так как геометрический объект - это орбита представления, то согласно теореме 2.14 определение геометрического объекта корректно.

Определение 6.2 строит геометрический объект в координатном пространстве. Определение 6.3 предполагает, что мы выбрали базис в векторном пространстве $\mathcal{W}$. Это позволяет использовать вместо его координат.

Теорема 6.4 (принцип инвариантности). *Представитель геометрического объекта не зависит от выбора базиса $\bar{e}_{\mathcal{V}}$.*

Доказательство. Чтобы определить представителя геометрического объекта, мы должны выбрать базис $\bar{e}_{\mathcal{V}}$, базис $\bar{e}_{\mathcal{W}} = (E_{\alpha})$ и координаты геометрического объекта w^{α} . Соответствующий представитель геометрического объекта имеет вид

$$w = w^{\alpha} E_{\alpha}$$

Базис $\bar{e}'_{\mathcal{V}}$ связан с базисом $\bar{e}_{\mathcal{V}}$ пассивным преобразованием $L(a)$. Согласно построению это порождает пассивное преобразование (6.9) и координатное преобразование (6.10). Соответствующий представитель геометрического объекта имеет вид

$$w' = w'^{\alpha} E'_{\alpha} = w^{\beta} A(a)^{-1}_{\beta}{}^{\alpha} A'_{\alpha}(a) E_{\gamma} = w'^{\beta} E'_{\beta} = w$$

Следовательно, представитель геометрического объекта инвариантен относительно выбора базиса. $\square$

Определение 6.5. Пусть

$$\begin{aligned} w_1 &= w_1^{\alpha} E_{\alpha} \\ w_2 &= w_2^{\alpha} E_{\alpha} \end{aligned}$$

геометрические объекты одного и того же типа, определённым в векторном пространстве $\mathcal{V}$. Геометрический объект

$$w = (w_1^{\alpha} + w_2^{\alpha}) E_{\alpha}$$

называется **суммой**

$$w = w_1 + w_2$$

геометрических объектов w_1 и w_2 . $\square$

Определение 6.6. Пусть

$$w_2 = w_2^{\alpha} E_{\alpha}$$

геометрический объект, определённый в векторном пространстве $\mathcal{V}$ над полем F . Геометрический объект

$$w_2 = (k w_1^{\alpha}) E_{\alpha}$$

называется **произведением**

$$w_2 = k w_1$$

геометрического объекта w_1 и константы $k \in F$. $\square$

Теорема 6.7. *Геометрические объекты типа A , определённые в векторном пространстве $\mathcal{V}$ над полем F , образуют векторное пространство над полем F .*

Доказательство. Утверждение теоремы следует из непосредственной проверки свойств векторного пространства. $\square$

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] П. К. Рашевский, Риманова геометрия и тензорный анализ, М., Наука, 1967
- [2] Г. Корн, Т. Корн, Справочник по математике для научных работников и инженеров, М., Наука, 1974

8. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- G -базис векторного пространства⁹
- G -координаты базиса¹⁰
- G -пространство¹⁰
- активное представление¹⁰
- активное преобразование на
 - многообразии базисов¹⁰
- аффинное преобразование на
 - многообразии базисов¹¹
- аффинный базис¹¹
- базис векторного пространства⁹
- вектор-столбец⁸
- вектор-строка⁸
- группа симметрии⁹
- геометрический объект в векторном
 - пространстве¹³
- геометрический объект в координатном
 - представлении¹³
- геометрический объект типа A в
 - векторном пространстве¹³
- группа аффинных преобразований¹¹
- квазиаффинное преобразование на
 - многообразии базисов¹¹
- квазидвижение на многообразии
 - базисов¹²
- координатное векторное пространство¹²
- координатное представление группы в
 - векторном пространстве¹²
- координатный изоморфизм¹²
- координаты геометрического объекта¹³
- координаты геометрического объекта в
 - координатном представлении¹³
- координаты представления⁹
- левостороннее ковариантное
 - представление группы²
- левостороннее контравариантное
 - представление группы³
- левостороннее представление группы²
- левостороннее преобразование¹
- левый сдвиг на группе⁴
- линейное представление группы⁸
- многообразие базисов аффинного
 - пространства¹¹
- многообразие базисов векторного
 - пространства⁹
- многообразие базисов евклидова
 - пространства¹²
- многообразие базисов центро-аффинного
 - пространства¹¹
- невыврожденное преобразование¹
- однородное пространство группы⁵
- однотранзитивное представление
 - группы⁵
- орбита представления группы⁴
- ортонормальный базис¹²
- пассивное представление¹⁰
- пассивное преобразование на
 - многообразии базисов¹⁰
- правостороннее ковариантное
 - представление группы³
- правостороннее контравариантное
 - представление группы³
- правостороннее представление группы²
- правостороннее преобразование²
- правый сдвиг на группе⁴
- представитель геометрического объекта
 - в векторном пространстве¹³
- представление группы²
- принцип инвариантности в векторном
 - пространстве¹⁴
- произведение геометрического объекта и
 - константы в векторном
 - пространстве¹⁴
- прямое произведение представлений
 - группы⁵
- стандартные координаты базиса¹⁰
- сумма геометрических объектов в
 - векторном пространстве¹⁴
- транзитивное представление группы⁵
- центро-аффинный базис¹¹
- эффективное представление группы⁵
- ядро неэффективности представления
 - группы⁵

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

$\mathcal{A}_n$ аффинное пространство 11	$\tilde{\mathcal{V}}$ координатное векторное пространство 12
$\mathcal{B}(\mathcal{A}_n)$ многообразие базисов аффинного пространства 11	(v^i) координаты в векторном пространстве 12
$\mathcal{B}(\mathcal{V})$ многообразие базисов векторного пространства $\mathcal{V}$ 9	$\mathcal{V}$ векторное пространство 9
$\mathcal{B}(\mathcal{CA}_n)$ многообразие базисов центрo-аффинного пространства 11	δ тождественное преобразование 2
$\mathcal{B}(\mathcal{E}_n)$ многообразие базисов евклидова пространства 12	$\bar{\delta}_k = (\delta_k^i)$ образ вектора $\bar{e}_k \in \bar{e}$ при изоморфизме в координатное векторное пространство 12
$\mathcal{CA}_n$ центрo-аффинное пространство 11	
$\bar{e} = \langle O, \bar{e}_i \rangle$ аффинный базис 11	
$\bar{e}$ базис векторного пространства 9	
$\bar{e}_{\mathcal{V}}$ базис в векторном пространстве $\mathcal{V}$ 9	
$\bar{e} = \langle \bar{e}_i \rangle$ центрo-аффинный базис 11	
$\mathcal{E}_n$ евклидово пространство 11	
$\mathcal{E}_{nm}$ псевдоевклидово пространство 11	
$\bar{e} = \langle \bar{e}_i \rangle$ ортонормальный базис 12	
e_k^i стандартные координаты базиса 10	
$\bar{e}_k$ вектор базиса 10	
$GL(\mathcal{A}_n)$ группа аффинных преобразований 11	
$G(\mathcal{V})$ группа гомоморфизмов векторного пространства $\mathcal{V}$ 9	
$L(a)b$ левый сдвиг 4	
$L(g)\bar{e}$ пассивное преобразование 10	
$l(M)$ множество левосторонних невырожденных преобразований множества M 1	
$\mathcal{O}((w, \bar{e}_{\mathcal{V}}), a \in G, (wA(a)^{-1}, L(a)\bar{e}_{\mathcal{V}}))$ геометрический объект в координатном представлении 13	
$\mathcal{O}((w, \bar{e}_{\mathcal{W}}, \bar{e}_{\mathcal{V}}), a \in G, (wA(a)^{-1}, L(a)\bar{e}_{\mathcal{W}}, L(a)\bar{e}_{\mathcal{V}}))$ геометрический объект 13	
$\mathcal{O}(v, g \in G, f(g)v) = \{w = f(g)v : g \in G\}$ орбита представления группы G 4	
$R(g)\bar{e}$ активное преобразование 9	
$R(a)b$ правый сдвиг 4	
$r(M)$ множество правосторонних невырожденных преобразований множества M 2	