

Sur deux propriétés de dualité des marches au hasard en environnement aléatoire sur $\mathbb{Z}$

Didier Piau
Université Lyon 1

Résumé

D'après Comets, Gantert et Zeitouni d'une part, et d'après Derriennic d'autre part, certaines fonctionnelles associées à des temps d'atteinte de marches au hasard en environnement aléatoire sur $\mathbb{Z}$ coïncident pour la marche elle-même et pour la marche dans l'environnement renversé. Je montre que les deux principes de dualité ainsi exhibés sont algébriquement équivalents, qu'ils découlent de la seule propriété de Markov de la marche à environnement fixé et non pas de l'ergodicité du modèle, et qu'on peut en donner des versions finitistes et presque sûres.

Abstract

According to Comets, Gantert et Zeitouni on the one hand and to Derriennic on the other hand, some functionals associated to the hitting times of random walks in random environment on the integer line coincide, for the walk itself and for the walk in the reversed environment. We show that these two duality principles are algebraically equivalent, that they both stem from the Markov property of the walk in a fixed environment, and not of the ergodicity of the model, and that there exists finitist and almost sure versions of this duality.

English title : On two duality properties of random walks in random environment on the integer line

Mots-clés : Marches au hasard en environnement aléatoire, dualités, fractions continues.

Date : Janvier 2000. Révision : juin 2001.

Classifications MSC : 60K37 (60G50).

1 Introduction

1. Cadre Soit X une marche au hasard en environnement aléatoire sur la droite $\mathbb{Z}$ des entiers. Ainsi, $(E, \mathcal{E}, m)$ est un espace de probabilité, $S : E \rightarrow E$ une bijection bimesurable qui préserve m , et $p : E \rightarrow (0, 1)$ une application mesurable. Pour $e \in E$ fixé, la suite $\{p_n(e) ; n \in \mathbb{Z}\}$, où $p_n := p \circ S^n$, permet de construire la loi P_e d'une marche au hasard $X := \{X_k ; k \geq 0\}$ au plus proche voisin sur $\mathbb{Z}$, dans l'environnement e , comme suit : sous P_e , X est une chaîne

de Markov issue de $X_0 = 0$ et, pour tout $k \geq 0$,

$$P_e(X_{k+1} = n+1 \mid X_k = n) := p_n(e) =: 1 - P_e(X_{k+1} = n-1 \mid X_k = n).$$

Soit $q := 1 - p$, $q_n := 1 - p_n$, E_e l'espérance selon P_e et $\langle \cdot \rangle$ l'espérance selon m . Enfin, pour toute fonction ϕ définie sur E et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\phi_n := \phi \circ S^n$.

Les deux propriétés de dualité que nous examinons concernent le retournement de $\mathbb{Z}$. Pour des marches au hasard classiques (donc, dans un environnement fixé), cette transformation donne des relations parfois particulièrement simples. Par exemple, d'après H. Dett, J. Fill, J. Pitman et W. Studden [3], voir aussi D. Siegmund [5], si on intervertit les probabilités des sauts $+1$ et -1 pour une marche au hasard sur la demi-droite $\mathbb{N}$ des entiers, la fonction de Green g_u , $u \in [0, 1)$, de la première marche au hasard tuée en une certaine barrière et la fonction de Green h_u de la deuxième marche au hasard réfléchie en cette même barrière vérifient

$$g_u(0, 0) \cdot h_u(0, 0) = (1 - u)^{-1}.$$

De même, d'après K. Jansons [4], si on inverse le sens de la dérive d'une diffusion réelle, les fonctions génératrices des temps d'atteinte d'un même niveau par chacune des deux diffusions obtenues sont reliées par une équation simple.

2. Dualité CGZ Dans leur preuve d'un principe de grandes déviations portant sur la vitesse X_k/k de la marche au hasard en environnement aléatoire décrite plus haut, et quand le décalage S est ergodique, F. Comets, N. Gantert et O. Zeitouni [1] montrent la relation de dualité suivante. Fixons $u \in (0, 1)$ et notons

$$f(e) := E_e(u^{\tau_1} : \tau_1 < +\infty), \quad f'(e) := E_e(u^{\tau_{-1}} : \tau_{-1} < +\infty)$$

les fonctions génératrices de τ_1 et τ_{-1} . Ici, $\tau_n := \inf\{k \geq 1 ; X_k = n\}$ est le premier temps de passage en $n \in \mathbb{Z}$. Alors, d'après la proposition 1 de la réf. [1], dès que $\log(p/q)$ est m -intégrable,

$$\langle \log f \rangle = \langle \log f' \rangle + \langle \log(p/q) \rangle. \quad (1)$$

Remarquons que la limite de (1) quand $u \rightarrow 1^-$ fournit l'égalité

$$\langle \log P(\tau_1 < +\infty) \rangle = \langle \log P(\tau_{-1} < +\infty) \rangle + \langle \log(p/q) \rangle.$$

Par conséquent, (1) montre aussi que $\langle \log g \rangle = \langle \log g' \rangle$, avec

$$g(e) := E_e(u^{\tau_1} | \tau_1 < +\infty) \quad \text{et} \quad g'(e) := E_e(u^{\tau_{-1}} | \tau_{-1} < +\infty),$$

puisque g est le rapport de f évaluée en u et de f évaluée en $u = 1$. Si la marche au hasard est par exemple m -p.s. transiente vers $+\infty$, on en déduit

$$\langle E(\tau_{-1} | \tau_{-1} < +\infty) \rangle = \langle E(\tau_1) \rangle,$$

ainsi que l'égalité des cumulants suivants.

3. Dualité D Y. Derriennic [2], en utilisant une représentation par cycles et poids, réussit à donner un critère de récurrence ou transience pour des marches au hasard dont les sauts sont d'amplitude $+2$ ou -1 en environnement aléatoire ergodique sur $\mathbb{Z}$. La loi de X est maintenant donnée par

$$P_e(X_{k+1} = n + 2 \mid X_k = n) := p_n(e) =: 1 - P_e(X_{k+1} = n - 1 \mid X_k = n).$$

Un outil crucial est la relation de dualité suivante, énoncée au lemme 3 de la réf [2], dont nous changeons ci-dessous les notations. Soit $c \geq 0$ une fonction mesurable sur E . Posons $r(0) := c =: r'(0)$ et, pour $n \geq 1$,

$$r(n) := c_{-n}/r(n-1), \quad r'(n) := c_n/r'(n-1).$$

où nous rappelons que $c_n := c \circ S^n$. Soient $x[n]$ et $x'[n]$ les deux fractions continues définies par

$$x[n] := [r(0), r(1), \dots, r(n)] \quad \text{et} \quad x'[n] := [r'(0), r'(1), \dots, r'(n)],$$

et soient x et x' les fractions continues limites, quand $n \rightarrow \infty$, de $x[n]$ et $x'[n]$. Nous rappelons les notations qui concernent les fractions continues dans la section 3. À partir des propriétés de symétrie des fractions continues, Derriennic montre que, dès que $\log c$ est m -intégrable,

$$\langle \log x[n] \rangle = \langle \log x'[n] \rangle \quad (2)$$

pour tout $n \geq 0$ et donc, par convergence dominée,

$$\langle \log x \rangle = \langle \log x' \rangle. \quad (3)$$

4. Résultats Nous montrons, sans l'hypothèse d'ergodicité, que l'extension suivante de (1) découle de la seule propriété de Markov de la marche au hasard en environnement fixé.

Proposition 1 *Soit P_e la loi de la marche au hasard au plus proche voisin sur $\mathbb{Z}$, dans l'environnement $e \in E$. Pour $u \in (0, 1)$ fixé et pour $n \geq 0$, soit*

$$f[n](e) := E_e(u^{\tau_1} : \tau_1 < \tau_{-n-1}), \quad f'[n](e) := E_e(u^{\tau_{-1}} : \tau_{-1} < \tau_{n+1}).$$

Alors, pour tout $n \geq 1$,

$$f'[n] \cdot f[n-1] \circ S^n = f'[n-1] \cdot f[n] \circ S^n. \quad (4)$$

Si $\log(p/q)$ est m -intégrable, $\log f[n]$ et $\log f'[n]$ sont m -intégrables, et

$$\langle \log f[n] \rangle = \langle \log f'[n] \rangle + \langle \log(p/q) \rangle. \quad (5)$$

Remarque 1 La condition d'intégrabilité de la proposition est équivalente au fait que $\log(pq)$ est m -intégrable. Remarquons aussi que $f[0] = pu$ et $f'[0] = qu$ donc (5) est évidente pour $n = 0$. Par ailleurs, (1) est la limite de (5) quand $n \rightarrow \infty$, donc (1) se déduit de (5) par convergence monotone. On peut enfin souligner que (4) n'entraîne pas de relation m -presque sûre analogue pour les limites f et f' puisque $f[n]$ et $f[n-1]$ apparaissent avec une puissance du décalage S qui tend aussi vers l'infini.

Nous montrons d'autre part que (2) et (5) sont algébriquement équivalentes. Cette remarque nous permet de démontrer un analogue de (4) pour $x[n]$ et $x'[n]$, et donc de retrouver directement (2)–(3).

5. Plan La section 2 donne une preuve de (4) et (5) qui utilise uniquement la propriété de Markov. Dans la section 3, nous montrons l'équivalence de (2) et (5). Enfin, la section 4 montre comment une astuce donnée dans la réf. [1] permet de retrouver simplement (3), mais sans doute pas (2).

Remerciements Je tiens à remercier Nina Gantert et Yves Derriennic pour m'avoir fait connaître respectivement les références [1] et [2] à l'origine de cette note, et pour des discussions enrichissantes.

2 Une preuve markovienne de (4)–(5)

Pour $n \geq 1$ fixé, la variable aléatoire $f'[n-1]f[n] \circ S^n$ ne dépend que des probabilités de transition à partir de points de $[0, n]$. Notons donc R la projection de E sur $(0, 1)^{n+1}$ définie par $R(e) := \{p_k(e) ; 0 \leq k \leq n\}$.

Alors, $f'[n-1] \cdot f[n] \circ S^n =: F \circ R$ pour une certaine fonction borélienne F (qui est même une fraction rationnelle). On va montrer que F est invariante par l'involution I de $(0, 1)^{n+1}$ qui envoie $\{p_k ; 0 \leq k \leq n\}$ sur $\{q_{n-k} ; 0 \leq k \leq n\}$. On peut lire I comme le retournement du segment $[-1, n+1]$ qui envoie 0 sur n et réciproquement. Puisque $F \circ I \circ R = f'[n] \cdot f[n-1] \circ S^n$, l'invariance par I entraînera bien (4).

À cet effet, notons A, B, C et D des fonctions boréliennes telles que

$$\begin{aligned} A \circ R &:= E^n(u^{\tau_{n+1}} : \tau_{n+1} < \tau_{-1}) = f[n] \circ S^n, \\ B \circ R &:= E^0(u^{\tau_{-1}} : \tau_{-1} < \tau_n) = f'[n-1], \\ C \circ R &:= E^0(u^{\tau_n} : \tau_n < \tau_{-1}), \\ D \circ R &:= E^0(u^{\tau_{n+1}} : \tau_{n+1} < \tau_{-1}), \end{aligned}$$

où E^n désigne l'espérance pour une marche au hasard issue du point n . Les fonctions composées $B \circ I$ et $C \circ I$ vérifient

$$\begin{aligned} B \circ I \circ R &= E^n(u^{\tau_{n+1}} : \tau_{n+1} < \tau_0), \\ C \circ I \circ R &= E^n(u^{\tau_0} : \tau_0 < \tau_{n+1}). \end{aligned}$$

La propriété de Markov au temps τ_0 pour une marche au hasard issue de n implique donc

$$A = B \circ I + C \circ I \cdot D.$$

Il reste à remarquer que $D = C \cdot A$, d'après la propriété de Markov au temps τ_n pour une marche au hasard issue de 0, pour obtenir une expression de A et donc de $F = A \cdot B$ en fonction de B et C . Il vient

$$F = B \cdot B \circ I / (1 - C \cdot C \circ I),$$

où la division est licite puisque C et $C \circ I \leq u < 1$. Comme $B \cdot B \circ I$ et $C \cdot C \circ I$ sont invariants par I , F l'est aussi.

Pour la preuve de (5), on remarque que l'intégrabilité de $\log p$ et $\log q$ entraîne celle de $\log f[0]$ et $\log f'[0]$. Les suites $\{f[n] ; n \geq 0\}$ et $\{f'[n] ; n \geq 0\}$ sont croissantes et majorées par 1, donc tous les $\log f[n]$ et $\log f'[n]$ sont intégrables.

La relation (4) et l'invariance de m sous l'action de S impliquent alors que $\langle \log f[n]/f'[n] \rangle$ ne dépend pas de $n \geq 0$. Comme $f[0]/f'[0] = p/q$, on a démontré (5).

3 L'équivalence de (2) et (5)

Soit $n \geq 1$, $a := pu = f[0]$ et $b := qu = f'[0]$. D'après la propriété de Markov (simple), $f[n]$ et $f'[n]$ vérifient

$$f[n] = a + b f[n] f[n-1] \circ S^{-1}, \quad f'[n] = b + a f'[n] f'[n-1] \circ S^1. \quad (6)$$

En effet, en conditionnant par le premier pas de la marche au hasard, on a par exemple

$$f[n] = pu + qu E(u^{\tau_2} : \tau_2 < \tau_{-n}) \circ S^{-1},$$

et il reste à calculer $E(u^{\tau_2} : \tau_2 < \tau_{-n}) = f[n-1] f[n] \circ S^1$.

Avant d'étudier $x[n]$ et $x'[n]$, rappelons que, pour des réels s_k donnés, tous positifs pour simplifier, $[s_0, s_1, \dots, s_n]$ désigne une fraction continue, que l'on peut définir par récurrence comme suit : $[s_n] := s_n$ et

$$[s_0, s_1, \dots, s_n] := s_0 + 1/[s_1, s_2, \dots, s_n].$$

On voit que, pour $\lambda \neq 0$,

$$\lambda [s_0, s_1, s_2, s_3, \dots] = [\lambda s_0, s_1/\lambda, \lambda s_2, s_3/\lambda, \dots].$$

Cette propriété d'homogénéité des fractions continues est la seule que nous utilisons. Elle implique que

$$\begin{aligned} x[n] &= c [1, c_{-1}, c_{-2}/c_{-1}, \dots] \\ &= c (1 + 1/[c, c_{-1}/c, c c_{-2}/c_{-1}, \dots] \circ S^{-1}). \end{aligned}$$

Ce calcul et un calcul analogue pour $x'[n]$ montrent que

$$x[n] = c (1 + 1/x[n-1] \circ S^{-1}), \quad x'[n] = c (1 + 1/x'[n-1] \circ S). \quad (7)$$

Bien sûr, les systèmes d'équations (6) et (7) ne sont pas identiques mais on passe de l'un à l'autre, au moins formellement, en posant

$$x[n] = -1/b f[n] \circ S^{-1}, \quad x'[n] = -1/a_{-1} f'[n], \quad c = -1/a_{-1} b.$$

Ou bien, dans l'autre sens, en posant par exemple

$$f[n] = 1/x[n] \circ S, \quad f'[n] = -c/x'[n], \quad a = 1/c_1, \quad b = -1.$$

Cette transcription fait intervenir des quantités négatives mais elle respecte, au contraire d'autres solutions formellement correctes, les mesurabilités de x , x' , f et f' (ainsi, x est mesurable par rapport à $\{c_n; n \leq 0\}$ et f est mesurable par rapport à $\{p_n; n \leq 0\}$), de même que les conditions initiales $f[0] = a$, $f'[0] = b$ et $x[0] = x'[0] = c$. Ceci démontre l'analogie suivant de (4), valable pour tout $n \geq 1$:

$$x'[n-1] x[n] \circ S^{n+1} = x'[n] x[n-1] \circ S^{n+1}. \quad (8)$$

Dès que tous les $\log x[k]$ sont m -intégrables, l'invariance de la mesure sous l'action de S assure donc que $\langle \log x'[n] \rangle = \langle \log x[n] \rangle$, pour tout $n \geq 0$, par récurrence sur n . Or, $x[0] \leq x[k] \leq x[1]$ pour tout $k \geq 0$ et on peut vérifier que $\log x[0] = \log c$ et

$$\log x[1] = \log c + \log(1 + c_{-1}) - \log c_{-1}$$

sont tous deux m -intégrables si $\log c$ l'est. On a démontré (2).

Remarque 2 La méthode utilisée dans la réf. [2] permet également de retrouver (8). On peut pour cela utiliser la relation de symétrie des fractions continues rappelée dans [2] et chercher une relation presque sûre entre $x[n]$ et $x'[n]$, au lieu d'intégrer des égalités intermédiaires. On trouve alors pour $n \geq 0$,

$$c x[n] \circ S^{n+2} \prod_{k=1}^n x[k] \circ S^{k+1} = c_2 x'[n] \prod_{k=1}^n x[k] \circ S^{k+2},$$

relation qui entraîne bien (8).

4 Les preuves “en une ligne” de (1) et (3)

Nous rappelons la méthode de la réf. [1] pour démontrer (1) et nous la copions pour montrer directement (3). Avec les notations de la Section 3, on remarque que f et f' vérifient les relations de récurrence suivantes :

$$f = a + b f f \circ S^{-1}, \quad f' = b + a f' f' \circ S.$$

Plutôt que d'écrire alors f et f' comme des fractions continues en $\{p_n; n \leq 0\}$ et $\{p_n; n \geq 0\}$ respectivement, on évalue simplement

$$\begin{aligned} b f (1 - f \circ S^{-1} f') &= b f - f' (f - a) = b f + a f' - f (b + a f' f' \circ S) \\ &= a f' (1 - f f' \circ S). \end{aligned}$$

Si on pose $h = 1 - f \circ S^{-1} f'$, cette relation devient : $b f h = a f' h \circ S$. Ceci démontre (1) car $a/b = p/q$ et $\langle \log(h \circ S/h) \rangle = 0$.

Remarque 3 Puisque f et f' sont dans $[0, u]$, $\log h$ est toujours m -intégrable. La seule condition pour prouver (1) est donc bien que $\log(a/b)$ soit m -intégrable. Cette condition devient même inutile si on souhaite seulement montrer que $\langle \log(bf/af') \rangle = 0$.

Dans le même esprit que ci-dessus, une preuve de (3) consiste à remarquer que x et x' vérifient les relations de récurrence :

$$x = c(1 + 1/x \circ S^{-1}), \quad x' = c(1 + 1/x' \circ S).$$

On introduit alors $y = c + x x'$ et on calcule

$$\begin{aligned} c_1 x' \circ S y &= c_1 x' \circ S c + c_1 x c (1 + x' \circ S) \\ &= c c_1 (x' \circ S + x) + c x' \circ S (x x \circ S - c_1) \\ &= c x (c_1 + x' \circ S x \circ S) = c x y \circ S. \end{aligned}$$

Si $\log c$, $\log y$, $\log x$ et $\log x'$ sont m -intégrables, on en déduit

$$\langle \log(x' \circ S/x) \rangle = \langle \log(c/c_1) \rangle + \langle \log(y \circ S/y) \rangle = 0,$$

ce qui entraîne bien $\langle \log x' \rangle = \langle \log x \rangle$. Or, en utilisant à nouveau les encadrements $x[0] \leq x \leq x[1]$ et $x'[0] \leq x' \leq x'[1]$, on peut vérifier que $\log y$, $\log x$ et $\log x'$ sont bien m -intégrables dès que $\log c$ l'est.

Remarque 4 Cette méthode ne semble pas redonner les versions “temps de sortie d’intervalles bornés” de (1) et (3), c’est-à-dire (5) et (2).

Références

- [1] F. Comets, N. Gantert et O. Zeitouni (1998). Quenched, annealed and functional large deviations for one-dimensional random walk in random environment. *Prépublication*. *Probab. Theory Related Fields* 118 (2000), no. 1, 65–114.
- [2] Y. Derriennic (1998). Random walks with jumps in random environments (examples of cycle and weight representations). *Prépublication* no. 20 de l’Université de Bretagne Occidentale.
Sur la récurrence des marches aléatoires unidimensionnelles en environnement aléatoire. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* 329 (1999), no. 1, 65–70.
- [3] H. Dette, J. A. Fill, J. Pitman et W. J. Studden (1997). Wall and Siegmund duality relations for birth and death chains with reflecting barrier. *J. Theoret. Probab.*, 10(2) : 349–374.
- [4] K. M. Jansons (1996). Excursions into a new duality relation for diffusion processes. *Electron. Comm. Probab.*, 1(7) : 65–69.
- [5] D. Siegmund (1976). The equivalence of absorbing and reflecting barrier problems for stochastically monotone Markov processes. *Ann. Probability*, 4(6) : 914–924.

Université Claude Bernard Lyon 1
LaPCS – Laboratoire de Probabilités, Combinatoire et Statistique
43, boulevard du 11-Novembre-1918
69622 Villeurbanne Cedex (France)
`Didier.Piau@univ-lyon1.fr`