

Les algèbres de Lie résolubles rigides réelles ne sont pas nécessairement complètement résolubles \*

J. M. Ancochea Bermúdez<sup>†</sup>, R. Campoamor-Stursberg<sup>‡</sup>  
and L. García Vergnolle<sup>§</sup>

Dpto. Geometría y Topología, Facultad CC. Matemáticas U.C.M.  
Plaza de Ciencias 3, E-28040 Madrid

### Résumé

On montre qu'une algèbre de Lie résoluble rigide réelle n'est pas nécessairement complètement résoluble. On construit un exemple  $\mathfrak{n} \oplus \mathfrak{t}$  de dimension minimale dont le tore extérieur  $\mathfrak{t}$  n'est pas formé par des dérivations *ad*-semi-simples sur  $\mathbb{R}$ . Nous étudions les formes réelles des nilradicaux des algèbres de résolubles rigides en dimension  $n \leq 7$  et donnons la classification des algèbres résolubles rigides sur  $\mathbb{R}$  en dimension 8.

## 1 Preliminaries

Rappelons qu'une algèbre de Lie  $\mathfrak{g}$  sur un corps  $\mathbb{K}$  de caractéristique 0 est dite rigide lorsque son orbite dans le schéma  $L_n$  donné par les relations de Jacobi sur la famille des lois d'algèbres de Lie sur  $\mathbb{K}^n$  est ouverte sous l'action du groupe  $GL(n, \mathbb{K})$ . Si  $H^2(\mathfrak{g}, \mathfrak{g})$  est le deuxième groupe de cohomologie à valeurs dans le module adjoint, le critère de rigidité de Nijenhuis et Richardson [10] donne une condition suffisante : si  $H^2(\mathfrak{g}, \mathfrak{g}) = 0$ , alors l'algèbre  $\mathfrak{g}$  est rigide dans  $L_n$ . Dans [6], on montre que sur un corps  $\mathbb{K}$  algébriquement clos de caractéristique 0, toute algèbre de Lie résoluble rigide vérifie la décomposition suivante :

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{n} \oplus \mathfrak{t},$$

où  $\mathfrak{n}$  est le nilradical de  $\mathfrak{g}$  et  $\mathfrak{t}$  est une sous-algèbre abélienne dont les éléments sont *ad* <sub>$\mathfrak{g}$</sub> -semi-simples, appelé tore extérieur de  $\mathfrak{g}$ . En utilisant cette propriété, on peut développer une théorie de racines qui permet classifier les algèbres de Lie résolubles rigides complexes par rapport au spectre du tore extérieur.

**Définition 1** *Un élément  $X \in \mathfrak{t}$  est dit régulier si la dimension du noyau  $\ker ad(X)$  est minimale.*

---

\*Les auteurs ont été supportés par le projet de recherche PR1/05-13283 de la UCM.

<sup>†</sup>e-mail : ancochea@mat.ucm.es

<sup>‡</sup>e-mail : rutwig@mat.ucm.es

<sup>§</sup>e-mail : lucigarcia@mat.ucm.es

Comme  $ad(X)$  est diagonalisable et le nilradical est invariant par cet opérateur, on peut trouver une base  $\{X_1, \dots, X_n = X\}$  de vecteurs propres telle que  $\{X_1, \dots, X_{p+q}\}$  soit une base de  $\mathfrak{n}$ ,  $\{X_{p+q+1}, \dots, X_n = X\}$  soit une base de  $\mathfrak{t}$  et  $\{X_{p+1}, \dots, X_n = X\}$  une base de  $\ker ad(X)$ . Alors on considère le système linéaire de racines  $S$  à  $\dim \mathfrak{g} - 1$  variables  $x_i$  dont les équations sont  $x_i + x_j = x_k$  si la composante du vecteur  $[X_i, X_j]$  sur  $X_k$  est non nulle. De cette façon, on obtient un critère de rigidité :

**Proposition 1** [1] *Si  $\mathfrak{g}$  est rigide, alors pour tout vecteur régulier  $X$  on a  $\text{rank}(S) = \dim \mathfrak{n} - 1$ .*

En utilisant ce système, on a classifié les algèbres de Lie résolubles rigides complexes jusqu'à dimension huit [1]. De plus, cette propriété linéaire implique une autre d'ordre structurale :

**Définition 2** *Une algèbre de Lie  $\mathfrak{r}$  sur le corps  $\mathbb{K}$  est dite complètement résoluble si pour tout  $X \in \mathfrak{r}$  les valeurs propres de  $adX$  sont des éléments de  $\mathbb{K}$ .*

En particulier, cette structure implique l'existence d'une suite

$$\mathfrak{r} = I_n \supset I_{n-1} \supset \dots \supset I_0 = 0,$$

où les  $I_k$  sont des idéaux de codimension 1 dans  $I_{k+1}$ .

**Proposition 2** *Soit  $\mathfrak{r}$  une algèbre de Lie résoluble rigide complexe. Alors  $\mathfrak{r}$  est complètement résoluble.*

**Démonstration.** D'après la proposition 1, pour toute algèbre de Lie résoluble complexe rigide il existe une base  $\{X_1, \dots, X_r\}$  du tore extérieur  $\mathfrak{t}$  telle que les valeurs propres des opérateurs adjointes sont des entières. En effet, étant donnée une base  $\{Y_1, \dots, Y_r\}$  de  $\mathfrak{t}$ , les valeurs propres des opérateurs  $ad(Y_j)$  sont des solutions du système  $S(X)$ . Comme celui-ci est à coefficient entiers, il existe une base de solutions rationnelles, et pourtant on peut trouver une base de solutions entières. ■

Dans [2] on a montré l'existence des algèbres de Lie rigides complexes non-réelles. D'après le théorème du rang, ça implique que le tenseur de structure du nilradical n'est pas réel, c'est-à-dire, le nilradical n'admet pas des formes réelles<sup>1</sup>. On appellera une algèbre de Lie complexe sans formes réelles purement complexe.

**Proposition 3** *Toute algèbre de Lie résoluble rigide complexe  $\mathfrak{g} = \mathfrak{n} \oplus \mathfrak{t}$  dont le nilradical n'est pas purement complexe admet des formes réelles.*

La preuve est immédiate. En effet, si le nilradical n'est pas purement complexe, alors les constantes de structure de  $\mathfrak{n}$  sont réelles. Par le théorème du rang, on peut trouver des générateurs du tore extérieur ayant des valeurs propres entières. Alors la restriction par scalaires donne une algèbre de Lie réelle, appelée la forme réelle normale. De plus, toute autre forme réelle ( $\mathfrak{n}' \oplus \mathfrak{t}$ ) possède au moins un générateur  $X \in \mathfrak{t}$  tel que  $ad(X)$  n'est pas diagonalisable sur  $\mathbb{R}$ , mais  $X \in \mathfrak{t}$  vu comme générateur de l'algèbre complexifiée.

<sup>1</sup>Rappelons qu'une forme réelle d'une algèbre de Lie complexe  $\mathfrak{g}$  est une algèbre réelle  $\mathfrak{g}'$  telle que  $\mathfrak{g}' \otimes \mathbb{C} \simeq \mathfrak{g}$ .

## 2 L'exemple

Dans ce paragraphe on montre, par construction d'un exemple, que pour les algèbres de Lie réelles résolubles rigides la propriété de résolubilité complète ne reste pas valable si la forme réelle n'est pas la normale. L'exemple construit est aussi de dimension minimale.

Considérons les lois d'algèbres de Lie nilpotentes  $\mathfrak{g}_1 = (\mathbb{R}^6, \mu_1)$  et  $\mathfrak{g}_2 = (\mathbb{R}^6, \mu_2)$  définies dans une base  $\{X_1, \dots, X_6\}$  par les crochets :

$$\begin{aligned} \mu_1(X_1, X_i) &= X_{i+1} \quad (2 \leq i \leq 4), & \mu_1(X_3, X_2) &= X_6, & \mu_1(X_6, X_2) &= X_5, \\ \mu_2(X_1, X_i) &= X_{i+1} \quad (2 \leq i \leq 4), & \mu_2(X_3, X_2) &= -X_6, & \mu_2(X_6, X_2) &= X_5, \end{aligned}$$

Les algèbres ne sont pas isomorphes, et correspondent aux classes d'isomorphisme  $N_{6,6}$  et  $N_{6,7}$  de la liste [7]. Si on considère le produit tensoriel, on a  $\mathfrak{g}_1 \otimes \mathbb{C} \simeq \mathfrak{g}_2 \otimes \mathbb{C}$ .

**Lemme 1** *L'algèbre  $\mathfrak{g}_1 = (\mathbb{R}^6, \mu_1)$  admet une dérivation diagonalisable  $f_1^1$  et une dérivation non-nilpotente  $f_1^2$  données respectivement par*

$$\begin{aligned} f_1^1(X_i) &= X_i \quad (i = 1, 2), & f_1^1(X_i) &= (i-1)X_i \quad (i = 3, 4, 5), & f_1^1(X_6) &= 3X_6. \\ f_1^2(X_1) &= X_2, & f_1^2(X_2) &= -X_1 & f_1^2(X_4) &= -X_6. & f_1^2(X_6) &= X_4. \end{aligned}$$

sur la base  $\{X_1, \dots, X_6\}$ . De plus,  $f_1^1 \circ f_1^2 = f_1^2 \circ f_1^1$ .

C'est facile de voir que toute dérivation non nilpotente de l'algèbre  $(\mathbb{R}^6, \mu_1)$  fait intervenir une combinaison linéaire des dérivations  $f_1^1$  et  $f_1^2$ . Comme le polynôme caractéristique de  $f_1^2$  sur la base donnée est  $P(T) = T^2(T^2 + 1)^2$ , cette dérivation n'est pas diagonalisable sur  $\mathbb{R}$ . De cette façon, on obtient une algèbre abélienne  $\mathfrak{t} \in \text{Der}(\mathfrak{g}_1)$  constituée par dérivations non nilpotentes, mais dont seulement une est diagonalisable.

**Lemme 2** *L'algèbre  $\mathfrak{g}_2 = (\mathbb{R}^6, \mu_2)$  admet un tore extérieur  $\mathfrak{t}$  de rang 2.*

Toute dérivation non nilpotente de l'algèbre  $(\mathbb{R}^6, \mu_2)$  fait intervenir une combinaison linéaire des dérivations

$$\begin{aligned} g_1^1(X_i) &= X_i \quad (i = 1, 2), & g_1^1(X_i) &= (i-1)X_i \quad (i = 3, 4, 5), & g_1^1(X_6) &= 3X_6. \\ g_1^2(X_1) &= X_2, & g_1^2(X_2) &= X_1 & g_1^2(X_4) &= X_6. & g_1^2(X_6) &= X_4. \end{aligned}$$

C'est immédiat que les dérivations sont diagonalisables, et sur la base de vecteurs propres

$$\left\{ \begin{aligned} X'_1 &= \frac{1}{2}(X_1 + X_2), X'_2 = \frac{1}{2}(X_2 - X_1), X'_3 = \frac{1}{2}X_3, X'_4 = \frac{1}{4}(X_4 - X_6), \\ X'_5 &= \frac{1}{4}(X_6 + X_4), X'_6 = \frac{1}{4}X_5 \end{aligned} \right\}$$

on obtient les crochets

$$\mu_2(X'_1, X'_i) = X'_{i+1} \quad (i = 2, 3, 5), \quad \mu_2(X'_3, X'_2) = -X'_5, \quad \mu_2(X'_2, X'_4) = X'_6.$$

Les valeurs propres des dérivations  $g_1^1$  et  $g_1^2$  sont, respectivement

$$\begin{aligned} \sigma(g_1^1) &= (1, 1, 2, 3, 3, 4) \\ \sigma(g_1^2) &= (-1, 1, 0, -1, 1, 0). \end{aligned}$$

Pour commodité, on considère les dérivations  $f_2^1 = \frac{1}{2}(3g_1^1 + g_1^2)$  et  $f_2^2 = \frac{1}{2}(g_1^1 + g_1^2)$ . Pour cette base du tore  $\mathfrak{t}$ , les valeurs propres sont :

$$\begin{aligned} f_2^1(X'_i) &= iX'_i \quad (1 \leq i \leq 6), \\ f_2^2(X'_i) &= X'_i \quad (2 \leq i \leq 4), \quad f_2^2(X'_i) = 2X'_i \quad (i = 5, 6). \end{aligned}$$

Soient  $\widehat{\mathfrak{g}}_1 = (\mathbb{R}^8, \widehat{\mu}_1)$  et  $\widehat{\mathfrak{g}}_2 = (\mathbb{R}^8, \widehat{\mu}_2)$  les algèbres résolubles non nilpotentes définies par

$$\begin{aligned} \widehat{\mu}_1(X_1, X_i) &= X_{i+1} \quad (2 \leq i \leq 4), & \widehat{\mu}_1(X_3, X_2) &= X_6, & \widehat{\mu}_1(X_6, X_2) &= X_5, \\ \widehat{\mu}_1(X_7, X_i) &= X_i \quad (i = 1, 2), & \widehat{\mu}_1(X_7, X_3) &= 2X_3, & \widehat{\mu}_1(X_7, X_5) &= 4X_5, \\ \widehat{\mu}_1(X_7, X_i) &= 3X_i \quad (i = 4, 6), & \widehat{\mu}_1(X_8, X_1) &= X_2, & \widehat{\mu}_1(X_8, X_2) &= -X_1, \\ \widehat{\mu}_1(X_8, X_4) &= -X_6, & \widehat{\mu}_1(X_8, X_6) &= X_4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \widehat{\mu}_2(X_1, X_i) &= X_{i+1} \quad (i = 2, 3, 5), & \widehat{\mu}_2(X_3, X_2) &= -X_5, & \widehat{\mu}_2(X_2, X_4) &= X_6, \\ \widehat{\mu}_2(X_7, X_i) &= X_i \quad 1 \leq i \leq 6, & \widehat{\mu}_2(X_8, X_i) &= X_i, & (i = 2, 3, 4), \\ \widehat{\mu}_2(X_8, X_i) &= 2X_i \quad (i = 5, 6). \end{aligned}$$

sur une base  $\{X_1, \dots, X_8\}$ . On observe que le nilradical de  $\widehat{\mathfrak{g}}_i$  est isomorphe à  $\mathfrak{g}_i$  pour  $i = 1, 2$ . Pour la deuxième algèbre, nous utilisons une base de vecteurs propres de  $\mathfrak{g}_2$ .

**Lemme 3** *Les algèbres  $\widehat{\mathfrak{g}}_1 \otimes \mathbb{C} \simeq \widehat{\mathfrak{g}}_2 \otimes \mathbb{C}$  sont isomorphes. De plus, l'algèbre  $\widehat{\mathfrak{g}}_1 \otimes \mathbb{C}$  est rigide à cohomologie nulle.*

En effet, l'algèbre  $\widehat{\mathfrak{g}}_1 \otimes \mathbb{C}$  coïncide avec l'algèbre résoluble rigide  $\mathfrak{r}_8^{22}$  de la liste [8]. En particulier, il en résulte que  $H^2(\widehat{\mathfrak{g}}_1 \otimes \mathbb{C}, \widehat{\mathfrak{g}}_1 \otimes \mathbb{C}) = 0$ .

**Théorème 1** *Les algèbres de Lie  $\widehat{\mathfrak{g}}_1$  et  $\widehat{\mathfrak{g}}_2$  sont rigides complètes sur  $\mathbb{R}$ . De plus,  $\widehat{\mathfrak{g}}_1$  n'est pas complètement résoluble.*

**Démonstration.** D'après le lemme 3, l'algèbre complexifiée  $\widehat{\mathfrak{g}}_2 \otimes \mathbb{C}$  de  $\widehat{\mathfrak{g}}_2$  est rigide et satisfait  $H^2(\widehat{\mathfrak{g}}_2 \otimes \mathbb{C}, \widehat{\mathfrak{g}}_2 \otimes \mathbb{C}) = 0$ . D'après les propriétés de la cohomologie, le deuxième groupe de cohomologie de  $\widehat{\mathfrak{g}}_1$  et  $\widehat{\mathfrak{g}}_1$  est aussi nul, ce qui montre la rigidité en appliquant le théorème de rigidité de Nijenhuis et Richardson. Considérons l'opérateur adjoint  $ad_{\widehat{\mu}_1}(X_8)$ . Sur la base  $\{X_1, \dots, X_8\}$ , cet opérateur

est donné par la matrice

$$ad_{\hat{\mu}_1}(X_8) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

et comme le polynôme minimal est  $m(T) = T + T^3$ ,  $ad_{\hat{\mu}_1}(X_8)$  n'est pas diagonalisable sur  $\mathbb{R}$ , alors l'algèbre n'est pas complètement résoluble.

D'un autre côté, l'algèbre  $\hat{\mathfrak{g}}_2$  et l'algèbre  $r_8^{22}$  dans [8] ont les mêmes constantes de structure, ce qui prouve que cette forme réelle est la normale. La complétude est une conséquence de la suite bien connue [6] :

$$\dim Der(\mathfrak{g}) = \dim \mathfrak{g} + \dim H^2(\mathfrak{g}, \mathfrak{g})$$

et la nullité du groupe de cohomologie. ■

L'algèbre  $\hat{\mathfrak{g}}_1$  admet une décomposition  $\hat{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1 \overrightarrow{\oplus} \mathfrak{t}$ , où  $\mathfrak{t}$  est une sous-algèbre abélienne de  $Der \mathfrak{g}_1$  générée par  $X_7$  et  $X_8$ . Cependant, tout vecteur de  $\hat{\mathfrak{g}}_1$  qui soit ad-semi-simple fait intervenir une combinaison linéaire des vecteurs  $X_7$  et  $X_8$ , et comme  $ad_{\hat{\mu}_1}(X_8)$  n'est pas diagonalisable, la seule possibilité c'est considérer des multiples du vecteur  $X_7$ . De cette façon, au contraire que dans le cas complexe, l'algèbre  $\hat{\mathfrak{g}}_1$  n'admet pas une décomposition du type  $\hat{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{k}$ , où  $\mathfrak{k}$  est une sous-algèbre abélienne de  $Der(\mathfrak{g}_1)$  générée par des éléments ad-semi-simples. Dans ce cas l'algèbre  $\mathfrak{t}$  joue le rôle du tore maximal de dérivations et tout système linéaire de racines associé au vecteur régulier  $X_7$  est de corang 1 et  $\dim \mathfrak{t} = 2$ . Cette remarque montre que, pour couvrir le cas réel, la théorie des systèmes linéaires obtenue en [1], ainsi que les notions du graphe des poids [3, 5], doivent être modifiées. En particulier, on obtient le critère suivant :

**Proposition 4** *Soit  $\mathfrak{g}$  une algèbre de Lie résoluble rigide complexe. Alors seulement la forme réelle normale  $\mathfrak{g}_{\mathbb{R}}$  est complètement résoluble.*

**Démonstration.** En effet, si  $\mathfrak{g}$  admet des formes réelles, la forme normale a les mêmes constantes de structure, alors elle est complètement résoluble. Comme en tout cas la partie nilpotente a des constantes de structure sur  $\mathbb{R}$ , si la forme réelle  $\mathfrak{g}'$  n'est pas la normale, alors son nilradical possède une dérivation non diagonale sur  $\mathbb{R}$  mais sur  $\mathbb{C}$  qui appartient au tore extérieur. En conséquence,  $\mathfrak{g}'$  n'est pas complètement résoluble. ■

### 3 Classification réelle jusqu'à dimension 8

Soit  $\mathfrak{g}$  algèbre de Lie réelle. Alors on a  $\dim H^2(\mathfrak{g}, \mathfrak{g}) = \dim H^2(\mathfrak{g} \otimes \mathbb{C}, \mathfrak{g} \otimes \mathbb{C})$ , étant donné que les coefficients du système qui donne les cocycles est à coeffi-



-  $\mathfrak{r}_{8,22}^2 = \widehat{\mathfrak{g}}_1$  :

$$\begin{aligned} [X_1, X_i] &= X_{i+1} & (2 \leq i \leq 4), & & [X_3, X_2] &= X_6, & [X_6, X_2] &= X_5, \\ [X_7, X_i] &= X_i & (i = 1, 2), & & [X_7, X_3] &= 2X_3, & [X_7, X_5] &= 4X_5, \\ [X_7, X_i] &= 3X_i & (i = 4, 6), & & [X_8, X_1] &= X_2, & [X_8, X_2] &= -X_1, \\ [X_8, X_4] &= -X_6, & [X_8, X_6] &= X_4. \end{aligned}$$

-  $\mathfrak{r}_{8,29}^2$  :

$$\begin{aligned} [X_1, X_i] &= X_{i+2} & (2 \leq i \leq 4), & & [X_2, X_3] &= X_6, & [X_2, X_4] &= -X_5, \\ [X_7, X_i] &= X_i & (i = 1, 2), & & [X_7, X_i] &= 2X_i, & (i = 3, 4), & \\ [X_7, X_i] &= 3X_i & (i = 5, 6), & & [X_8, X_1] &= X_2, & [X_8, X_2] &= -X_1, \\ [X_8, X_5] &= X_6, & [X_8, X_6] &= -X_5. \end{aligned}$$

**Démonstration.** Comme les algèbres résolubles rigides complexes de dimension  $n \leq 8$  sont rationnelles, alors la forme normale des classes d'isomorphisme  $\mathfrak{r}_{8,i}$  de la liste [1] sont rigides comme algèbres réelles. D'après la remarque antérieure, il suffit déterminer les formes normales des algèbres nilpotentes qui apparaissent comme nilradical d'une algèbre de Lie résoluble complexe rigide en dimension 8 et possèdent des dérivations non diagonales sur  $\mathbb{R}$ . Ça implique que la dimension du nilradical est 6 ou 7, mais par la proposition 5, la dimension ne peut pas être 7. Le problème est alors réduit à voir les formes réelles des algèbres nilpotentes complexes de dimension 6. Parmi ces algèbres, seulement  $\mathcal{N}_{6,6} \otimes \mathbb{C} \simeq \mathcal{N}_{6,7} \otimes \mathbb{C}$  et  $\mathcal{N}_{6,12} \otimes \mathbb{C} \simeq \mathcal{N}_{6,14} \otimes \mathbb{C}$  apparaissent comme des nilradicaux des algèbres de Lie rigides complexes  $\mathfrak{r}_{8,22}$  et  $\mathfrak{r}_{8,29}$  de la liste [8], où les algèbres  $\mathcal{N}_{6,6}, \mathcal{N}_{6,7}, \mathcal{N}_{6,12}$  et  $\mathcal{N}_{6,14}$  sont définies par les crochets :

1.  $\mathcal{N}_{6,12}$  :

$$[X_1, X_2] = X_4, [X_1, X_3] = X_5, [X_1, X_4] = X_5, [X_2, X_4] = X_6.$$

2.  $\mathcal{N}_{6,14}$  :

$$\begin{aligned} [X_1, X_2] &= X_4, [X_1, X_3] = X_5, [X_1, X_4] = X_6, [X_2, X_3] = X_6, \\ [X_2, X_4] &= -X_5. \end{aligned}$$

Les algèbres  $\mathcal{N}_{6,6}$  et  $\mathcal{N}_{6,7}$  sont celles employées dans l'exemple de la section 2. L'algèbre  $\mathcal{N}_{6,12}$  admet un tore extérieur  $\mathfrak{t}$  de dimension 2, et la somme semi-directe  $\mathcal{N}_{6,12} \overrightarrow{\oplus} \mathfrak{t}$  est isomorphe à l'algèbre  $\mathfrak{r}_{8,29}$  de [8]. L'algèbre  $\mathcal{N}_{6,14}$  admet seulement une dérivation diagonalisable, et une nondiagonalisable. La somme semi-directe correspond à  $\mathfrak{r}_{8,29}^2$ .

■

**Remarque finale 1** *On peut se poser la question si pour les algèbres de Lie complexes et réelles la rigidité se preverse par complexification et réalification (comme pour la semi-simplicité). Ici il y a deux problèmes : D'abord, on peut*

*construire des algèbres résolubles complexes sans formes réelles (voir [2]), et la nullité de la cohomologie n'est pas une condition nécessaire. Est-ce que on peut trouver des algèbres réelles rigides  $\mathfrak{g}$  sur  $\mathbb{R}$  (et dont  $\dim H^2(\mathfrak{g}, \mathfrak{g}) \neq 0$  qui ne soient pas rigides sur  $\mathbb{C}$  ? On peut conjecturer qu'une algèbre de Lie réelle est rigide (sur le corps réel) si et seulement l'algèbre complexifiée l'est sur le corps complexe. Mais pour les algèbres avec cohomologie non nulle il nous manque d'une méthode effective qui nous permet d'étudier la rigidité. Surtout pour rank un, l'existence de formes réelles non normales équivaut à la conjecture posée dans [4] concernant l'impossibilité du poid  $\lambda = 0$  dans le cas complexe.*

## Références

- [1] J. M. Ancochea, M. Goze, Le rang du système linéaire des racines d'une algèbre de Lie rigide résoluble complexe, Comm. Algebra 20 (1992), 875-887.
- [2] J. M. Ancochea, M. Goze, On the nonrationality of rigid Lie algebras, Proc. Am. Math. Soc. **127** (1999), 2611-2618.
- [3] J. M. Ancochea, R. Campoamor-Stursberg. 2-step solvable Lie algebras and weight graphs, Transf. Groups **7** (2002), 307-320.
- [4] R. Campoamor-Stursberg. on the invariant of rigid Lie algebras up to dimension 8, J. Phys. A : Math. Gen. **35** (2002), 6293-6306.
- [5] R. Campoamor-Stursberg. A graph theoretical determination of solvable complete Lie algebras, Linear Alg. Appl. **372** (2003), 53-66.
- [6] R. Carles, Sur la structure des algèbres de Lie rigides, Ann. Inst. Fourier 34 (1984), 65-82.
- [7] A. Cerezo, Les algèbres de Lie nilpotentes réelles et complexes de dimension 6, Prépublications Université de Nice, 1983.
- [8] M. Goze, J. M. Ancochea, Classification of rigid Lie algebras, J. Algebra 245 (2001), 68-91.
- [9] A. I. Mal'cev, Solvable Lie algebras, Izv. Akad. Nauk SSSR 9 (1945), 329-356.
- [10] A. Nijenhuis, R. W. Richardson, Deformations of Lie algebra structures. J. Math. Mech. 17 1967 89-105.