

ИЗОТОПИЧЕСКИЕ ПАРЫ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. II. ОБЩИЙ СУПЕРСЛУЧАЙ.

Д.В.Юрьев

Изотопические пары, алгебраические объекты, посредством которых представляется удобным описывать некоторые формы негамильтонова взаимодействия (магнитного типа) гамильтоновых систем на квантовом уровне, рассматриваются в максимальной общности в рамках формализма векторной супералгебры.

В первой части работы, посвященной изотопическим парам и их представлениям, рассматривались чисто четные изотопические пары [1]. Однако, как с теоретической, так и с прикладной точек зрения имеет смысл исследовать наряду с чисто четными объектами их нечетные и супераналоги [2]. В данной второй части изотопические пары изучаются во всей общности.

1. Изотопические пары: определения и примеры. Обозначим

$$A_{XYZ} = (-1)^{p(X)p(Y)+p(Y)p(Z)+p(Z)p(X)},$$

$$B_{XYZW} = (-1)^{p(X)p(Y)+p(Y)p(Z)+p(Z)p(W)+p(W)p(X)},$$

где $p(X) = 0, 1$ — четность элемента X .

Определение 1. Пара (V_1, V_2) линейных суперпространств $V_i = V_i^0 \oplus V_i^1$ ($i = 1, 2$) называется *изотопической парой* (*isotopic pair*), если и только если определены два (четных) отображения $m_1 : V_2 \otimes V_1 \otimes V_1 \mapsto V_1$ и $m_2 : V_1 \otimes V_2 \otimes V_2 \mapsto V_2$ такие, что операции $(X, Y) \mapsto [X, Y]_U = m_i(U, X, Y) = A_{XUY}m_i(U, Y, X)$ ($i = 1, 2$; $X, Y \in V_1, U \in V_2$ или $X, Y \in V_2, U \in V_1$), называемые изокоммутаторами (с изотопическими элементами U), удовлетворяют тождествам

$$A_{VYZ}[[X, Y]_U, Z]_V + A_{UZV}[X, [Z, Y]_U]_V + A_{XZU}[[Z, X]_U, Y]_V +$$

$$B_{VZYU}[[X, Y]_V, Z]_U + [X, [Z, Y]_V]_U + B_{XZUV}[[Z, X]_V, Y]_U = 0$$

(аналогам тождества Якоби) и согласованы между собой:

$$[X, Y]_{[U, V]_Z} = \frac{1}{2}(A_{VYZ}[[X, Y]_U, Z]_V + [X, [Z, Y]_V]_U + B_{XZUV}[[Z, X]_V, Y]_U) -$$

$$\frac{1}{2}(B_{VZYU}[[X, Y]_V, Z]_U + A_{UZV}[X, [Z, Y]_U]_V + A_{XZU}[[Z, X]_U, Y]_V)$$

где $X, Y, Z \in V_1$, $U, V \in V_2$ или $X, Y, Z \in V_2$, $U, V \in V_1$. Пара (V_1, V_2) линейных суперпространств $V_i = V_i^0 \oplus V_i^1$ ($i = 1, 2$) называется *суперёрдановой парой* (*super-Jordan pair*), если и только если определены два (четных) отображения $m_1 : V_2 \otimes V_1 \otimes V_1 \mapsto V_1$ и $m_2 : V_1 \otimes V_2 \otimes V_2 \mapsto V_2$ такие, что операции $(X, Y) \mapsto X \underset{U}{\circ} Y = m_i(U, X, Y) = A_{XUY} m_i(U, Y, X)$ ($i = 1, 2$; $X, Y \in V_1$, $U \in V_2$ или $X, Y \in V_2$, $U \in V_1$) согласованы между собой следующим образом:

$$X \underset{U \underset{Z}{\circ} V}{\circ} Y = X \underset{U}{\circ} (Z \underset{V}{\circ} Y) - A_{VYZ} (X \underset{U}{\circ} Y) \underset{V}{\circ} Z - B_{XZUV} (Z \underset{V}{\circ} X) \underset{U}{\circ} Y$$

где $X, Y, Z \in V_1$, $U, V \in V_2$ или $X, Y, Z \in V_2$, $U, V \in V_1$. Супералгебра Ли $\mathfrak{g}$ такая, что пара суперпространств $(\mathfrak{g}, \mathfrak{g})$ наделена $\mathfrak{g}$ -эквивариантной структурой изотопической пары с изокоммутаторами, согласованными с исходными суперскобками Ли в $\mathfrak{g}$, называется *магнитной супералгеброй Ли* (*magnetic Lie algebra*).

Обсудим это определение.

Во-первых, отметим, что данное определение изотопических пар является более общим по отношению к определению работ [1,3], в которых рассматривался чисто четные случаи.

Во-вторых, определение изотопической пары может рассматриваться как результат аксиоматизации следующей конструкции: пусть $\mathcal{A}$ — ассоциативная супералгебра, напр. матричная, V_1, V_2 — два линейных подпространства в ней такие, что V_1, V_2 замкнуты относительно изокоммутаторов $(X, Y) \mapsto [X, Y]_U = XUY - A_{XUY}YUX$ с изотопическими элементами U из V_2, V_1 , соответственно. Определение суперёрдановой пары получается аналогичным образом, если вместо изокоммутаторов рассматривать операции $X \underset{U}{\circ} Y = XUY + A_{XUY}YUX$. Указанная конструкция проясняет название "изотопическая пара": в самом деле, изокоммутатор $[X, Y]_U$ удовлетворяет соотношениям $Q[X, Y]_Q = [QX, QY]$, $[X, Y]_Q Q = [XQ, YQ]$, иными словами, изотопен обычному (супер)коммутатору. Изотопии в этом случае не обязательно невырождены (т.е. Q^{-1} не всегда существует), но линейны, и задаются при помощи левого или правого умножения в алгебре A : $X \mapsto QX$ или $X \mapsto XQ$. Отметим, что общие изотопии алгебр имеют более сложный вид, чем используемые в данной конструкции [4]. Например, имеет смысл рассматривать также нелинейные квадратичные изотопии вида $X \mapsto QXQ$ (ср.[5]), регулярно возникающие в теории ёрдановых алгебр, выпуклых конусов и симметрических пространств [6].

В-третьих, если $\mathfrak{g}$ — магнитная супералгебра Ли, то $(\mathfrak{g} \oplus \mathbb{k}, \mathfrak{g} \oplus \mathbb{k})$ — изотопическая пара. Наоборот, любая изотопическая пара (V_1, V_2) такая, что $\dim V_1 = \dim V_2 = n|m$, является магнитной супералгеброй Ли с абелевой супералгеброй Ли $\mathfrak{g} = \mathbb{k}^{n|m}$.

В-четвертых, отметим, что четные суперёрдановы пары являются ёрдановыми [7], а нечетные суперёрдановы пары — антиёрдановыми [8].

В-пятых, если характеристика основного поля больше двух, то изотопические пары наделаются структурой суперёрдановых пар при изменении суперградуировки на противоположную, и vice versa. Таким образом, в этом случае чисто четные изотопические пары отождествляются с

антиёордановыми парами. Однако, антиёордановы пары над полем характеристики два предоставляют пример таких пар, не являющихся изотопическими (ср. замечания в [1,3]).

Разберем примеры изотопических пар.

Во-первых, если $\mathfrak{g}$ — супералгебра Ли, то пара $(\mathfrak{g}, \mathbb{k})$ наделяется естественной структурой изотопической пары. Более того, некоторые (линейные) пучки супералгебр Ли $\mathfrak{g}_\lambda$ над полем $\mathbb{k}$ ($\lambda \in \mathbb{k}^n$) могут рассматриваться как изотопические пары (V_1, V_2) , где $V_1 \simeq \mathfrak{g}_\lambda$, $V_2 \simeq \mathbb{k}^n$, при выполнении некоторых условий согласования на суперкоммутаторы ($\diamond$ — замкнутость). Чисто четные $\mathfrak{g}$ -эквивариантные случаи (лиевы $\mathfrak{g}$ -пучки) изучались в работах [9, пар.3; 3, апп.А],

Во-вторых, многочисленные примеры четных изотопических (антиёордановых) пар рассматривались в работах [1,3]. Некоторые из них отвечают магнитным алгебрам Ли (т.е. чисто четным магнитным супералгебрам Ли).

В-третьих, имеет место следующая теорема.

Теорема 1А. *Существует пять бесконечных серий изотопических пар:*

- (1) *изотопическая пара $\mathfrak{gl}(n, m)$, образованная матрицами $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}$ из $\text{Mat}(n|m)$;*
- (2,3) *изотопические пары $\mathfrak{osp}^\pm(n, m)$, являющиеся подпарами изотопической пары $\mathfrak{gl}(n, m)$, выделяемыми условиями: $A^t = -A$, $D^t = D$, $B^t = \pm C$, $X^t = X$, $W^t = -W$, $Y^t = \pm Z$;*
- (4) *изотопическая пара $\mathfrak{q}(n)$, являющаяся подпарой изотопической пары $\mathfrak{gl}(n, n)$, выделяемой условиями: $A = D$, $B = C$, $X = W$, $Y = Z$;*
- (5) *изотопическая пара $\mathfrak{osq}(n)$, являющаяся подпарой изотопической пары $\mathfrak{q}(n)$, выделяемой условиями: $A^t = A$, $B^t = -B$, $X^t = -X$, $W^t = W$.*

Конечно же, утверждение теоремы не ограничивает класс изотопических пар пятью перечисленными сериями. Например, для любых двух элементов A и B изотопической пары (V_1, V_2) ($A \in V_1$, $B \in V_2$) пространства $V_1^\dagger = \{X \in V_1 : [A, X]_B = 0\}$ и $V_2^\dagger = \{Y \in V_2 : [B, Y]_X = 0\}$ образуют изотопическую подпару $(V_1^\dagger, V_2^\dagger)$ пары (V_1, V_2) (данная конструкция представляет интерес в контексте работы [10]). Чисто четные изотопические пары указанных серий (а также другие примеры) рассматривались в работе [1].

В-четвертых, имеется ряд нетривиальных бесконечномерных изотопических пар.

Теорема 1Б. *Пары $(W(n|m), O(n|m))$, $(K(2n+1|m), O(2n+1|m))$, $(M(n), O(n|n+1))$, $(H(2n|m), O(2n|m))$, $(Le(n), O(n|n))$ являются изотопическими парами, где $O(n|m)$ — пространство формальных степенных рядов от n четных и m нечетных переменных, $W(n|m)$, $K(2n+1|m)$, $M(n)$, $H(2n|m)$, $Le(n)$ — супералгебра Ли формальных векторных полей, контактная и нечетная контактная супералгебры Ли, супералгебра конформно-гамильтоновых векторных полей и ее нечетный аналог [11], соответственно.*

Пары $(\text{Vect}(M), O(M))$ $(\text{Vect}(M) \oplus O(M), O(M))$, где M — произвольное супермногообразие, $O(M)$ и $\text{Vect}(M)$ — пространства функций и векторных

полю на нем, соответственно, являются изотопическими парами, при этом можно ограничиться контактными или конформно-гамильтоновыми векторными полями (используя в случае первой пары отображение пространства соответствующих векторных полей на пространство дифференциальных операторов первого порядка, аннулирующих соответствующую форму). В частности, изотопическими парами являются $(\mathcal{K}(n), \mathcal{O}(S^{1|n}))$ и $(\mathcal{K}^+(n), \mathcal{O}(S_+^{1|n}))$, где $\mathcal{K}(n)$ и $\mathcal{K}^+(n)$ ($n = 1, 2, 3$) — супералгебры Неве–Шварца и Рамона (при $n = 1$) и их высшие аналоги, факторизованные по центру, а $\mathcal{O}(S^{1|n})$ и $\mathcal{O}(S_+^{1|n})$ — пространства функций на суперокружностях $S^{1|n}$ и подкрученных на расслоение Мебиуса суперокружностях $S_+^{1|n}$ (смотри [11]).

Было бы интересно описать центральные расширения бесконечномерных изотопических пар теоремы 1Б, а также ”изотопических пар токов” вида $(\text{Map}(\mathbb{S}^1, V_1), \text{Map}(\mathbb{S}^1, V_2))$ ((V_1, V_2) — изотопическая пара), их многомерных и суперобобщений ($\mathbb{S}^1$ заменяется на произвольное супермногообразие $\mathcal{M}$).

Как отмечалось выше, примеры магнитных алгебр Ли содержатся в работе [1]. Укажем также, что полупростая алгебра Ли $\mathfrak{g}$ является магнитной алгеброй Ли с изокоммутаторами $[X, Y]_U = \pm(X, U)Y \mp (U, Y)X$, где $(\cdot, \cdot)$ — билинейная форма Киллинга. Магнитной алгебре Ли $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ отвечает изокватернионная изотопическая пара (см. [1]).

Кроме того, приведем простую конструкцию, допускающую непосредственное суперобобщение. А именно, если $\mathfrak{g}$ — алгебра Ли с инвариантной симметрической билинейной формой $\eta_{\alpha\beta}$ и структурными константами $c_{\alpha\beta}^\gamma$, $c_{\alpha\beta\gamma} = 1c_{\alpha\beta}^\delta \eta_{\gamma\delta}$, то $(\mathfrak{g}, S^2(\mathfrak{g}))$ — изотопическая пара с изокоммутаторами:

$$\begin{aligned} [e_\alpha, e_\beta]_{m_{\gamma\delta}} &= (\eta_{\alpha\gamma} e_{\beta\delta}^\rho - \eta_{\alpha\delta} e_{\beta\gamma}^\rho) e_\rho, \\ [m_{\alpha\beta}, m_{\gamma\delta}]_{e_\zeta} &= c_{\beta\gamma\zeta} m_{\alpha\delta} + c_{\alpha\gamma\zeta} m_{\beta\delta} + c_{\beta\delta\zeta} m_{\alpha\gamma} + c_{\alpha\delta\zeta} m_{\beta\gamma}. \end{aligned}$$

где $\{e_\alpha\}$, $\{m_{\alpha\beta} = m_{\beta\alpha}\}$ — базисы в $\mathfrak{g}$ и $S^2(\mathfrak{g})$, соответственно. При этом, $(\mathfrak{g}, S^2(\mathfrak{g})/S^2(\mathfrak{g})^\mathfrak{g})$ также является изотопической парой.

2. Представления изотопических пар: определения и примеры.

Определение 2. Представлением изотопической пары (V_1, V_2) в линейном суперпространстве H называется пара (T_1, T_2) (четных) отображений $T_i : V_i \mapsto \text{End}(H)$ таких, что

$$\begin{aligned} T_1([X, Y]_U) &= T_1(X)T_2(U)T_1(Y) - A_{XUY}T_1(Y)T_2(U)T_1(X), \\ T_2([U, V]_X) &= T_2(U)T_1(X)T_2(V) - A_{UXV}T_2(U)T_1(X)T_2(V), \end{aligned}$$

где $X, Y \in V_1$, $U, V \in V_2$. Представление изотопической пары (V_1, V_2) в линейном суперпространстве H называется *расщепленным* (*split*), если и только если $H = H_1 \oplus H_2$ и

$$\begin{cases} (\forall X \in V_1) T_1(X)|_{H_2} = 0, T_1(X) : H_1 \mapsto H_2, \\ (\forall U \in V_2) T_2(U)|_{H_1} = 0, T_2(U) : H_2 \mapsto H_1. \end{cases}$$

Пример 1. Расщепленные представления со старшим весом (Highest weight split representations).

Если изотопическая пара (V_1, V_2) $\mathbb{Z}$ -градуирована (т.е. $V_1 = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} V_{1,i}$, $V_2 = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} V_{2,i}$, $[V_{1,i}, V_{1,j}]_{V_{2,k}} \subseteq V_{1,i+j+k}$, $[V_{2,i}, V_{2,j}]_{V_{1,k}} \subseteq V_{2,i+j+k}$) и изотопическая пара $(V_{1,0}, V_{2,0})$ тривиальна, то можно рассматривать расщепленные представления пары (V_1, V_2) со старшим весом. Пространства H_1 и H_2 порождаются старшими (вакуумными) векторами $|0\rangle_1 \in H_1$ и $|0\rangle_2 \in H_2$ такими, что $(\forall X \in V_{1,0}) X|0\rangle_1 = \chi_1(X)|0\rangle_2$, $(\forall U \in V_{2,0}) X|0\rangle_2 = \chi_2(U)|0\rangle_1$, где $\chi_i \in V_{i,0}^*$, $(\forall X \in V_{1,-i}) X|0\rangle_1 = 0$, $(\forall U \in V_{2,-i}) X|0\rangle_2 = 0$ ($i > 0$). Остальные базисные векторы в H_1 и H_2 имеют вид $U_j X_j \dots U_1 X_1 |0\rangle_1$ или $U_{j+1} X_j U_j \dots X_1 U_1 |0\rangle_2$ и $X_j U_j \dots X_1 U_1 |0\rangle_2$ или $X_{j+1} U_j X_j \dots U_1 X_1 |0\rangle_1$, соответственно, где $X_1, \dots, X_j, X_{j+1} \in \bigoplus_{i>0} V_{1,i}$, $U_1, \dots, U_j, U_{j+1} \in \bigoplus_{i>0} V_{2,i}$.

Пример 2. Индуцированные расщепленные представления.

Конструкция примера 1 непосредственно обобщается, предоставляя аналогии индуцированных представлений.

А именно, пусть (V_1, V_2) — изотопическая пара, (V_1°, V_2°) — ее изотопическая подпара и $T^\circ = (T_1^\circ, T_2^\circ)$ — представление (V_1°, V_2°) в пространстве $H^\circ = H_1^\circ \oplus H_2^\circ$. Тогда можно рассмотреть индуцированное расщепленное представление $T = (T_1, T_2) = \text{Ind}_{(V_1^\circ, V_2^\circ)}^{(V_1, V_2)}(T_1^\circ, T_2^\circ)$ пары (V_1, V_2) в пространстве $H = H_1 \oplus H_2$, где H_1 — порождено $U_j X_j \dots U_1 X_1 |v\rangle_1$ и $U_{j+1} X_j U_j \dots X_1 U_1 |v\rangle_2$, в то время как H_2 порождено $X_j U_j \dots X_1 U_1 |v\rangle_2$ и $X_{j+1} U_j X_j \dots U_1 X_1 |v\rangle_1$ ($X_1, \dots, X_j, X_{j+1} \in V_1$; $U_1, \dots, U_j, U_{j+1} \in V_2$; $|v\rangle_1 \in H_1^\circ$, $|v\rangle_2 \in H_2^\circ$).

Представления со старшим весом и индуцированные расщепленные представления могут быть построены для изотопических пар пяти серий теоремы 1А. Отметим также, что можно рассматривать и конструкции геометрических представлений по аналогии с [1].

К сожалению, автору неизвестно, что следует считать (ко)гомологиями изотопических пар, но эти объекты, надлежащим образом определенные, несомненно должны представлять интерес (ср.[12]).

Представления изотопических пар $(\mathfrak{g}, \mathbb{k})$, ассоциированные с алгебрами Ли $\mathfrak{g}$, рассматривались в работе [3]. По каждому представлению $T = (T_1, T_2)$ изотопической пары $(\mathfrak{g}, \mathbb{k})$ может быть построено представление T_0 супералгебры Ли $\mathfrak{g}$: $T_0(X) = T_2(1)T_1(X)$, $1 \in \mathbb{k}$, $X \in \mathfrak{g}$. Наоборот, если T_0 — некоторое представление супералгебры Ли $\mathfrak{g}$ и Q — невырожденный оператор в пространстве представления, то (T_1, T_2) , где $T_1(X) = Q^{-1}T_0(X)$, $T_2(1) = Q$ ($1 \in \mathbb{k}$, $X \in \mathfrak{g}$), является представлением изотопической пары $(\mathfrak{g}, \mathbb{k})$. В случае вырожденного Q могут естественным образом возникать и более сложные нелиевские алгебраические объекты, такие как, например, "квадратичные" алгебры Желобенко (AZ_n, BZ_n, CZ_n, DZ_n) , Микельсона $(S(\mathfrak{g}, \mathfrak{k}), Z(\mathfrak{g}, \mathfrak{k}))$ и их обобщения $(Z(A, \mathfrak{k}))$, где A , например, — контрагредивентная ассоциативная алгебра Желобенко [13], если Q — т.н. алгебраический экстремальный проектор Ашеровой–Смирнова–Толстого [14,13].

3. Некоторые алгебраические объекты, связанные с изотопическими и суперёордановыми парами и магнитными супералгебрами. Хорошо известно, по ёордановой паре (V_1, V_2) в пространстве $V = V_1 \oplus V_2$ строится поляризованная троёная система Ли [7], а по анти-ёордановой паре (и, в частности, по чисто четной изотопической паре) (V_1, V_2) в пространстве $V = V_1 \oplus V_2$ строится поляризованная антилиева троёная система [8].

В свою очередь указанным троёным системам сопоставляется некоторый класс алгебр и супералгебр Ли.

Аналогичная ситуация, оказывается, имеет место и в общем супер-случае.

Теорема 2А. Пусть (V_1, V_2) – суперёрданова пара, тогда пространство $V = V_1 \oplus V_2$ наделяется структурой поляризованной суперлиевой троёной системы (определение смотри в [15, стр.2786]).

Конструкция поляризованной суперлиевой троёной системы в точности повторяет аналогичные конструкции в чисто четном и нечетном случаях. Тем самым, доказательство теоремы сводится к простой идентификации определяющих соотношений в обоих классах алгебраических систем.

Таким образом, по каждой изотопической паре может быть построена поляризованная суперлиева троёная система. Примеры для чисто четного случая рассматривались весьма подробно в [3].

Будем называть $\mathbb{Z}_2$ -градуированную супералгебру Ли $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1$ поляризованной, если линейное пространство $\mathfrak{g}_1$ допускает разложение $\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g}_1^+ \oplus \mathfrak{g}_1^-$ такое, что (1) $\mathfrak{g}_1^\pm$ – $\mathfrak{g}_0$ -подмодули модуля $\mathfrak{g}_1$, (2) $[\mathfrak{g}_1^+, \mathfrak{g}_1^+] = [\mathfrak{g}_1^-, \mathfrak{g}_1^-] = 0$. Целесообразно рассматривать дополнительную $\mathbb{Z}_2$ -градуировку как ”подкручивание” исходной суперградуировки, т.е. снабжать $\mathfrak{g}_1$ противоположной четностью.

Теорема 2Б. Каждой изотопической паре (V_1, V_2) сопоставляется поляризованная $\mathbb{Z}_2$ -градуированная супералгебра Ли $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g}_0 \oplus (\mathfrak{g}_1^+ \oplus \mathfrak{g}_1^-)$ такая, что $\mathfrak{g}_1^+ = V_1$ $\mathfrak{g}_1^- = V_2$.

Конструкция копирует чисто четные случаи, подробно прокомментированные и проиллюстрированные на примерах в работе [3]. Подчеркнем, что если в первой части теоремы 2 естественно рассматривать суперёрдановы пары, то во второй — изотопические.

Магнитные полупростые супералгебры Ли $\mathfrak{g}$ однозначно определяются нулевой компонентой $\hat{\mathfrak{g}}_0$ соответствующей ей по теореме 2Б супералгебры Ли $\hat{\mathfrak{g}}$, мономорфизмом $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g} \mapsto \hat{\mathfrak{g}}_0$ и разложением $\hat{\mathfrak{g}}_0 = (\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{w}$, где $\mathfrak{w}$ – подалгебра в $\hat{\mathfrak{g}}_0$, порожденная изокмутаторами. Подобные разложения играют важную роль в формализме классической r -матрицы [16].

Теорема 3А. В пространстве расщепленного представления изотопической пары (V_1, V_2) реализуется представление соответствующей поляризованной $\mathbb{Z}_2$ -градуированной супералгебры Ли.

Чисто четный аналог этой теоремы приведен в [3].

Теорема 3Б. Пусть (V_1, V_2) — некоторая изотопическая пара с редуktивной соответствующей супералгеброй Ли $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{p}$ — параболическая подалгебра в $\mathfrak{g}$ (ср. [17]) такая, что $\dim(\mathfrak{g}_1/(\mathfrak{g}_1 \cap \mathfrak{p})) = (0|1)$, χ — характер $\mathfrak{p}$, тогда в пространстве представления $\text{Ind}_{\mathfrak{p}}^{\mathfrak{g}} \chi$ супералгебры Ли $\mathfrak{g}$, индуцированного с характера χ подалгебры $\mathfrak{p}$, реализуется расщепленное представление изотопической пары (V_1, V_2) .

В случае изокватернионной пары (отвечающей магнитной алгебре Ли $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$) конечномерные подпредставления индуцированных представлений

описывают внутреннюю сверхтонкую магнитную структуру связанных состояний двух частиц со спином. В частности, четырехмерное расщепленное представление со старшим весом $(1/2, 1/2)$ (фундаментальное представление изокватернионной пары) соответствует паре связанных частиц спина $1/2$ (см. напр. [18]). Кроме того, те же данные характеризуют внутреннюю сверхтонкую структуру скалярно-тензорного взаимодействия нуклонов в нуклон-нуклонных парах, взаимодействия нуклон-нуклонных пар, позитрониев или куперовских пар между собой, а также некоторых форм негамильтонова взаимодействия квантовых вихрей в сверхпроводниках или квантовых жидкостях. В силу этого представляет интерес общая задача изучения спектра ограничений неприводимых представлений изотопических пар $(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{k}, \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{k})$ ($\mathfrak{g}$ — магнитная супералгебра Ли) и соответствующих $\mathbb{Z}_2$ -градуированных поляризованных супералгебр Ли $\hat{\mathfrak{g}}$ на супералгебре Ли $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g} \subseteq \hat{\mathfrak{g}}_0$ и правил суперотбора (см. напр. [19]). Данная задача имеет смысл и для бесконечномерных изотопических пар (перечисленных в теореме 2Б и "изотопических пар токов") ввиду возможных приложений к теории (супер)струн (феноменология частиц и спонтанное нарушение симметрии) и струнноподобных квантовых объектов.

4. Некоторые замечания. Изотопические пары (а также магнитные алгебры Ли) являются простейшими алгебраическими объектами, описывающими непотенциальное взаимодействие гамильтоновых систем. Более общие структуры — I -пары [5], в которых взаимодействие не обязательно линейно, а также общих нелинейных квантовых (или классических) скобок (ср. напр. [20, 21]), зависящих от состояний воздействующих систем. Подобные объекты могут встречаться, например, при изучении негамильтонова взаимодействия (магнитного типа) квантовых солитонов [22] или взаимодействия (супер)струнных и струнноподобных объектов (например, квантовых вихрей). Однако, корректная постановка прямой задачи теории представлений в этом случае автору неизвестна.

Важной нерешенной проблемой является глобализация конструкции изотопических пар, т.е. построение глобальных алгебраических объектов, инфинитезимальные версии которых представляют собой изотопические пары, а также разработка аналога теории Ли для них. Частные случаи, связанные с простейшими r -матричными изотопическими парами (r -матричными магнитными алгебрами Ли), позволяют предположить наличие связи между указанным сюжетом и теорией квантовых групп [23] и квантовых τ -функций [24].

По-видимому, геометрические изотопические пары могут играть определенную роль также в формализме асимптотического квантования [20].

Необходимо также отметить возможные приложения изотопических пар к методу обратной задачи рассеяния в теории нелинейных дифференциальных уравнений с частными производными [25] (см. также в [26] изложение для систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений) путем построения (ср. [27]) ассоциированных с изотопическими парами аналогов изоспектральных деформаций (представлений Лакса).

Изотопические пары как алгебраический аппарат описания систем (как конечных, так и бесконечных цепочек) неканонически взаимодействующих объектов [27] могут быть использованы для описания структуры и выявле-

ния скрытых симметрий спектров квантовых систем (например, изотопическая пара неканонически спаренных осцилляторов [1,3,27] — спектров осцилляторного типа [28]). При этом существенную роль должны играть объекты более сложного комбинаторного типа, чем описанные выше представления изотопических пар, такие как, например, *граф-представления*, т.е. совокупности отображений $\{T_1^\alpha, \alpha = 1, \dots, N_1; T_1^\beta, \beta = 1, \dots, N_2; T_1^\alpha : V_1 \mapsto \text{End}(H), T_2^\beta : V_2 \mapsto \text{End}(H)$ таких, что

$$T_1^\alpha([X, Y]_U) = \sum_{\beta=1}^{N_2} \mathcal{P}_{\alpha\beta}(T_1^\alpha(X)T_2^\beta(U)T_1^\alpha(Y) - A_{XUY}T_1^\alpha(Y)T_2^\beta(U)T_1^\alpha(X)),$$

$$T_2^\beta([U, V]_X) = \sum_{\alpha=1}^{N_1} \mathcal{Q}_{\alpha\beta}(T_2^\beta(U)T_1^\alpha(X)T_2^\beta(V) - A_{UXV}T_2^\beta(V)T_1^\alpha(X)T_2^\beta(U)),$$

где $X, Y \in V_1$, $U, V \in V_2$, $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — две матрицы $N_1 \times N_2$.

Наличие подобных комбинаторно-нетривиальных высших аналогов представлений является отличительной и специфической по сравнению с обычными алгебрами чертой алгебраических пар.

REFERENCES

- [1] Юрьев Д.В.// ТМФ. 1995. Т.105. С.000-000 [English electronic version (Texas Electronic Archive on Math. Phys.): *tp-arc/94-267* (1994)].
- [2] Березин Ф.А., Введение в алгебру и анализ от коммутирующих и антикоммутирующих переменных. М., Наука, 1983; Леётез Д.А.// УМН. 1980. Т.35, вып.1. С.3-57; Манин Ю.И., Калибровочные поля и комплексная геометрия. М., Наука, 1984; Огиевецкий В.И., Сокачев Е.С. / Матем. анализ 22. М., ВИНТИ, 1984, С.137-174; Рослыё А.А., Худавердян О.М., Шварц А.С. / Соврем. пробл. матем. Фундам. направления 9, М., ВИНТИ, 1986, С.247-284.
- [3] Juriev D., Classical and quantum dynamics of noncanonically coupled oscillators and Lie superalgebras / E-print (SISSA Electronic Archive on Funct. Anal.): *funct-an/9409003* (1994), Russian J. Math. Phys. [to appear]; On the dynamics of noncanonically coupled oscillators and its hidden superstructure / Preprint ESI 167 (1994) and e-print (LANL Electronic Archive on Solv. Integr. Systems): *solv-int/9503003* (1995).
- [4] Курош А.Г., Общая алгебра. М., 1974.
- [5] Juriev D., On the nonHamiltonian interaction of two rotators / E-print (MSRI Electronic Archive on Diff. Geom. and Global Anal.): *dg-ga/9409004* (1994) and Report RCMPI/95-01 (1995).
- [6] Koecher M., Jordan algebras and their applications, 1962; Jacobson N., Structure and representations of Jordan algebras, Providence, 1968; Koecher M., An elementary approach to bounded symmetric domains, Houston, 1969; Лоос О., Симметрические пространства, М., Наука, 1985.
- [7] Loos O., Jordan pairs. Springer-Verlag, 1975; Кузьмин Е.Н., Шестаков И.П. / Соврем. пробл. матем. Фундам. направления 57. М., ВИНТИ, 1992.
- [8] Faulkner J.R., Ferrar J.C.// Commun. Alg. 1980. V.8. P.993-1013.
- [9] Juriev D., Topics in hidden symmetries / E-print (LANL Electronic Archive on High Energy Phys.): *hep-th/9405050* (1994).
- [10] Юрьев Д.В., Характеристики пар операторов, гибриды Ли, скобки Пуассона и нелинейная геометрическая алгебра / E-print (SISSA Electronic Archive on Funct. Anal.): *funct-an/9411007* (1994) and Report RCMPI/95-02 (1995).

- [11] *Леётес Д.А.* / Соврем. пробл. матем. Новейшие достижения 25, М., ВИНТИ, 1984, С.3-50.
- [12] *Гишарде А.*, Когомологии топологических групп и алгебр Ли. М., Мир, 1984; *Фукс Д.Б.*, Когомологии бесконечномерных алгебр Ли. М., Наука, 1984.
- [13] *Желобенко Д.П.*// УМН. 1962. Т.17, вып.1. С.27-120; *Mickelsson J.*// Rep. Math. Phys. 1973. V.4. P.303-318, 1980. V.18. P.197-210; *Homberg A.*// Invent. Math. 1975. V.37. P.42-47; *Желобенко Д.П.*// Изв. АН СССР, сер. матем. 1988. Т.52. С.758-773; *Zhelobenko D.P.*// J. Group Theory in Phys. 1993. V.1. P.201-233; *Желобенко Д.П.*, Представления редуктивных алгебр Ли. М., Наука, 1994.
- [14] *Ашерова Р.М.*, *Смирнов Ю.Ф.*, *Толстоё В.Н.*// ТМФ. 1971. Т.8. С.255-271; Матем. заметки 1979. Т.26. С.15-26; *Толстоё В.Н.*// Теоретико-групповые методы в физике. 1986. Т.2. С.46-54.
- [15] *Okubo S.*// J. Math. Phys. 1994. V.35. P.2785-2803.
- [16] *Семенов-Тянь-Шанский М.А.*// Функци. анал. и его прилож. 1983. Т.13, вып.4. С.17-33.
- [17] *Желобенко Д.П.*, *Штерн А.И.*, Представления групп Ли. М., Наука, 1983.
- [18] *Боголюбов Н.Н.*, *Толмачев В.В.*, *Ширков Д.В.*, Новые метод в теории сверхпроводимости. Изд-во АН СССР, 1958.
- [19] *Барут А.*, *Рончка Р.*, Теория представлений групп и ее приложения. М., Мир, 1980.
- [20] *Карасев М.В.*, *Маслов В.П.*, Нелинейные скобки Пуассона. Геометрия и квантование. М., Наука, 1991.
- [21] *Nazaikinskii V.*, *Sternin B.*, *Shatalov V.*, Methods of noncommutative analysis: theory and applications. Walter de Gruyter Inc., 1995.
- [22] *Фаддеев Л.Д.*, *Корепин В.Е.*// ТМФ. 1975. Т.25. С.147-163; *Faddeev L.D.*, *Korepin V.E.*// Phys. Rep. C. 1978. V.42, no.1.
- [23] *Дринфельд В.Г.*// Зап. научн. семин. ЛОМИ. 1986. Т.155. С.18-49; *Решетикин Н.Ю.*, *Тахтаджян Л.А.*, *Фаддеев Л.Д.* // Алгебра и анал. 1989. Т.1. С.178-206.
- [24] *Gerasimov A.*, *Khoroshkin S.*, *Lebedev D.*, *Morozov A.*, Generalized Hirota equations and representation theory. I. The case of $SL(2)$ and $SL_q(2)$ / E-print (LANL Electronic Archive on High Energy Phys.): *hep-th/9405011* (1994); *Mironov A.*, Quantum deformations of τ -functions, bilinear identities and representation theory / E-print (LANL Electronic Archive on High Energy Phys.): *hep-th/9409190* (1994); *Kharchev S.*, *Mironov A.*, *Morozov A.*, Non-standard KP evolution and quantum τ -functions / E-print (Duke Univ. Electronic Archive on Q-Alg): *q-alg/9501013* (1995).
- [25] *Lax P.*// Commun. Pure Appl. Math. 1968. V.21. P.467-490; *Moser J.*// Adv. Math. 1975. V.16. P.197-220; *Захаров В.Е.*, *Шабат А.Б.*// Функци. анал. и его прилож. 1974. Т.8, вып.3. С.43-53, 1979. Т.13, вып.3. С.13-22; *Дубровин Б.А.*, *Матвеев В.Б.*, *Новиков С.П.*// УМН. 1976. Т.31, вып.1. С.55-136; *Захаров В.Е.*, *Манаков С.В.*, *Новиков С.П.*, *Питаевский Л.П.*, Теория солитонов. Метод обратной задачи. М., Наука, 1980.
- [26] *Переломов А.М.*, Интегрируемые системы классической механики и алгебры Ли. М., Наука, 1990.
- [27] *Juriev D.*// Russian J. Math. Phys. 1995. V.3. no.4 [e-print version (LANL Electronic Archive on Solv. Integr. Systems): *solv-int/9505001* (1995)].
- [28] *Веселов А.П.*, *Шабат А.Б.*// Функцион. анал. и его прилож. 1993. Т.27, вып.2. С.1-21.

ЦМФИ "Таласса Этерия"

E-mail address: denis@juriev.msk.ru